



PHARMAZEUTISCHE FABRIK

DR. RECKEWEG & CO.
GMBH



Dr. Reckeweg R59 Vesiculine

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 mL) son: *Calcium carbonicum Hahnemanni* D12 (23,82 mg), *Fucus vesiculosus* D6 (23,82 mg), *Graphites* D12 (23,82 mg), *Natrium sulfuricum* D6 (23,82 mg), *Spongia* D6 (23,82 mg).

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (72,81 mg).

Forma de administración y posología

Via oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños \geq de 12 años: 5 gotas 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.
- niños $<$ de 12 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R59 Vesiculine gotas orales en solución.

Presentación

50 mL gotas orales en solución.



CN: 759071.4

Dr. Reckeweg R42 Haemovenin

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 mL) son: *Aesculus D30* 23,81 mg, *Carduus marianus D12* 23,81 mg, *Hamamelis D6* 23,81 mg, *Fulsularia D30* 23,81 mg, *Secale cornutum D30* 23,81 mg, *Vipera berus D12* 23,81 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (73,20 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en adultos es de 5 gotas 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.



Presentación
50 mL gotas orales
en solución.

Dr. Reckeweg R20 Euglandin-F

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 mL) son: Glándula suprarrenal (suil) D12 23,83 mg, Glándula tímica (suil) D12 23,83 mg, Hipofisis (suil) D12 23,83 mg, Ovarium (suil) D12 23,83 mg, Páncreas (suil) D12 23,83 mg, Thyroidneum (suil) D12 23,83 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (72,81 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

Este medicamento está destinado a mujeres adultas. La dosis recomendada en mujeres adultas es de 5 gotas 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de administración.



Presentación
50 mL gotas orales
en solución.

Dr. Reckeweg R41 Fortivirone

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 mL) son: *Actium phosphoricum D12* 23,82 mg, *Agnus castus D6* 23,82 mg, *Damiana D6* 23,82 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (72,41 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.



Presentación
50 mL gotas orales en solución.



PHARMAZEUTISCHE FABRIK

DR. RECKEWEG & CO.
GMBH



Presentación

50 ml. gotas orales en solución de cada bote

Dr. Reckeweg R7 Hepagalen

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Carduus marianus* D6 23,81 mg, *Chelidonium* D6 23,81 mg, *China* D6 23,81 mg, *Cholesterolium* D6 23,81 mg, *Colocynthis* D6 23,81 mg, *Lycopodium* D6 23,81 mg, *Nux vomica* D6 23,81 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (73,80 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en estados agudos en adultos es 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Población pediátrica

- niños **a** de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños menores de 12 años: no se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R7 Hepagalen gotas orales en solución.

Dr. Reckeweg R37 Colinteston

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas son: *Alumina* D12 23,83 mg, *Bryonia* D6 23,83 mg, *Colocynthis* D6 23,83 mg, *Lycopodium* D6 23,83 mg, *Nux vomica* D6 23,83 mg, *Sulfur* D12 23,83 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (73,20 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Población pediátrica

- niños **a** de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños 6-11 años: 3 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños menores de 6 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución.



MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

Dr. Reckeweg® & Co. GmbH - Sucursal en España
Polígono Industrial Ugaldeguren 1, 48160 Derio (Vizcaya)
E-mail: reckeweg@lavigor.com / Teléfono: +34 944545057

Dr. Reckeweg Scrophularia nodosa D4

CN: 7590739



Presentación
50 ml. gotas orales en solución.

Composición

El principio activo por cada 5 gotas (0,25 ml) es: *Scrophularia nodosa* D4 231,46 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 52 V/V (103 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis, a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños ≥ de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños menores de 12 años: no se recomienda el uso de *Scrophularia nodosa* D4 gotas orales en solución.

Dr. Reckeweg R1 Anginacid

CN: 7618850



Presentación
50 ml. gotas orales en solución.

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Apis* D6 23,81 mg, *Belladonna* D6 23,81 mg g, *Calcium iodatum* D6 23,81 mg, *Hepar sulfuris* D12 23,81 mg, *Kalium bichromicum* D8 23,81 mg, *Lachesis* D12 23,81 mg, *Marum verum* D6 23,81 mg, *Mercurius sublimatus corrosivus* D12 23,81 mg, *Phytolacca* D6 23,81 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 38% V/V (73,99 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en estados agudos en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Población pediátrica: Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños ≥ de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños 6 - 11 años: 3 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños 2 - 5 años: 2 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños menores de 2 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R1 Anginacid gotas orales en solución.

Dr. Reckeweg R27 Renocalcin

CN: 7619987



Presentación
50 ml. gotas orales en solución.

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Acidum nitricum* D6 23,81 mg, *Berberis vulgaris* D6 23,81 mg, *Lycopodium* D6 23,81 mg, *Sarsaparilla* D6 23,81 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (72,61 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en adultos es de 5 gotas de 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.