



VADÉMÉCUM

ESPECIALIDADES BIOLÓGICAS



PHARMAZEUTISCHE FABRIK

DR. RECKEWEG & CO.
GMBH





TRATAMIENTOS DE MESOTERAPIA DEL Dr. Reckeweg EN MEDICINA ESTÉTICA

CELULITIS

La celulitis, es un desarreglo multifactorial (alteración de la circulación de retorno, linfática y tejido adiposo), que se traduce en un serio problema estético, que generalmente sufren las mujeres en nalgas y parte exterior de los muslos, dando lugar a unos abultamientos, denominados comúnmente piel de naranja.

¿Por qué se produce la celulitis? Se debe a factores de diversa etiología:

Metabólico. Las células del tejido adiposo se inflaman y adquieren una rigidez tal que ocasionan problemas circulatorios.

Hormonal. Por herencia genética. Generalmente durante la pubertad y embarazo se ve acentuada.

Circulatorio. Pesadez de piernas y hormigueo son un síntoma inequívoco de la existencia de patología circulatoria.

El sedentarismo, el estrés, las prendas inadecuadas que imposibiliten una correcta circulación, así como la acumulación de tóxicos y una dieta incorrecta, son factores que, sin lugar a dudas, contribuyen incrementando la patología de la celulitis.

ABDOMEN

Existen numerosos factores que contribuyen a la obesidad acompañada de distensión abdominal, y no es solo el factor de acumulación de grasa localizada el que hay que atacar:

Los **gases** que inflaman el abdomen a causa de malos hábitos alimentarios, la falta de ejercicio, comer apresuradamente, el estrés, deben ser tratados.

Los **desarreglos hormonales** que intervienen en un incorrecto metabolismo de las grasas, entre otras alteraciones.

Asimismo, un buen funcionamiento de los **procesos de eliminación** naturales del organismo es de gran importancia en estos casos, así como un control de la ingesta calórica y de la naturaleza de los alimentos ingeridos.

No podemos olvidar que es fundamental fortalecer el abdomen y corregir la **flacidez**. Para ello, ejercicios adecuados así como una correcta higiene postural contribuirán notablemente a nuestro deseado objetivo.

FLACIDEZ

Son muy diversas las causas que originan la flacidez tanto a nivel facial como a nivel corporal. La principal es la **pérdida de elastina y colágeno**, moléculas que trabajan proporcionando firmeza y elasticidad a la piel.

Diversos factores tales como la carga genética, sedentarismo o dieta rica en grasas, azúcar y harinas favorecen, sin lugar a dudas, el desarrollo de una flacidez temprana, más, si cabe, si sometemos a la piel a exposiciones solares prolongadas y/o sin protección adecuada.


Como consecuencia de la falta de tonicidad de piel, es frecuente que se presente descolgamiento de la misma en áreas como interior de brazos y muslos, y abdomen. Asimismo, puede dar lugar al desarrollo de mentonera (papada), bolsas y pérdida del óvalo facial.

ALOPECIA

La causa de la alopecia puede ser muy diversa:

Hereditaria, estacional, tras determinadas enfermedades o tratamientos, así como por desequilibrios hormonales, estrés, sustancias químicas que afecten al folículo piloso inflamándolo y pudiendo dar lugar a la cicatrización y caída del cabello. Una mala alimentación, escasa, desequilibrada o sin horarios puede ser también fuente de problemas de alopecia.

Es necesario trabajar sobre los elementos que intervienen directamente en la formación y salud del cabello, facilitando su crecimiento y evitando su caída. Una buena microcirculación y oxigenación del cuero cabelludo es fundamental, así como evitar la caspa y la grasa, la inflamación, sobrecarga tóxica y desarreglos.



ÍNDICE GENERAL

RESEÑA HISTÓRICA.....	4
RELACIÓN DE ESPECIALIDADES BIOLÓGICAS.....	9
ESPECIALIDADES BIOLÓGICAS.....	13
ÍNDICE DE CONSTITUYENTES	80
ÍNDICE DE APARATOS / SISTEMAS.....	87
ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA	95
DR. RECKEWEG EN EL MUNDO	103

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

LA HOMEOPATÍA: EFICACIA SIN EFECTOS SECUNDARIOS

Homeopatía - este término derivado del griego homoios (similar) y pathos (enfermedad) se refiere a un sistema terapéutico completo que estimula de manera suave y continua los esfuerzos naturales y regeneradores del organismo.

Hasta la aparición de la industria química y la fabricación de medicamentos sintéticos que vinieron de la mano de la revolución industrial, las enfermedades eran tratadas exclusivamente aplicando métodos terapéuticos basados en la naturaleza. Sin embargo, los tratamientos con medicamentos de fabricación química fueron cobrando cada vez mayor importancia. Solamente los efectos secundarios que se presentan en los pacientes cada vez con mayor frecuencia, dan ahora lugar a un escepticismo creciente respecto a estos últimos métodos terapéuticos.

La homeopatía nació hace más de 200 años basada en las experiencias que su genial fundador, el médico y naturalista alemán Samuel Hahnemann (1755-1843), recopiló y fundamentó durante cuarenta años de investigación, sentando así las bases de la terapia homeopática moderna.

La primera premisa fundamental de la homeopatía se puede extraer de la sentencia latina “Similia similibus curentur”, que significa “que los semejantes sean curados por los semejantes”. Este concepto terapéutico fue reconocido y utilizado desde los principios de la medicina con Hipócrates (s. V a.C.) y coexistió durante muchos siglos con el principio contrario, que sería usado por Galeno (s. II) como único método terapéutico: “Contraria contrariis opponenda” que supone la administración de medicamentos cuya acción es opuesta a las manifestaciones propias de la enfermedad. El mismo Paracelso (x. XVI) recomendaba la utilización de karentas o dosis mínimas de las sustancias que provocan en individuos sanos la sintomatología que presenta el paciente.

Desde el punto de vista moderno, la homeopatía puede describirse como una terapia de estimulación de las defensas del organismo para contrarrestar los desequilibrios fisiológicos que dan lugar a la aparición de los “síntomas patológicos” propios de una enfermedad y al posterior proceso degenerativo que afecta a las estructuras anatómicas de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano.

Unido inherentemente al principio de similitud citado anteriormente, encontramos otra premisa fundamental de la homeopatía, y es que cada individuo presenta formas de reaccionar diferentes ante un estímulo determinado y localizaciones específicas distintas de dichas reacciones debido a sus características biológicas particulares. Para comprender este principio, la homeopatía afirma que la “enfermedad” no es más que la respuesta del organismo a buscar el equilibrio biológico que se ha perdido ante una causa perturbadora.

Este principio conduce indefectiblemente a la individualización de la terapéutica en homeopatía, ya que cada individuo presentará modalidades reactivas propias y lugares de resistencia menor (locus minoris resistentiae). Es por ello que la investigación sistemática y profunda de la acción patogenética de las sustancias en homeopatía es la base fundamental para el desarrollo de medicamentos de alta eficacia hoy en día. De ahí que las combinaciones de la casa RECKEWEG hayan sido cuidadosamente formuladas según las experiencias en investigación y la sintomatología de cada enfermedad. Apoyada en este concepto, la casa RECKEWEG ha logrado formular una considerable gama de medicamentos altamente eficaces y seguros, lo que ha facilitado enormemente la elección de éstos en la terapéutica médica, debido a que el campo de acción de cada uno de ellos es generosamente amplio.

Dentro de los principios básicos de la homeopatía, Hahnemann propuso un tercer principio no menos importante: y es que una misma sustancia tiene propiedades tanto toxicológicas como terapéuticas, y específicamente señaló que altas dosis de una sustancia pueden provocar síntomas patológicos e incluso lesiones anatomopatológicas sobre un tejido, pero esta misma sustancia puede “activar” una respuesta fisiológica de defensa orientada a la eliminación de los efectos causados por un agente etiológico determinado. Entonces diremos que la homeopatía proporciona las sustancias en dosis necesarias para mantener un estímulo de la actividad celular u orgánica específica o bien un estímulo a la reactividad del sistema en su conjunto, pero evitando los efectos toxicológicos de las sustancias usadas. Este principio fue estudiado y demostrado por los biólogos Hugo Schulz (1853-1932) y Rudolf Arndt (1835-1900), quienes dejaron claro en sus enunciados que mientras las pequeñas excitaciones provocan o aumentan la actividad fisiológica vital de las células, las excitaciones fuertes detienen o destruyen

dicha actividad fisiológica vital. De ahí que los medicamentos fabricados por la casa RECKEWEG sean bien tolerados y carentes de efectos secundarios importantes en el tratamiento de “enfermedades” agudas y crónicas sin sacrificar la eficacia de la terapéutica.

En la historia de la medicina moderna encontramos hechos que han dado lugar a grandes avances en el campo de la inmunología, la alergología y la vacunación, utilizando sistemáticamente este principio de la inversión de los efectos de una misma sustancia de acuerdo a la variación significativa de las dosis. En el campo de la microbiología, se aplica consistentemente la administración de distintas formas de organismos patógenos (especialmente virus) que no tienen la capacidad de producir una enfermedad determinada, pero sí de inducir la formación de anticuerpos.

Más allá del campo microbiológico, la medicina convencional ha utilizado este principio en sus aplicaciones terapéuticas documentando acciones farmacológicas que se invierten según la dosificación de las sustancias, como por ejemplo las sales de mercurio que fueron utilizadas desde 1919 como diuréticos por más de 30 años, y que en cantidades toxicológicas provocan oliguria; la emetina, alcaloide contenido en algunas plantas rubiáceas, es utilizado en el tratamiento de la disentería amebiana, sin embargo una sobredosis induce el vaciado gastrointestinal en forma de violentas diarreas coleriformes y vómitos (de allí su nombre); la digitalina, es un glucósido obtenido del digital común que actúa regularizando el ritmo cardiaco mediante el aumento del tono del músculo cardiaco y disminuyendo la frecuencia cardiaca prolongando de esta forma el período de relajación entre sístole. Pero si se ingiere una cantidad mayor del glucósido, se provocan arritmias cardiacas y trastornos del pulso.

La alergología, como ya se anotaba anteriormente, usa el principio de similitud y el principio de la infinitesimalidad en sus métodos terapéuticos modernos. Debemos apuntar entonces, que la homeopatía como método terapéutico de la medicina se fundamenta en principios terapéuticos y biológicos vigentes que son utilizados en muchos otros métodos terapéuticos de la medicina convencional, pero que según los enunciados de Arndt y Schulz actúan estimulando o fortaleciendo las reacciones inmunológicas del organismo mediante concentraciones débiles en lugar de suprimir o inhibir mecanismos fisiológicos de defensa mediante estímulos fuertes que progresivamente han de ser intensificados.

El doctor Constantin Hering (1800-1880), quien en un principio fue un gran detractor de las ideas postuladas por Hahnemann, fue paulatinamente adquiriendo la convicción no solamente del alto valor terapéutico de las sustancias homeopáticas, sino también llegó a defender y difundir enunciados que después de más de un siglo siguen siendo válidos para la terapia homeopática moderna. Se trata de la observación de la evolución patológica del paciente, lo que la homeopatía llama tradicionalmente vicariación, la que según Hering debe cumplir con 4 principios para garantizar la curación y evitar la cronificación de las enfermedades. Estos principios son:

- la sintomatología debe desplazarse desde arriba hacia abajo.
- la sintomatología debe desplazarse desde adentro hacia fuera.
- las afecciones deben desplazarse desde órganos de mayor importancia vital hacia órganos o tejidos de menor importancia vital.
- la desaparición de los síntomas debe ser inversa a la aparición cronológica en el paciente.

Durante los siglos XIX y XX el estudio de los medicamentos homeopáticos integró las experiencias obtenidas por una larga lista de investigadores de tres formas principalmente:

- la experimentación patogenética, es decir, la administración de sustancias activas desde el punto de vista farmacodinámico a individuos sanos (en ausencia de una evolución patológica) en dosis crecientes pero subtóxicas con el objetivo de documentar y estudiar las alteraciones fisiológicas con signos y síntomas comunes.
- la toxicología, que aporta el conocimiento existente de las alteraciones fisiopatológicas y lesiones anatomopatológicas provocadas por intoxicaciones accidentales de sustancias farmacológicamente activas.
- la experimentación terapéutica, es decir, la comprobación mediante la observación clínica de la efectividad de la acción terapéutica de cada medicamento homeopático sobre los signos y síntomas patogenéticos y toxicológicos que han sido tratados mediante la administración del medicamento, sea este unitario o complejo.

Sin embargo, en la práctica médica moderna se presentan constantemente conjuntos de signos y síntomas asociados a procesos patológicos complejos que son difícilmente incluidos en la patogenesia de un medicamento homeopático unitario. Por otro lado se puede identificar una multiplicidad de estímulos desequilibrantes a los que hoy en día es sometido todo organismo humano, incluyendo factores alimenticios, emocionales, toxicológicos, genéticos y medioambientales por citar solamente algunos, y de ahí se justifica la prescripción de más de un medicamento homeopático o bien la creciente tendencia actual al uso de los medicamentos homeopáticos complejos como agentes medicamentosos que dirigen su potencial terapéutico hacia una determinada entidad patológica de manera integral. Recordamos entonces que el profesor de farmacología suizo Emil Bürgi demostró en 1910 que dos fármacos diferentes pero cuya acción terapéutica es semejante, producen de manera combinada efectos terapéuticos superiores al sumatorio de los efectos terapéuticos individuales cuando se combinan (sinergia), aún cuando las dosis de estos sean mínimas. Es por ello que la casa RECKEWEG ofrece al profesional de la medicina una gama de medicamentos homeopáticos combinados que han sido desarrollados y probados durante décadas y son conocidos hoy como una alternativa eficaz y segura en el tratamiento de una gran cantidad de patologías.

La homeopatía en el siglo XXI ofrece varias alternativas de tratamiento para una gran variedad de afecciones, pero es el medicamento homeopático, el que basado en un correcto diagnóstico clínico y en función de las indicaciones de cada medicamento se presenta como la alternativa más práctica, fiable y efectiva en la mayoría de los casos. Si bien es cierto que los medicamentos homeopáticos simples, aunque de más difícil elección, son una excelente alternativa, especialmente para los médicos que gozan de gran experiencia en el campo de la homeopatía.

NORMAS GENERALES PARA EL ADECUADO USO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

En cuanto a la forma de administración de los medicamentos homeopáticos, como normas de carácter general debe tenerse en cuenta que las potencias homeopáticas bajas (D1 a D6) son las más recomendables para el tratamiento de afecciones localizadas y procesos agudos siendo las potencias homeopáticas superiores a D4 consideradas en la UE como las más seguras. Por otra parte, las potencias homeopáticas medias (D6 a D12) son las más apropiadas para el tratamiento de afecciones generalizadas y procesos subagudos, mientras que las potencias homeopáticas altas (D12 a D30) y muy altas (superiores a D30) son las idóneas para el tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas así como en el caso afecciones psíquicas graves.

La frecuencia de administración de los medicamentos homeopáticos se determina en función de la agudeza o cronicidad de las afecciones tratadas, así como de la respuesta obtenida en cada individuo, de manera que a mayor agudeza de la sintomatología, la frecuencia de administración es mayor debiendo disminuir dicha frecuencia tras la mejoría en la sintomatología presentada; de manera análoga, la frecuencia de administración es menor a medida que la afección se presenta más crónica o persistente.

TODO COMENZÓ CON EL LABORATORIO EUPHA

Los comienzos de nuestra empresa familiar con sus actividades en todo el mundo se remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En aquellos tiempos, el médico naturalista Heinrich Reckeweg (1877-1944), natural de Hedford, fundó el "Laboratorio EUPHA" y desarrolló sobre la base del principio de semejanza de Hahnemann los primeros medicamentos complejos. En 1947, el médico homeopático Dr. Med. Alfred Reckeweg y su hermano Klaus-Günther fundaron la empresa RECKEWEG con su nombre actual.

La PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR. RECKEWEG & CO. GMBH establecida en Bensheim ha respondido a las exigencias internacionales de demanda y normas de calidad, y actualmente es dirigida por Klaus-Günther Reckeweg y su hijo Michael Reckeweg. Aunque han conducido a la empresa dentro de una ruta de modernidad, se ha conservado la herencia del fundador de la empresa Heinrich Reckeweg, quien en su laboratorio EUPHA (en griego: bueno) se había sentido obligado a fabricar medicamentos altamente efectivos y que fuesen al mismo tiempo bien tolerados. Esta tradición es precisamente la que ha conducido al éxito universal de los medicamentos fabricados por la casa RECKEWEG.

LA INVESTIGACIÓN AL SERVICIO DE LA HOMEOPATÍA

Los esfuerzos de la casa RECKEWEG por desarrollar productos de alto valor terapéutico la han conducido al reconocimiento y a la difusión de los medicamentos de RECKEWEG por todo el mundo, siendo apreciados como medicamentos seguros en más de 30 países de todos los continentes. Este éxito se debe primordialmente a las formulaciones balanceadas de los medicamentos complejos que son elaboradas y probadas por los colaboradores de RECKEWEG en trabajos de investigación propios. Sin embargo, este éxito se ve respaldado por las más modernas instalaciones de producción, aparatos y procedimientos apropiados, un sistema eficaz de control y un equipo científico y técnico de colaboradores muy cualificados.

La empresa familiar RECKEWEG es miembro de la Asociación Federal de la Industria Farmacéutica en cuyas comisiones cooperan de forma activa sus expertos. La Autoridad Nacional de Control considera la firma RECKEWEG como una empresa modelo y la presenta como tal a visitantes del extranjero. Durante los últimos años se han venido intensificando las inversiones en el ámbito de la investigación. En el campo galénico se efectúan trabajos de perfeccionamiento y desarrollo de nuevos productos, mientras que en el terreno analítico se colabora voluntariamente con la Autoridad Nacional de Sanidad y se coopera en la realización de nuevas monografías para la Farmacopea Homeopática Alemana (DHP).

En vista de la contradicción tan pronunciada entre los éxitos terapéuticos de innumerables prácticas en el campo de la homeopatía y el escepticismo sistemático de la medicina convencional respecto a este método terapéutico, desde hace algunos años hemos organizado y estructurado procedimientos de investigación de manera sistemática. Con este propósito se estableció un departamento científico especial, que entre otras cosas, realiza exámenes clínicos de preparados ya existentes con la intención de definir y ampliar las experiencias, acción que se facilita tras la aplicación de métodos estadísticos estandarizados y la evaluación mediante PED. En combinación con proyectos existentes de investigación en este terreno, además de los ensayos con productos preparados ya existentes, se realizan investigaciones primarias con el propósito de investigar el efecto y la eficacia terapéutica de las diferentes diluciones homeopáticas. En la investigación clínica se elaboran modelos de acción que favorecen la individualización de las terapias mediante la comparación terapéutica, asegurando al mismo tiempo la confianza estadística de los resultados. En esta investigación básica independiente de productos ya existentes, el objetivo excede en mucho del ámbito primario de la empresa. Con la elaboración de modelos científicos para probar la eficiencia de potencias homeopáticas altas (no materiales), la investigación en la casa RECKEWEG toma como punto de partida otros trabajos de investigación nacionales e internacionales. Entretanto estos trabajos están tan adelantados que se puede comenzar a presentarlos al público y a la comunidad científica internacional. Desde hace algún tiempo, existen además de la publicación de resultados de investigaciones en revistas especializadas en la materia, los informes DSR que se publican regularmente poniendo a la disposición del médico todo el material publicado en las revistas especializadas. Además, se realizan de forma periódica simposios donde se presentan los resultados de las últimas investigaciones en homeopatía y donde se tiene asimismo la posibilidad de discutir cuestiones de interés médico en conversaciones personales con representantes de la casa RECKEWEG.

LA CALIDAD ES LA MEJOR RECOMENDACIÓN

En lo que se refiere a calidad no se aceptan compromisos. Es por esto que, la casa RECKEWEG considera los controles de las materias primas uno de los pasos más importantes para una producción de medicamentos en la que se cultiva un especial sentido de responsabilidad y calidad.

Aunque los materiales biológicos utilizados provienen de proveedores selectos y todos ellos se reciben acompañados de los correspondientes certificados, la casa RECKEWEG realiza en sus propios laboratorios minuciosos exámenes complementarios para comprobar la conformidad con monografías de la farmacopea y con especificaciones adicionales de la propia empresa. En los controles rutinarios las materias primas son sometidas a exámenes organolépticos, químicos, fisicoquímicos, microbiológicos y farmacognósticos. Incluyen la comprobación de la pureza, de la identidad y de la concentración, así como la recolección de parámetros físicos. Solamente las materias primas que reciben el visto bueno personal del jefe de control son entregadas al departamento de producción.

Los medicamentos de la casa RECKEWEG deben su alto nivel de calidad a un método de producción que, en conformidad estricta con la Farmacopea Homeopática statto (HAB), la Farmacopea Homeopática Alemana (DAB) y la Farmacopea Europea statto (Ph.Eur.), también respeta la normas de fabricación nacionales (PharmBetrO) e internacionales (GMP, PIC). Teniendo en cuenta estas prescripciones y normas, se han establecido para todos los productos instrucciones escritas que describen detalladamente el proceso de producción desde la materia prima hasta el producto final terminado.

Mientras que se dispone de instalaciones completamente automáticas para el envase y el empaque, la potenciación se realiza sin medios auxiliares técnicos aplicando la agitación manual de acuerdo con el método de varios recipientes.

El jefe de producción, responsable del proceso de fabricación, dispone de un equipo de colaboradores cualificados, que a través de cursos regulares de perfeccionamiento se mantienen constantemente actualizados a nivel científico y técnico.

Gracias a la toma de medidas adecuadas se puede excluir la posibilidad de equivocaciones y contaminaciones cruzadas durante el proceso de fabricación, envase y almacenamiento.

TODO BAJO CONTROL

El sistema de control de calidad de la Fábrica Farmacéutica DR. RECKEWEG & CO. GMBH no está basado solamente en un control riguroso de entrada, sino también y sobre todo en amplios controles realizados durante el proceso de producción. Estos comprenden el examen de los protocolos de producción, el control de todas las fases intermedias, incluyendo la materia prima, y la vigilancia del envase y del empaque final. Por fin, en la última etapa de producción, el producto terminado y embalado es sometido a un control final. Todos los controles se efectúan basados en instrucciones escritas y auxiliados con los más modernos aparatos y métodos de examen utilizados en la actualidad y de acuerdo a los últimos avances científicos y tecnológicos aplicables a cada caso específicamente. También forma parte del sistema de control de calidad la documentación de todos los protocolos de producción y examen. Los documentos individuales de cada lote se conservan por más de 5 años.

En la casa RECKEWEG, se realizan además pruebas de estabilidad para poder garantizar una calidad continua de los preparados de almacenamiento prolongado.

La fabricación de productos de alta calidad requiere la aplicación de la técnica más reciente para el envasado y embalaje. Instalaciones envasadoras y empacadoras completamente automáticas evitan que el personal entre en contacto con el producto, posibilitando de esta forma la producción de medicamentos higiénicamente perfectos.

Debido a que en las instalaciones se trabaja siempre con un solo producto y que se guardan barreras físicas y una distancia suficiente entre las instalaciones, pueden evitarse completamente equivocaciones o contaminaciones cruzadas.

Asimismo el personal de servicio tiene que documentar, con fecha y nombre cada etapa en el proceso de producción en fichas para cada lote particular. El laboratorio de control exige además muestras de producto terminado y embalado, que tienen que ser extraídas según un plan de muestreo al azar. Solamente los lotes autorizados por el jefe de producción y control pasan al almacén de venta.

Los preparados de la casa RECKEWEG son reconocidos en una gran variedad de países, entre los cuales destacan la República Federal de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Holanda, Hong Kong, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenya, Luxemburgo, Malasia, Nigeria, Noruega, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Suecia, Suiza, Sudáfrica, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos; y han probado durante décadas de aplicación que son efectivos, bien tolerados y libres de efectos secundarios.



RELACIÓN DE
ESPECIALIDADES BIOLÓGICAS

Dr. Reckeweg® R 1

Inflamaciones agudas y crónicas.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 2

Enfermedades coronarias y del corazón.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 3

Insuficiencia cardiaca.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 4

Diarrea.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 5

Afecciones gástricas y del duodeno.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 6

Catarro y gripe.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 7

Afecciones orgánicas y funcionales del hígado y vesícula biliar.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 8

Tos seca y productiva. Afecciones de vías respiratorias altas.
Jarabe.

Dr. Reckeweg® R 9

Tos seca. Afecciones de vías respiratorias altas.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 10

Menopausia.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 11

Dolor de espalda. Afectación muscular. Lumbago. Hernia discal. Reumatismo.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 12

Arterioesclerosis.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 13

Hemorroides.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 14

Insomnio y estados de excitabilidad nerviosa.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® Vita-C 15.

Sedante reconstituyente para los estados de agotamiento nervioso.
Jarabe.

Dr. Reckeweg® Vita-C 15 Forte.

Tónico reconstituyente para los estados de agotamiento nervioso.
Ampollas bebibles.

Dr. Reckeweg® R 16

Cefaleas de repetición. Migraña.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 17

Hiperplasia benigna de diversa etiología.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 18

Cistitis y nefritis.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 19

Regulación de la función glandular masculina.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 20

Regulación de la función glandular femenina.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 21

Tratamiento constitucional de la piel.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 22

Alteraciones cardiacas de origen nervioso.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 23

Eczemas.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 24

Inflamaciones de la pleura y otras membranas serosas.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 25

Afecciones de la próstata.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 26

Estimulación de las defensas del organismo.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 27

Litiasis renal.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 28

Metrorragias y menorragias.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 29

Vértigos. Pérdida de memoria.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 30

Procesos inflamatorios y medicina del deporte.
Pomada.

Dr. Reckeweg® R 31

Anemia y falta de apetito.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 32

Hipersudoración.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 33

Tratamiento constitucional de la epilepsia.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 34

Trastornos en el metabolismo del calcio y del crecimiento óseo.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 35

Trastornos de la dentición.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 36

Tics. Hiperactividad.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 37

Meteorismo, cólicos intestinales, estreñimiento.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 38

Afecciones del abdomen (costado derecho).
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 39

Afecciones del abdomen (costado izquierdo).
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 40

Coadyuvante en diabetes mellitus.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 41

Neurastenia y debilidad sexual masculina.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 41 Forte

Neurastenia y debilidad sexual masculina.
Ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 42

Varices y otras afecciones venosas.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 43

Tratamiento constitucional del asma.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 44

Hipotensión.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 45

Laringitis. Afonía.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 46

Artritis y reumatismo de las articulaciones de hombro y extremidad superior.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 47

Inestabilidad nerviosa e histeria.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 48

Patología pulmonar crónica.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 49

Sinusitis y rinitis.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 50

Lumbalgia de etiología ginecológica.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 51

Hipertiroidismo.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 52

Malestar y mareo en viajes. Cinetosis.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 53

Acné.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 54

Pérdida de memoria.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 55

Heridas, lesiones, traumatismos.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 56

Vermífugo.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 57

Insuficiencia pulmonar.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 58

Edema cardiaco.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 59

Sobrepeso. Hipotiroidismo.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 60

Depurativo general.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 61

Reumatismo, lumbago, ciática.
Pomada.

Dr. Reckeweg® R 62

Inflamaciones de las mucosas. Sarampión y rubeola.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 63

Afecciones de la circulación periférica.
Raynaud. Sabañones. Calambres musculares.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 64

Albuminuria.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 65

Psoriasis.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 66

Arritmia cardíaca.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 67

Insuficiencia circulatoria aguda y crónica.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 68

Herpes zóster y varicela.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 69

Neuralgias intercostales.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 70

Dolores neurálgicos de diversa localización especialmente en cabeza.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 71

Ciática.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 72

Afecciones pancreáticas.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 73

Artrosis.
Gotas y ampollas inyectables (también bebibles).

Dr. Reckeweg® R 74

Debilidad de la vejiga.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 75

Dismenorrea.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 76

Tratamiento constitucional del asma.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 77

Síndrome de abstinencia al tabaco, y síntomas resultantes de un consumo excesivo de éste.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 78

Afecciones oculares.
Gotas.

Dr. Reckeweg® R 80

Lesiones musculares, entumecimiento articular.
Aceite.

Dr. Reckeweg® R 81

Tratamiento del dolor.
Gotas.

Dr. Reckeweg® Cicatín - Jugo de caléndula

Heridas de difícil cicatrización.
Jugo.

Dr. Reckeweg® R 95 - Tónico de alfalfa

Anemia, pérdida de apetito, convalecencia, apoyo al crecimiento.
Jarabe.

Dr. Reckeweg® Pulsatilla compositum nasal spray

Congestión nasal.
Spray nasal.



ESPECIALIDADES
BIOLÓGICAS

ESPECIALIDADES BIOLÓGICAS

ÍNDICE

Dr. Reckeweg® R 1.....	16
Dr. Reckeweg® R 2.....	17
Dr. Reckeweg® R 3.....	18
Dr. Reckeweg® R 4.....	19
Dr. Reckeweg® R 5.....	20
Dr. Reckeweg® R 6.....	21
Dr. Reckeweg® R 7.....	21
Dr. Reckeweg® R 8.....	22
Dr. Reckeweg® R 9.....	23
Dr. Reckeweg® R 10.....	24
Dr. Reckeweg® R 11.....	25
Dr. Reckeweg® R 12.....	26
Dr. Reckeweg® R 13.....	27
Dr. Reckeweg® R 14.....	28
Dr. Reckeweg® Vita-C 15.....	29
Dr. Reckeweg® Vita-C 15 Forte	30
Dr. Reckeweg® R 16.....	31
Dr. Reckeweg® R 17.....	32
Dr. Reckeweg® R 18.....	33
Dr. Reckeweg® R 19.....	33
Dr. Reckeweg® R 20.....	34
Dr. Reckeweg® R 21.....	35
Dr. Reckeweg® R 22.....	35
Dr. Reckeweg® R 23.....	36
Dr. Reckeweg® R 24.....	37
Dr. Reckeweg® R 25.....	38
Dr. Reckeweg® R 26.....	38
Dr. Reckeweg® R 27.....	39
Dr. Reckeweg® R 28.....	40
Dr. Reckeweg® R 29.....	40
Dr. Reckeweg® R 30.....	41
Dr. Reckeweg® R 31.....	42
Dr. Reckeweg® R 32.....	42
Dr. Reckeweg® R 33.....	43
Dr. Reckeweg® R 34.....	44
Dr. Reckeweg® R 35.....	45
Dr. Reckeweg® R 36.....	45
Dr. Reckeweg® R 37.....	46
Dr. Reckeweg® R 38.....	46
Dr. Reckeweg® R 39.....	47
Dr. Reckeweg® R 40.....	48
Dr. Reckeweg® R 41.....	48
Dr. Reckeweg® R 41 Forte	49

Dr. Reckeweg® R 42.....	50
Dr. Reckeweg® R 43.....	51
Dr. Reckeweg® R 44.....	52
Dr. Reckeweg® R 45.....	52
Dr. Reckeweg® R 46.....	53
Dr. Reckeweg® R 47.....	54
Dr. Reckeweg® R 48.....	54
Dr. Reckeweg® R 49.....	55
Dr. Reckeweg® R 50.....	56
Dr. Reckeweg® R 51.....	56
Dr. Reckeweg® R 52.....	57
Dr. Reckeweg® R 53.....	58
Dr. Reckeweg® R 54.....	58
Dr. Reckeweg® R 55.....	59
Dr. Reckeweg® R 56.....	60
Dr. Reckeweg® R 57.....	61
Dr. Reckeweg® R 58.....	62
Dr. Reckeweg® R 59.....	62
Dr. Reckeweg® R 60.....	63
Dr. Reckeweg® R 61.....	64
Dr. Reckeweg® R 62.....	64
Dr. Reckeweg® R 63.....	65
Dr. Reckeweg® R 64.....	66
Dr. Reckeweg® R 65.....	66
Dr. Reckeweg® R 66.....	67
Dr. Reckeweg® R 67.....	68
Dr. Reckeweg® R 68.....	68
Dr. Reckeweg® R 69.....	69
Dr. Reckeweg® R 70.....	70
Dr. Reckeweg® R 71.....	70
Dr. Reckeweg® R 72.....	71
Dr. Reckeweg® R 73.....	72
Dr. Reckeweg® R 74.....	72
Dr. Reckeweg® R 75.....	73
Dr. Reckeweg® R 76.....	74
Dr. Reckeweg® R 77.....	74
Dr. Reckeweg® R 78.....	75
Dr. Reckeweg® R 80.....	76
Dr. Reckeweg® R 81.....	77
Dr. Reckeweg® Cicatín - Jugo de caléndula	78
Dr. Reckeweg® R 95 - Tónico de alfalfa	78
Dr. Reckeweg® Pulsatilla compositum nasal spray.....	79

Dr. Reckeweg® R 1

Inflamaciones agudas y crónicas.

Gotas y ampollas inyectables (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

ANGINACID

Gotas: *Apis* D4 1,00 g, *Belladonna* D4 1,00 g, *Calcium iodatum* D4 1,00 g, *Hepar sulfuris* D12 1,00 g, *Kalium bichromicum* D4 0,01 g, *Lachesis* D12 1,00 g, *Marum verum* D6 1,00 g, *Mercurius sublimatus corrosivus* D5 1,00 g, *Phytolacca* D4 1,00 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 1,99 g, 36% vol. alcohol.

R 1 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Apis* D4 0,2 g, *Barium chloratum* D6 0,2 g, *Belladonna* D4 0,2 g, *Calcium iodatum* D4 0,2 g, *Hepar sulfuris* D12 0,2 g, *Kalium bichromicum* D6 0,2 g, *Lachesis* D12 0,2 g, *Marum verum* D6 0,2 g, *Mercurius sublimatus corrosivus* D8 0,2 g, *Phytolacca* D4 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Amigdalitis, inflamaciones agudas y crónicas, otitis media, inflamaciones linfáticas.

Advertencias:

Gotas: hipersensibilidad al cromo; insuficiencia renal. No debe administrarse a bebés ni a niños menores de 6 años, ni debe utilizarse durante el embarazo ni el periodo de lactancia. Si existe una enfermedad tiroidea, no debe utilizarse el preparado sin consultar previamente al médico.

Ampollas: hipersensibilidad al cromo; insuficiencia renal. No debe administrarse a bebés ni a niños menores de 6 años, ni debe utilizarse durante el embarazo ni el periodo de lactancia. Si existe una enfermedad tiroidea, no debe utilizarse el preparado sin consultar previamente al médico.

No administrar en casos de hipersensibilidad al veneno de abeja.

En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto sucede, debe suspenderse el tratamiento. Puede producirse sialorrea después de utilizar el preparado; en este caso, debe suspenderse el tratamiento.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 2-3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Ampollas: 1 ampolla 2 veces a la semana por vía subcutánea u oral.

Duración del tratamiento: no administrar durante más de una semana sin consultar al especialista.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Apis*: edema inflamatorio, pinchazos.

-*Barium chloratum*: resfriados, linfadenitis.

-*Belladonna*: enfriamiento, tumefacción de los ganglios, amigdalitis, catarro crónico nasal.

-*Calcium iodatum*: amigdalitis crónica infantil, tumefacción de los ganglios en el cuello.

-*Hepar sulfuris*: tendencia a inflamaciones catarrales y supuraciones.

-*Kalium bichromicum*: exudación plástica de la mucosa, de la laringe y faringe. Ulceraciones de la mucosa.

-*Lachesis*: infecciones sépticas, congestión de la garganta, debilidad del corazón y de la circulación.

-*Marum verum*: adenitis vegetativa, catarro crónico de la cavidad nasal.

-*Mercurius sublimatus corrosivus*: ulceraciones y secreciones sanguinolentas de la pituitaria. Secreciones purulentas. Sudor pegajoso.

-*Phytolacca*: hinchazón, oscurecimiento de la laringe, dolores hasta en las orejas.

En casos de:

Adenitis-parametritis. Complementar con R 38 o R 39, 2-3 veces al día.

Albúmina en la orina después de anginas y en caso de nefritis. Complementar con R 64.

Anexitis, parametritis. Ver R 38 o R 39.

Apendicitis aguda. Hasta su posible intervención quirúrgica, complementar con R 24 y R 38, cada 1-2 horas 10-15 gotas.

Bronquitis crónica catarral. Ver R 48 y R 57.

Bronquitis crónica espástica. Ver R 8 y R 9.

Bronquitis y traqueítis. Ver R 6, R 8 y R 9.

Catarro agudo y crónico de la mucosa nasal. Ver Pulsatilla compositum nasal spray.

Cistitis, pielitis. Ver R 18.

Conjuntivitis. Ver R 78.
Dolor de muelas o dientes de los niños. Complementar con R 35.
Faringo-laringitis. Ver R 45.
Gripe. Ver R 6.
Inflamación crónica del apéndice. 10-15 gotas 1 vez al día R 1. Ver R 24 y R 38.
Nefritis. Ver R 27.
Ovaritis. Complementar alternando con R 24.
Pancreatitis. Ver R 72.
Pleuritis. Ver R 24.
Poliartritis aguda. Es conveniente que se trate alternando R 1 con R 24, comenzando la toma cada 1-2 horas.
Reumatismo articular crónico. Ver R 46.
Reumatismo muscular. Ver R 11.
Sinusitis aguda y crónica. Ver R 49.
Supuraciones fuertes. Complementar con R 53.
Tos. Ver R 8 y R 9.

Dr. Reckeweg® R 2

Enfermedades coronarias y del corazón.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

AURIN

Gotas: *Aconitum* D6 1,0 g, *Arnica* D3 1,0 g, *Aurum chloratum* D6 1,0 g, *Cactus* D4 1,0 g, *Crataegus* Ø 0,5 g, *Digitalis* D3 1,0 g, *Laurocerasus* D3 1,0 g, *Spigelia anthelmia* D3 1,0 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 2,5 g. 47% vol. alcohol.

R 2 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Aconitum* D6 0,2 g, *Arnica* D4 0,2 g, *Aurum chloratum* D6 0,2 g, *Cactus* D4 0,2 g, *Crataegus* D4 0,1 g, *Digitalis* D4 0,2 g, *Ignatia* D6 0,2 g, *Kalium phosphoricum* D4 0,1 g, *Laurocerasus* D4 0,2 g, *Spigelia anthelmia* D4 0,2 g, *Valeriana* D4 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Coadyudante en cardiopatías tales como insuficiencia o esclerosis coronaria, angina de pecho, prevención de infarto cardiaco, distonía vegetativa.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, administrar únicamente bajo control médico. No administrar a niños menores de 12 años.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla de 2 a 3 veces a la semana por vía subcutánea u oral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Aconitum:** excitación del corazón, angina de pecho con sensación de dolor en el brazo izquierdo y entumecimiento.
- Arnica:** angustia, presión en el pecho.
- Aurum chloratum:** hipertensión, presión en el pecho. Congestión de la cabeza.
- Cactus:** presiones en el pecho, estenocardia, taquicardia.
- Crataegus:** tónico para congestiones del corazón y del sistema circulatorio, corazón senil.
- Digitalis:** deficiencia cardiaca. Extenuación general y anemia.
- Ignatia:** estenocardia nerviosa, especialmente después de aflicciones y preocupaciones. Globo histérico.
- Kalium phosphoricum:** debilidad del miocardio con agotamiento general nervioso y anemia. Trastornos excitoconductores.
- Laurocerasus:** cianosis con debilidad del miocardio. Presiones y dolores en el pecho.

-*Spigelia anthelmia*: taquicardia, punzadas y dolores con sensaciones punzantes en el brazo izquierdo.

-*Valeriana officinalis*: intranquilidad de carácter nervioso, hipersensibilidad, palpitación cardiaca. Sedante.

En casos de:

Angina con foco en vesícula biliar. Complementar con R 7.

Angina por neurosis de órgano. Ver R 22.

Arritmia cardiaca. Ver R 66 o R 22.

Arterioesclerosis e hipertensión. Ver R 12.

Astenia miocárdica. Complementar con R 3.

Complejo de síntomas gastrointestinales. R 5 1-2 veces al día.

Dolores alrededor del corazón con síndrome de hipertiroidismo. Ver R 51.

Dolores alrededor del corazón con síndrome histérico. Ver R 47.

Infarto cardiaco agudo. R 2, R 67 y R 55 cada 1/2 hora-1-2 horas. Se trata secundariamente con R 3 o R 44.

Insuficiencia cardiaca. Ver R 3.

Profilaxis de la esclerosis vascular y coronaria. Ver R 12.

Síndrome gastro-cardiaco. Ver R 5 y R 7.

Síntomas de descompensación. Ver R 58.

Dr. Reckeweg® R 3

Insuficiencia cardiaca.

Gotas.

Composición:

CORVOSAN

Gotas: Arsenicum album D5 0,5 g, *Cactus* D2 1,0 g, *Crataegus* Ø 2,0 g, *Digitalis* D3 1,0 g, *Kalium carbonicum* D3 0,5 g, *Kalmia* D3 1,0 g, *Phosphorus* D5 1,0 g, *Scilla* D2 1,0 g, *Spigelia anthelmia* D3 1,0 g, *Strophanthus* D3 1,0 g. 40% vol. alcohol.

Indicaciones:

Tratamiento complementario y prevención de la insuficiencia cardiaca.

Postinfarto.

Advertencias:

Durante el embarazo, periodo de lactancia, administrar únicamente bajo control médico. No administrar a niños menores de 12 años.

Posología:

Gotas: tomar 10 gotas disueltas en un poco de agua, 3-6 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Arsenicum album*: degeneración del miocardio, debilidad del miocardio general con estado subjetivo de miedo nocturno, falta de aire.

-*Cactus*: presiones en el pecho con taquicardia.

-*Crataegus*: debilidad del miocardio con tendencias a descompensación, hipotensión.

-*Digitalis*: insuficiencia cardiaca con dilataciones.

-*Kalium carbonicum*: endo-miocarditis con debilidad cardiaca y circulatoria.

-*Kalmia*: dolores del corazón con sensación de entumecimiento en el brazo izquierdo. Endocarditis aguda y crónica. Complicaciones después de un reumatismo.

-*Phosphorus*: degeneración del miocardio. Extenuación nerviosa general.

-*Scilla*: Insuficiencia circulatoria con trastornos del ritmo. Síntomas de descompensación.

-*Spigelia anthelmia*: taquicardia, pulso debil. Endo-miocarditis.

-*Strophanthus*: tónico cardiaco efectivo.

En casos de:

Angina de pecho. Ver R 2.

Arritmia cardiaca. Ver R 22.

Astenia cardiaca con astenia cardiocirculatoria y lipotimia. Ver R 67.

Astenia cardiaca en bronquitis. Ver R 48.

Astenia cardiaca en hipertiroidismo. Ver R 51.

Astenia miocárdica en peri y endocarditis. Ver R 24.

Descompensación. Ver R 58.

Infarto cardiaco. Ver R 67, R 2 y R 3.
Miocardioesclerosis con arritmia. Ver R 66.
Miocardioesclerosis con insuficiencia coronaria. Ver R 2.
Miocarditis y endocarditis. Complementar con R 3 o R 22.
Síntomas de descompensación. Ver R 58.

Dr. Reckeweg® R 4

Diarrea.
Gotas.

Composición: ENTEROCOLIN

Gotas: *Acidum phosphoricum* D3 1 g, *Chamomilla* D4 1 g, *Colocynthis* D6 1g, *Mercurius sublimatus corrosivus* D5 1 g, *Oleander* D6 1 g, *Rhus toxicodendron* D4 1 g, *Veratrum album* D6 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 3 g. 38% vol. alcohol.

Indicaciones:

Gastroenteritis agudas y crónicas, diarreas de verano.

Advertencias:

Hipersensibilidad al zumaque venenoso; insuficiencia renal.
No debe administrarse a bebés ni infantes, ni debe utilizarse durante el embarazo ni el periodo de lactancia.
Puede producirse sialorrea después de utilizar el preparado; en este caso, debe suspenderse el tratamiento. Raramente pueden producirse molestias gastrointestinales o pueden darse reacciones cutáneas (*Rhus toxicodendron*). En estos casos, la terapia debe ser interrumpida.

Duración del tratamiento:

No debe utilizarse más de 1 semana sin consultar al médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.
Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.
Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Acidum phosphoricum*: diarreas agudas y crónicas con fiebre y somnolencia.
- Chamomilla*: defecaciones acuosas después de resfriados y cólicos abdominales.
- Colocynthis*: defecaciones disintéricas con espasmos en el intestino.
- Mercurius sublimatus corrosivus*: defecaciones mucosas y sanguinolentas. Cólicos fuertes. Tenesmo rectal.
- Corrosivus*: tenesmo rectal.
- Oleander*: defecaciones violentas no digestivas con diarreas.
- Rhus toxicodendron*: diarreas acuosas, mucosas y sanguinolentas.
- Veratrum album*: vómitos y diarreas con frío corporal y colapso. Diarreas de verano.

En casos de:

Artropatía enteropática. Ver R 46 y R 24.
Diarrea complicada con hipotensión. Complementar con R 44.
Diarrea con cólico abdominal. Ver R 37.
Enteritis con complicación hemorroidal. Ver R 13.
Enterocolitis asociada a pancreatitis. Ver R 72.
Enterocolitis influenza. Ver R 6.
Enterocolitis con recidiva. Ver R 26.
Espasmos en el intestino. Complementar con R 37.
Gastroenteritis. Ver R 5.
Gastroenteritis con vómito. Ver R 5 y R 52.
Pancreatitis. Ver R 72.
Recidiva de las fuerzas defensivas, complementar con R 26 de 10-15 gotas 1 o 2 veces al día.
Reconvalecencia. Ver Vita-C 15, R 95.

Dr. Reckeweg® R 5

Afecciones gástricas y del duodeno.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

GASTREU

Gotas: *Anacardium* D6 1 g, *Argentum nitricum* D6 1 g, *Arsenicum album* D4 1 g, *Belladonna* D4 1 g, *Carbo vegetabilis* D8 1 g, *Chamomilla* D2 1 g, *Lycopodium* D5 1g, *Nux vomica* D4 1g, *Ethanolum / Aqua purificata* 2 g. 34% vol. alcohol.

R 5 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Anacardium* D6 0,2 g, *Argentum nitricum* D6 0,2 g, *Arsenicum album* D6 0,2 g, *Belladonna* D4 0,2 g, *Carbo vegetabilis* D10 0,2 g, *Chamomilla* D4 0,2 g, *Chelidonium* D4 0,2 g, *Lycopodium* D6 0,2 g, *Nux vomica* D4 0,2 g, *Scrophularia nodosa* D3 0,2 g, en solución Isotónica.

Indicaciones:

Gastritis aguda y crónica, dispepsia, acidez, meteorismo flatulento.

Advertencias:

En el caso de afecciones de cálculos biliares, enfermedades hepáticas o las sufridas con anterioridad y/o simultáneamente a la utilización de sustancias perjudiciales para el hígado, deberá consultar a su médico antes de tomar el medicamento. No tome el medicamento durante el embarazo y el periodo de lactancia. Úsese sólo para adultos.

En algunos casos aislados se han observado durante el tratamiento, incrementos de los valores de la función hepatobiliar (transaminasas) y de la bilirrubina, e incluso la aparición de ictericia causada por el medicamento (hepatitis tóxica medicamentosa), síntomas que remiten al interrumpir la toma del medicamento.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría y hasta una completa recuperación, tomar 10 gotas 1 vez al día, 30 minutos antes de la comida principal. El tratamiento puede prolongarse por un periodo mayor de tiempo.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 3 veces a la semana por vía subcutánea u oral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Anacardium:** dolor estomacal con mejoría después de ingerir alimentos. Irritación y excitación por cualquier motivo. Dolor a media noche.
- Argentum nitricum:** dolor en el epigastrio. Eructación fuerte. Dolores de estómago con vómitos. Curativo de la mucosa.
- Belladonna:** sensibilidad de la región gástrica. Gastritis.
- Carbo vegetabilis:** pesadez en el abdomen, debilidad.
- Chamomilla:** hipersensibilidad nerviosa y excitación.
- Chelidonium:** de acción hepática y biliar, colerético, mejoría de las molestias gástricas al comer.
- Lycopodium:** sensación de pesadez abdominal, cólicos, sabor amargo en la boca.
- Nux vomica:** excitación nerviosa e hipocondría. Distensión abdominal, insuficiencia digestiva.
- Scrophularia nodosa:** retortijones en el epigastrio, hiperacidez, mejoría al comer.

En casos de:

Afecciones hepáticas simultáneas. Ver R 7.
Afecciones pancreáticas simultáneas. Ver R 72.
Cólicos. Ver R 37.
Gastritis con astenia e inapetencia. Ver R 31.
Gastritis con vómito. Ver R 52.
Gastritis del fumador. Complementar con R 77.
Gastritis influenza. Ver R 6.
Gastritis de base nerviosa. Ver R 47.
Gastroenterocolitis. Complementar con R 4.
Síndrome gastrocardíaco. Ver R 2.

Dr. Reckeweg® R 6

Catarro y gripe.
Gotas.

Composición: GRIPFEKTAN

Gotas: *Aconitum* D4 1 g, *Baptisia* D4 1 g, *Bryonia* D4 1g, *Camphora* D3 1 g, *Causticum Hahnemanni* D6 1 g, *Eucalyptus* D3 1g, *Eupatorium perfoliatum* D3 1 g, *Ferrum phosphoricum* D8 1 g, *Gelsemium* D6 1 g, *Sabadilla* D6 1 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Catarro, infecciones gripales con dolor de miembros, medicación de apoyo en caso de gripe.

Advertencias:

No administrar a bebés ni a niños menores de 6 años. Durante el embarazo y periodo de lactancia consulte al especialista antes de tomar este medicamento.

Posología:

Gotas: en procesos agudos que cursan con fiebre tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3-4 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Aconitum:** fiebre y resfriado con inquietud y miedo, piel seca e hiperémica.
- Baptisia:** fiebre tífica, ensordecimiento, sensación de cansancio, esfriado, excitación de la mucosa.
- Bryonia:** fiebre catarral con dolor de cabeza, punzadas al moverse o al respirar, piel seca y serosa, tos irritante, sed.
- Camphora:** analéptico, calmante.
- Causticum Hahnemanni:** mucosa nasal irritada, tos profunda.
- Eucalyptus:** dolor de cabeza con fiebre, mucosa irritada.
- Eupatorium perfoliatum:** fiebre con cansancio general. Inflamaciones de la nariz y de las vías respiratorias altas, mucosa nasal irritada.
- Ferrum phosphoricum:** curativo de fiebre e inflamaciones, pulso lento, inflamaciones de las vías respiratorias altas, bronconeumonía.
- Gelsemium:** cansancio con dolor de cabeza, fiebre.
- Sabadilla:** tos irritante con estornudos.

En casos de:

Anginas. Ver R 1.

Bronquitis. Ver R 8 y R 9.

Catarro agudo y crónico de la mucosa nasal. Ver Pulsatilla compositum nasal spray.

Pleuritis. Ver R 24.

Rinosinusitis. Ver R 49.

Varicela. Complementar con R 68.

Dr. Reckeweg® R 7

Afecciones orgánicas y funcionales del hígado y vesícula biliar.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición: HEPAGALEN

Gotas: *Carduus marianus* D2 1 g, *Chelidonium* D2 1 g, *China* D3 1 g, *Cholesterinum* D6 1 g, *Colocynthis* D6 1 g, *Lycopodium* D4 1 g, *Nux vomica* D4 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 3 g. 39% vol. alcohol.

R 7 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Carduus marianus* D4 0,2 g, *Chelidonium* D4 0,2 g, *China* D4 0,2 g, *Cholesterinum* D6 0,2 g, *Colocynthis* D6 0,2 g, *Lycopodium* D6 0,2 g, *Nux vomica* D4 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Manifestaciones orgánicas y funcionales del hígado y vesícula biliar, así como de los conductos biliares. Medicación de apoyo en caso de hepatitis.

Advertencias:

Hipersensibilidad a la quinina.

El preparado sólo se podrá tomar tras consultar con el médico, si se padece o han padecido cálculos biliares, enfermedades hepáticas y/o se toman de manera simultánea sustancias hepatotóxicas. Está contraindicado en bebés, niños pequeños y durante el embarazo o periodo de lactancia. No administrar a niños menores de 12 años.

En casos individuales se ha observado la aparición de un incremento de los valores de la función hepática (transaminasas) y la bilirrubina, así como hepatitis inducida por el preparado (hepatitis tóxica medicamentosa). Se ha comprobado que estos cuadros remiten cuando se interrumpe la ingestión.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 4-6 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla de 1 a 3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Carduus marianus:** pesadez abdominal, cólicos, náuseas, vómitos.

-**Chelidonium:** curativo del hígado y la vesícula biliar. Sensación de dolor en el ombligo derecho, sabor amargo en la boca, inapetencia, náuseas.

-**China:** debilidad y mareos con sudor, meteorismo, indigestión al ingerir frutas, eructos frecuentes.

-**Cholesterinum:** hipertrofia del hígado, ictericia, colecistitis.

-**Colocynthis:** cólicos con mejoría al presionar, meteorismo.

-**Lycopodium:** hipertrofia del hígado, meteorismo y flatulencia, presencia de ácido úrico en la orina.

-**Nux vomica:** dolores en el epigastrio al presionar en el estómago, ganas de eructar, temperamento colérico.

En casos de:

Colecistitis. Complementar con R 1.

Cólicos hepáticos y espasmos intestinales. Ver R 37.

Enfermedades del estómago y úlceras. Ver R 5 que se puede alternar o complementar.

Pancreatitis. Ver R 72.

Dr. Reckeweg® R 8

Tos seca y productiva. Afecciones de las vías respiratorias altas.

Jarabe.

Composición:**JUTUSSIN**

Jarabe: *Ammonium causticum* D2 1,00 g, *Belladonna* D2 1,00 g, *Bryonia* D2 1,00 g, *Chamomilla* D2 3,00 g, *Coccus cacti* D5 1,00 g, *Corallium rubrum* D10 1,00 g, *Cuprum aceticum* D10 1,00 g, *Drosera* D2 1,00 g, *Ipecacuanha* D3 1,00 g, *Thymus vulgaris* D2 3,00 g, *Saccharum* 40,00 g, *Saccharum tostum* 0,26 g, *Ethanolum / Aqua purificata* ad 100,00 g. 13% vol. alcohol.

Indicaciones:

Tos y afecciones catarrales de las vías respiratorias medias-altas.

Advertencias:

Este producto contiene un 13% de etanol. Cada dosis contiene alrededor de 0,5 g de etanol. Aquellos que padezcan de alguna enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daño cerebral, así como mujeres embarazadas deben tenerlo en cuenta por los efectos negativos que pudiera causarles.

Puede incrementar o modificar los efectos de otros medicamentos.

Posología:

Jarabe: tomar una cucharadita cada 2 horas hasta un máximo de 6 al día, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría tomar 1 cucharadita 3 veces al día.

Bebés de 0 a 12 meses y niños de 2 a 5 años: tomar 1/4 cucharadita mezclada con 3 cucharaditas de leche, hasta un máximo de 4 al día.

Niños de 6 a 12 años: tomar 1/2 cucharadita hasta un máximo de 6 al día. Si se aprecia mejoría hasta un máximo de 3 veces al día.

Nota para diabéticos: una cucharadita de café = 5ml = 0,17 BU (Bread Units).

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Ammonium causticum:** fuerte irritación de la laringe, sensación de ardor e hipersensibilidad de la mucosa, ronquera, tos grave e incesante acompañada de dificultad para respirar.
- Belladonna:** tos espasmódica, tos profunda, mucosa seca.
- Bryonia:** tos seca irritante con dolor en el pecho.
- Chamomilla:** irritación de la laringe, hipersensibilidad de la tráquea, tos incesante o frecuente, ronquera, empeoramiento de los síntomas durante la noche y mejora a través de la transpiración.
- Coccus cacti:** ataques de tos con vómitos, mucosas viscosas.
- Corallium rubrum:** tos espasmódica fuerte acompañada de asfixia.
- Cuprum aceticum:** ataques de tos graves con sofocamiento y sensación de presión en el pecho, espasmos broncomusculares con colapsos y cianosis.
- Drosera:** tos permanente, especialmente durante la noche, con garganta seca y punzadas en el pecho. Espujo hemoptoico, náuseas al toser.
- Ipecacuanha:** tos seca asfixiante con malestares y vómitos.
- Thymus vulgaris:** expectorante.

En casos de:

Anginas. Ver R 1.

Asma. Ver R 43.

Catarro bronquial. Ver R 48 y R 57.

Catarro del fumador. Ver R 77.

Gripe. Ver R 6.

Laringitis. Ver R 45.

Pleuritis. Ver R 24.

Tos con catarro agudo y crónico de la mucosa nasal. Ver Pulsatilla compositum nasal spray.

Tos con rinosinusitis. Ver R 49.

Tos de base nerviosa. Ver R 14.

Dr. Reckeweg® R 9

Tos y afecciones catarrales de las vías respiratorias altas.

Gotas.

Composición:

JUTUSSIN

Gotas: *Belladonna* D4 1 g, *Bryonia* D3 1 g, *Coccus cacti* D6 1 g, *Corallium rubrum* D12 1 g, *Cuprum aceticum* D12 1 g, *Drosera* D4 1 g, *Ipecacuanha* D6 1 g, *Spongia* D6 1 g, *Sticta* D4 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 1 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Tos seca. Afecciones de vías respiratorias altas.

Advertencias:

Si existe una enfermedad de tiroides, no debe utilizarse el preparado sin consultar previamente al médico.

Durante el embarazo y periodo de lactancia, administrar únicamente bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 4-6 veces al día.

Bebés de 0 a 12 meses: tomar 2-3 gotas disueltas en un poco de agua 3-4 veces al día.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas en 1 cucharadita de agua.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas en 1 cucharadita de agua.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Belladonna:** tos espasmódica, tos profunda, mucosa seca.
- Bryonia:** tos seca irritante con dolor en el pecho.

- Coccus cacti**: ataques de tos con vómitos, mucosas viscosas.
- Corallium rubrum**: tos espasmódica fuerte acompañada de asfixia.
- Cuprum aceticum**: ataques de tos graves con sofocamiento y sensación de presión en el pecho, espasmos broncomusculares con colapsos y cianosis.
- Drosera**: tos permanente, especialmente durante la noche, con garganta seca y punzadas en el pecho. Espujo hemoptoico, náuseas al toser.
- Ipecacuanha**: tos seca asfixiante con malestar y vómitos.
- Spongia**: tos seca con empeoramiento al hablar. Despertar con sensación de sofoco.
- Sticta**: resfriado de nariz hasta faringe y tráquea seguido de bronquitis. Presión de la mucosa nasal.

En casos de:

- Anginas. Ver R 1.
- Asma. Ver R 43.
- Catarro bronquial. Ver R 48 y R 57.
- Catarro del fumador. Ver R 77.
- Gripe. Ver R 6.
- Laringitis. Ver R 45.
- Pleuritis. Ver R 24.
- Tos con catarro agudo y crónico de la mucosa nasal. Ver Pulsatilla compositum nasal spray.
- Tos con rinosinusitis. Ver R 49.
- Tos de base nerviosa. Ver R 14.

Dr. Reckweg® R 10

Menopausia.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:
KLIMAKTERAN

Gotas: *Acidum sulfuricum* D4 1,0 g, *Cimicifuga* D4 1,0 g, *Lachesis* D12 1,0 g, *Sanguinaria* D4 1,0 g, *Sepia trit.* D4 0,1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5,9 g. 36% vol. alcohol.

R 10 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Acidum sulfuricum* D4 0,2 g, *Cimicifuga* D4 0,2 g, *Lachesis* D12 0,2 g, *Sanguinaria* D4 0,2 g, *Sepia* D8 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Manifestaciones del climaterio, sofocos, menstruaciones irregulares.

Advertencias:

En el caso de afecciones de cálculos biliares, enfermedades hepáticas o las sufridas con anterioridad y/o simultáneamente a la utilización de sustancias perjudiciales para el hígado, deberá consultar a su médico antes de tomar el medicamento. No tome el medicamento durante el embarazo y periodo de lactancia.

En algunos casos aislados se ha observado durante el tratamiento, incrementos de los valores de la función hepatobiliar (transaminasas) y de la bilirrubina, e incluso la aparición de ictericia causada por el medicamento (hepatitis tóxica medicamentosa), síntomas que remiten al interrumpir la toma del medicamento. En caso de administrar durante más de 4 semanas seguidas deben controlarse los parámetros hepáticos en sangre.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa. El tratamiento puede prolongarse por un periodo mayor de tiempo.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Acidum sulfuricum**: sofocos con sudor. Debilidad.
- Cimicifuga**: trastornos funcionales endocrinológicos, especialmente en la menopausia. Depresiones y excitaciones.
- Lachesis**: excitación en la circulación de la sangre a la cabeza. Sensación de sofoco que mejora durante la menstruación.
- Sanguinaria**: sensación de congestión de sangre y sudor hasta la cabeza, dolores de cabeza, dismenorrea.

-*Sepia*: efecto hormonal y venoso, bajo rendimiento físico, indiferencia y debilidad. Oleadas de calor seguidas de sudor, irritación y menstruación irregular.

En casos de:

Arritmia cardiaca en menopausia. Ver R 66.
Artrosis en menopausia. Ver R 73.
Cistitis en menopausia. Ver R 18.
Descompensación hormonal. Ver R 20.
Dolores lumbares. Ver R 11 y R 50.
Fibroma uterino en menopausia. Ver R 17.
Globo hístico y cambios de humor. Ver R 47.
Hiperhidrosis. Complementar con R 32.
Insomnio en menopausia. Ver R 14.
Menorragia. Complementar con R 28.
Obesidad climatérica. Ver R 59.
Osteoporosis. Complementar con R 34.
Perimetritis, parametritis y ovaritis. Alternar con R 1 cada 1 o 2 horas y complementar con R 38 o R 39.
Sudoración excesiva. Ver R 32.

Dr. Reckeweg® R 11

Dolor de espalda. Afectación muscular. Lumbago. Hernia discal. Reumatismo.
Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

LUMBAGIN

Gotas: *Berberis vulgaris* D4 1 g, *Calcium phosphoricum* D12 1 g, *Causticum Hahnemanni* D6 1 g, *Dulcamara* D4 1 g, *Nux vomica* D4 1 g, *Rhododendron* D4 1 g, *Rhus toxicodendron* D4 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 3 g. 36% vol. alcohol.

R 11 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Berberis vulgaris* D4 0,2 g, *Calcium phosphoricum* D12 0,2 g, *Causticum Hahnemanni* D6 0,2 g, *Dulcamara* D4 0,2 g, *Nux vomica* D4 0,2 g, *Rhododendron* D4 0,2 g, *Rhus toxicodendron* D4 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Dolores musculares y del aparato locomotor. Lumbago. Enfermedades reumáticas. Ciática por humedad. Espondilartrosis, espondiloartritis anquilopoyética.

Advertencias:

Hipersensibilidad al zumaque venenoso. No administrar a niños menores de 12 años, ni durante el embarazo o periodo de lactancia, excepto bajo control médico.
Raramente pueden darse molestias gastrointestinales y reacciones cutáneas. En estos casos el tratamiento debe ser interrumpido.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Berberis vulgaris*: dolor de espalda con sensación de estar rendido de fatiga, dolores en la región renal, diátesis del ácido úrico.

-*Calcium phosphoricum*: eficaz en caso de una diátesis reumática. Debilidad de la musculatura cervical y la columna vertebral. Empeoramiento al nevar. Dolor de espalda en niños escolares.

-*Causticum Hahnemanni*: dolores lumbares al ponerse de pie. Musculatura lumbar y cervical rígida, articulaciones deformes rígidas.

-*Dulcamara*: reumatismo neurálgico en las articulaciones y extremidades con rigidez después de sentarse en una base fría.

-*Nux vomica*: dolores fuertes lumbares que empeoran al sentarse, especialmente durante la noche y al levantarse.

-Rhododendron: reumatismo, en especial de las articulaciones y las extremidades, empeoramiento durante la noche y al guardar reposo.

-Rhus toxicodendron: ataques reumáticos de las articulaciones y las extremidades, empeoramiento durante la noche y al guardar reposo.

En casos de:

Artrosis de las articulaciones grandes. Ver R 73.

Cefalea con trigger cervical. Ver R 16.

Coadyuvante del reumatismo articular agudo. Complementar con R 1 y R 24.

Dolores lumbares de la mujer a consecuencia de una enfermedad ginecológica. Complementar con R 50.

Hernia del disco con síntomas radiculares. Complementar con R 71.

Neuralgia intercostal. Complementar con R 69.

Osteoporosis. Adicionar la administración de R 34.

Reumatismo articular agudo. Ver R 1.

Reumatismo de los hombros, brazos y manos. Ver R 46.

Para uso externo de las enfermedades del reumatismo se aconsejan las pomadas curativas reumáticas R 30 y R 61.

Dr. Reckeweg® R 12

Arteriosclerosis.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

MULTOJODIN

Gotas: *Arnica* D3 1 g, *Barium chloratum* D4 1 g, *Conium* D5 1 g, *Glonoinum* D6 1 g, *Phosphorus* D5 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g, 50% vol. alcohol.

R 12 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Arnica* D4 0,2 g, *Arsenum iodatum* D4 0,2 g, *Aurum chloratum* D6 0,2 g, *Barium chloratum* D4 0,2 g, *Calcium iodatum* D4 0,2 g, *Conium* D5 0,2 g, *Glonoinum* D6 0,2 g, *Kalium iodatum* D4 0,2 g, *Phosphorus* D6 0,2 g, *Plumbum aceticum* D6 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Arteriosclerosis general, pérdida de memoria.

Advertencias:

Gotas: no se han descrito.

Ampollas: hipersensibilidad a la yodina. En caso de enfermedad Hroidel administrar sólo bajo control del especialista. No administrar a niños menores de 12 años ni durante el embarazo y periodo de lactancia.

No administrar a niños menores de 12 años.

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

El tratamiento puede prolongarse por un período mayor de tiempo.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-Arnica: los puntos principales de acción son los vasos y capilares. Congestión circulatoria, dolor cardiaco, hipertensión y apoplejía.

-Arsenum iodatum, Calcium iodatum y Kalium iodatum: mejoría de la viscosidad de la sangre y de acción vasodilatadora gracias a la cuota de yodo, al mismo tiempo su acción es también de aumento metabólico gracias a la excitación de la tiroides.

-Aurum chloratum: disonancia depresiva. Congestión hacia la cabeza, palpitación cardiaca.

-Barium chloratum: esclerosis cerebral con falta de memoria, sordera, labilidad psíquica (típica de ancianos) y vértigos.

-Conium: síntomas de vejez con vértigos, entorpecimiento y disminución de la potencia psíquica.

- Glonoinum**: congestión de la cabeza con dilatación de los vasos sanguíneos y espasmos.
- Plumbum aceticum**: hipertensión pálida con demencia mental. Nefroesclerosis y consecuencias de apoplejías. Claudicación intermitente.
- Phosphorus**: curativo del sistema vascular, sensibilidad nerviosa alterada, dolores de cabeza con congestión cerebral, sensación de parálisis cerebral.

En casos de:

Angina de pecho. Complementar con R 2.
 Claudicación intermitente, trastornos de la circulación, etc. Ver R 63.
 Debilidad cardiaca. Ver R 3.
 Descompensación cardiaca. Ver R 58.
 Infarto cardiaco. Ver R 67 y R 2.
 Pérdida de memoria. Ver R 54.
 Vértigos. Alternarse con R 29.

Dr. Reckeweg® R 13

Hemorroides.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

PROHÁMORRHIN

Gotas: *Acidum nitricum* D6 1 g, *Aesculus* D2 1 g, *Collinsonia canadensis* D4 1 g, *Hamamelis* D3 1 g, *Lycopodium* D5 1 g, *Nux vomica* D4 1 g, *Paeonia officinalis* D3 1 g, *Sulfur* D5 1 g, *Ethanolum* / *Aqua purificata* 2 g. 66% vol. alcohol.

R 13 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Acidum nitricum* D6 0,2 g, *Aesculus* D3 0,2 g, *Collinsonia canadensis* D4 0,2 g, *Graphites* D9 0,2 g, *Hamamelis* D4 0,2 g, *Kalium carbonicum* D6 0,2 g, *Lycopodium* D6 0,2 g, *Nux vomica* D4 0,2 g, *Paeonia officinalis* D3 0,2 g, *Sulfur* D6 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Hemorroides, eczema, fisura y prurito anal.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
 Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 2 horas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Acidum nitricum**: punzadas en el intestino, dolores simultáneos, sensación de presión durante la defecación, dolores concomitantes después de la defecación.
- Aesculus**: relación organotrópica con relación al sistema venoso, sequedad e irritación de las mucosas, hemorroides externas, dolor dorsal y lumbar.
- Collinsonia canadensis**: congestión venosa de la pelvis, estreñimiento, meteorismo, hemorroides.
- Graphites**: constipación, deposiciones cubiertas de moco, nodulosas. Fisuras anales y eczema anal con prurito.
- Hamamelis**: venas inflamadas dolorosas con tendencia a hemorragia.
- Kalium carbonicum**: dolores de espalda, flatulencia. Heces duras, nódulos anales urentes.
- Lycopodium**: meteorismo, flatulencia, defecación seca, hemorroides sangrantes con prolapso y espasmo anal.
- Nux vomica**: dolor lumbar durante la noche y al sentarse, irritación general. Estreñimiento espástico, congestiones venosas, hemorroides sangrantes.
- Paeonia officinalis**: hemorroides con fisuras, defecación dolorosa.
- Sulfur**: curativo eficaz para la reacción defensiva, ano rojizo con prurito y eczema.

En casos de:

Anemia como consecuencia de hemorroides sangrantes. Ver R 31.
Dolores abdominales y tenesmo. Ver R 37.
Dolores lumbares de la mujer. Ver R 50.
Eczema anal. Ver R 21.
Enfermedades hepáticas (hepatopatía, lesión del parénquima, colecistopatía). Complementar con R 7, suministrando 10-15 gotas 1-2 veces al día.
Enterocolitis. Ver R 4.
Espasmos de esfínter. Ver R 14.
Hepatopatías. Ver R 7.
Varices y estasis venosa. Se alterna o complementa con R 42.

Dr. Reckeweg® R 14

Insomnio y estados de excitabilidad nerviosa.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:**QUIETA**

Gotas: *Avena sativa* D1 1 g, *Chamomilla* D4 1 g, *Coffea* D4 1 g, *Eschscholzia californica* D2 1 g, *Humulus lupulus* D2 1 g, *Ignatia* D6 1 g, *Passiflora incarnata* D2 1 g, *Valeriana* Ø=D1 1 g, *Zincum valerianicum* D6 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 1 g. 65% vol. alcohol.

R 14 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Ammonium bromatum* D4 0,2 g, *Avena sativa* D3 0,2 g, *Chamomilla* D4 0,2 g, *Coffea* D4 0,2 g, *Eschscholzia californica* D4 0,2 g, *Humulus lupulus* D3 0,2 g, *Ignatia* D6 0,2 g, *Passiflora incarnata* D3 0,2 g, *Valeriana* D4 0,2 g, *Zincum valerianicum* D6 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Insomnio, angustia, intranquilidad nerviosa, ansiedad (comedores compulsivos, fumadores).

Advertencias:

Gotas y ampollas: durante el embarazo y periodo de lactancia, no deben tomarse medicamentos sin consultarlo con el especialista. Ampollas: no administrar a niños menores de 12 años.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de la comidas, salvo prescripción facultativa.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Ammonium bromatum:* paliativos.
- Avena sativa:* neurastenia, consecuencias de esfuerzos psíquicos, insomnio.
- Chamomilla:* curativo del sistema nervioso excitado con hipersensibilidad, sueño y querella.
- Coffea:* insomnio causado de pensar o después de excitaciones alegres, susto y querella.
- Eschscholzia californica:* sedante.
- Humulus lupulus:* sedante.
- Ignatia:* pesadumbre silenciosa. Cambio de humor, debilidad nerviosa.
- Passiflora incarnata:* sedante, excitación e irritabilidad del sistema nervioso.
- Valeriana:* sedante.
- Zincum valerianicum:* insomnio nervioso, contracción de las piernas.

En casos de:

Cansancio psico-físico. Ver Vita-C 15.
Cefalea musculotensiva. Ver R 81.
Colitis hipo/hipercinética. Ver R 4.
Depresión. Ver Vita-C 15 Forte.
Dismenorrea. Ver R 75.
Extenuación nerviosa. Complementar con Vita-C 15.
Hiperexcitabilidad neuromuscular. Ver R 36.
Hipertiroidismo. Ver R 51.

Neurosis cardíaca. Ver R 22.
Neurosis gástrica. Ver R 5.
Somatización. Ver R 47.
Tabaquismo. Complementar con R 77.
Vómito con base neurodistónica. Ver R 52.

Dr. Reckeweg® Vita-C 15

Sedante reconstituyente para los estados de agotamiento nervioso.
Jarabe.

Composición:

VITA-C 15

Jarabe: *Acidum phosphoricum* D3 1,0 g, *Citrus limon* Ø 2,0 g, *Cocculus* D5 1,0 g, *Helonias dioica* D5 1 g, *Ignatia* D5 1,0 g, *Sepia* D6 1,0 g, *Zincum metallicum* D6 0,1 g, *Saccharum* 20,0 g, *Corrigentia* 1,9 g (= *Acidum ascorbicum* 0,2 g, *Fructus Cynosbati* 1,0 g, *Fructus Sorbi aucupariae* 0,5 g, *Saccharum tostum* 0,2 g), *Ethanolum* / *Aqua purificata* ad 100,0 g. 18% vol. alcohol.

Indicaciones:

Condiciones de agotamiento nervioso, extenuación, neurastenia, falta de energía.

Advertencias:

Este producto contiene un 18% de etanol. Cada dosis contiene entre 0,7 y 2,8 g de alcohol, dato a tener en cuenta en aquellos pacientes que padezcan de afecciones hepáticas, alcoholismo, epilepsia, daños o enfermedades cerebrales, así como mujeres embarazadas y niños, ya que el uso de este medicamento podría tener efectos negativos. Podría modificar o incrementar el efecto de otros medicamentos.

Posología:

Jarabe: salvo prescripción facultativa, tomar al principio del tratamiento una cucharadita hasta 3 veces al día. Si se aprecia mejoría, una cucharadita de 1 a 2 veces al día. Al finalizar el tratamiento, 1 cucharadita por la noche.

Nota para diabéticos: 1 cucharadita de café = 5ml = 0,1 BU (Bread Units).

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Acidum phosphoricum:** extenuación psíquica y corporal. Impotencia, falta de concentración, apatía y somnolencia.
- Cocculus:** estados depresivos, debilidad cervical, astenia, náuseas e hipotensión.
- Helonias dioica:** extenuación y trabajos excesivos, especialmente en las mujeres con afecciones uterinas.
- Ignatia:** depresión, incapacidad de superar problemas y afecciones psicofísicas.
- Sepia:** efecto hormonal y venoso, bajo rendimiento físico, indiferencia y debilidad. Oleadas de calor seguidas de sudor, irritación y menstruación irregular.
- Zincum metallicum:** tristeza. Irritación. Indiferencia a los deberes, especialmente durante el climaterio.

En casos de:

Astenia con deterioro funcional cerebral. Ver R 54.
Astenia con hipotensión. Ver R 44.
Climaterio. Adicionar R 10.
Hipotensión. Ver R 44.
Impotencia. Ver R 41.
Insomnio. Ver R 14, que se puede complementar.
Somatización histérica. Ver R 47.
Trastornos endocrinológicos. Ver R 19 o R 20.

Dr. Reckeweg® Vita-C 15 Forte

Tónico reconstituyente para los estados de agotamiento nervioso.
Ampollas bebibles.

Composición:

VITA-C 15 FORTE

Ampollas bebibles: *Acidum phosphoricum* D3 1,0 g, *Citrus limon* Ø 2,0 g, *Cocculus* D5 1,0 g, *Helonias dioica* D5 1,0 g, *Ignatia* D5 1,0 g, *Panax ginseng* Ø=D1 1,0 g, *Sepia* D6 1,0 g, *Zincum metallicum* D6 0,1 g, *Saccharum* 20,0 g, *Corrigentia* 2,2 g (= *Acidum ascorbicum* 0,5 g, *Fructus Cynosbati* 1,0 g, *Fructus Sorbi aucupariae* 0,5 g, *Saccharum tostum* 0,2 g), *Ethanolum* / *Aqua purificata* ad 100,0 g. 18% vol. alcohol.

Indicaciones:

Neurastenia, cansancio primaveral, cansancio psicofísico, estrés.

Advertencias:

Este producto contiene un 18% de etanol. Cada dosis contiene alrededor de 1,4 g de alcohol, de efecto perjudicial para aquellos que padezcan afecciones hepáticas, alcoholismo, epilepsia, daños o enfermedades cerebrales, así como mujeres embarazadas y niños.
Podría modificar o aumentar la acción de otros medicamentos.

Posología:

En casos agudos tomar 1 ampolla 1-2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Como medicina preventiva, tomar 1 ampolla al día.

Agitar antes de usar.

Consulte a su médico en caso de que los síntomas no mejoren.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Nota para diabéticos: 1 ampolla = 10 ml = 0,2 BU (Bread Units)

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Acidum phosphoricum:** extenuación psíquica y corporal. Impotencia, falta de concentración, apatía y somnolencia.
- Cocculus:** estados depresivos, debilidad cervical, astenia, náuseas e hipotensión.
- Helonias dioica:** extenuación y trabajos excesivos, especialmente en las mujeres con afecciones uterinas.
- Ignatia:** depresión, incapacidad de superar problemas y afecciones psicofísicas.
- Sepia:** efecto hormonal y venoso, bajo rendimiento físico, indiferencia y debilidad. Oleadas de calor seguidas de sudor, irritación y menstruación irregular.
- Zincum metallicum:** tristeza. Irritación. Indiferencia a los deberes, especialmente durante el climaterio.

Propiedades:

Desde el punto de vista farmacológico, el **ginseng** contiene numerosos compuestos: glucósidos, saponósidos, poliinos (panaxinol, panaxitriol) y un aceite esencial rico en hidrocarburos sesquiterpénicos. Contiene también vitaminas B₁ y B₂, esteroides, aminoácidos y péptidos.

Es probable que el efecto vigorizante del ginseng tenga su explicación en la acción combinada y armónica de sus componentes. Nosotros, sin embargo, atribuimos el efecto tonificante, que una y otra vez nos comentan los terapeutas, a su contenido en vitaminas B₁ (tiamina) y B₂ (riboflavina) que, junto con el ácido L-ascórbico influye en las células más importantes relacionadas con las situaciones de estrés.

La **tiamina** actúa sobre las células que consumen gran cantidad de carbohidratos (células nerviosas), sobre las células con elevado metabolismo de ácido pirúvico (células del miocardio) y sobre el tejido nervioso en general. Como sustancia de activación produce la acetilcolina, la cual transmite los impulsos de un nervio a otro o a los órganos. La tiamina retrasa la hidrólisis producida por la colinesterasa y aumenta, de esta manera, el efecto de la acetilcolina.

La **riboflavina** se halla en gran proporción en la retina y es probable que influya en el proceso de la visión. Además, entra en la composición de varias enzimas que intervienen en distintos procesos de oxidación-reducción. Su presencia en la retina nos parece el factor más importante, ya que en situaciones prolongadas de estrés se observa, casi siempre, una disminución de la capacidad visual, ofuscamiento e irritación ocular. El aporte a tiempo de riboflavina evita la aparición de estos problemas.

El **ácido L-ascórbico** es un activador del metabolismo de los procesos tanto celulares como humorales y es, por su efecto reconstituyente y estimulante de la vitalidad, un verdadero tónico fisiológico. Como sistema redox transmite, en el metabolismo celular, hidrógeno y electrones mediante un proceso reversible.

Por su intervención en la síntesis de las hormonas esteroides, la vitamina C está muy indicada en el estrés. Si en una situación de estrés se eleva la producción de las hormonas

esteroideas, se genera una carencia de vitamina C en la corteza adrenal, con la consecuente caída de la síntesis hormonal, provocando una disminución de la capacidad de reacción ante situaciones difíciles.

El gran contenido de azufre del ginseng es, sin duda, muy positivo para el equilibrio energético de las células. Forma parte de algunos albuminoides, como la lactoalbúmina, que tienen como base aminoácidos sulfurados, como por ejemplo, la cistina, un aminoácido semiesencial que es, no obstante, el portador principal del azufre en la molécula albuminoide y que forma, junto con la cisteína como catalizador intermediario, un sistema redox que es muy importante para el equilibrio energético de la célula. En su función de catalizador absorbe, en el proceso de la deshidrogenación, el hidrógeno, y lo segrega para una liberación progresiva de energía.

En casos de:

Astenia con deterioro funcional cerebral. Ver R 54.

Astenia con hipotensión. Ver R 44.

Climaterio. Adicionar R 10.

Hipotensión. Ver R 44.

Impotencia. Ver R 41, R 41 Forte.

Insomnio. Ver R 14, que se puede complementar.

Somatización histérica. Ver R 47.

Trastornos endocrinológicos. Ver R 19, R 20, R 10.

Dr. Reckeweg® R 16

Cefaleas de repetición. Migraña.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

CIMISAN

Gotas: *Cimicifuga* D4 1 g, *Gelsemium* D3 1 g, *Iris versicolor* D2 1 g, *Sanguinaria* D3 1 g, *Spigelia anthelmia* D4 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 37% vol. alcohol.

R 16 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Cimicifuga* D4 0,2 g, *Gelsemium* D4 0,2 g, *Iris versicolor* D4 0,2 g, *Sanguinaria* D4 0,2 g, *Spigelia anthelmia* D4 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Jaqueca, dolores de cabeza continuos.

Advertencias:

El preparado sólo podrá tomarse tras consultar con el médico, si se padecen o han padecido enfermedades hepáticas, y/o se toman de manera simultánea sustancias hepatotóxicas.

En casos individuales se ha observado la aparición de un incremento de los valores de la función hepática (transaminasas) y la bilirrubina, como hepatitis inducida por el preparado (hepatitis tóxica medicamentosa). Se ha comprobado que estos cuadros son reversibles cuando se interrumpe la ingestión.

En el embarazo y durante la lactancia sólo se podrá ingerir tras consultar con el médico.

No administrar a niños menores de 12 años.

Duración de la administración:

Si su administración se prolonga más de 4 semanas hay que llevar a cabo una comprobación de los valores hepáticos.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

El tratamiento puede administrarse por un periodo mayor de tiempo.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla de 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Cimicifuga:** fuerte dolor de cabeza desde la coronilla hasta la nuca. Jaqueca, especialmente al comienzo de la menopausia.

-**Gelsemium:** congestiones fuertes de cabeza, entorpecimiento. Mareo por cualquier movimiento. Trastornos de la vista. Mejoría al orinar con frecuencia.

- Iris versicolor**: jaqueca rítmica frecuente con vómitos y diarreas, como consecuencia de esfuerzos psíquicos.
- Sanguinaria**: dolor de cabeza con congestión circulatoria, acompañado de náuseas y vómitos frecuentes. Dolor tirante de la nuca a la cabeza y sobre los ojos, especialmente al lado derecho.
- Spigelia anthelmia**: congestión parcial de la cabeza, que aumenta con el sol. Relación con el corazón.

En casos de:

Arterioesclerosis, hipertensión y dolores de cabeza de naturaleza escleróticocerebral. Ver R 12.
 Cefalea con resfriado. Ver R 6.
 Cefalea con sinusitis. Ver R 49.
 Dolor de cabeza con resfriado. Ver R 6.
 Migraña asociada a dismenorrea. Ver R 75.
 Migraña asociada a menopausia. Ver R 10.
 Migraña asociada a vértigos. Ver R 29.
 Migraña asociada a vómitos. Ver R 52.
 Migraña en fase premenstrual. Ver R 20.
 Neuralgia facial y del trigémino. Ver R 70.
 Sinusitis. Ver R 49 y Pulsatilla compositum nasal spray.

Dr. Reckeweg® R 17

Hiperplasia benigna de diversa etiología.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

COBRALACTIN

Gotas: *Acidum lacticum* D4 1 g, *Naja tripudians* D6 1 g, *Scrophularia nodosa* D2 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 7 g, 38% vol. alcohol.

R 17 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Acidum lacticum* D4 0,2 g, *Naja tripudians* D8 0,2 g, *Scrophularia nodosa* D3 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Formaciones anómalas de tejidos. Aconsejable tras operaciones o radiaciones, dado que tiene las cualidades de mejorar el estado de salud en general.
 También en caso de dolores muy fuertes es muy eficaz. Coadyuvante en casos de hiperplasia glandular. (Consulte a su médico antes de tomar este medicamento).

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
 Durante el embarazo o periodo de lactancia sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

La medicación debería continuarse durante 3 meses, pudiéndose repetir al cabo de 6 meses si es necesario.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Acidum lacticum**: cuerpo y espíritu flojo y exhausto. Probablemente acciona la respiración celular trastornada en caso de cáncer. Sensación general de extenuación.
- Naja tripudians**: debilidad general y cansancio. Estimulación de la regeneración de los tejidos enfermos así como de la sangre. De acción cardiaca. Efecto analgésico en caso de tumores.
- Scrophularia nodosa**: hinchazón de las glándulas de naturaleza benigna. Formación de nudos en el pecho.

En casos de:

Afecciones de los órganos sexuales femeninos. Ver R 38 y R 39.
 Anemia. Ver R 31.
 Afecciones prostáticas. Ver R 25.
 Precisar estimulación de la función hepática. Administrar 10-15 gotas de R 7, 1 vez al día.

Dr. Reckeweg® R 18

Cistitis y nefritis.
Gotas.

Composición: CYSTOPHYLIN

Gotas: *Berberis vulgaris* D4 1 g, *Cantharis* D4 1 g, *Dulcamara* D4 1 g, *Equisetum hiemale* D6 1 g, *Eupatorium purpureum* D6 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Afecciones de la pelvis renal y vejiga. Infecciones de las vías urinarias y de los riñones. Cistitis.

Advertencias:

Durante el embarazo o periodo de lactancia sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 2 horas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

En irritación de la vejiga: tomar 5-10 gotas 1 o 2 veces al día.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas disueltas en un poco de agua, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Berberis vulgaris*: rigidez y entumecimiento de la espalda, dolores en la región renal.

-*Cantharis*: dolor irritante al orinar, presencia de sangre en la orina, cistitis aguda.

-*Dulcamara*: necesidad dolorosa de orinar, orina mucosa y maloliente. Necesidad frecuente de orinar después de exposición a frío húmedo.

-*Equisetum hiemale*: estímulos frecuentes de orinar, dolor en la región renal.

-*Eupatorium purpureum*: dolores de las extremidades y escalofríos, irritación de la uretra. Vejiga irritada.

En casos de:

Albuminuria, nefrosis crónica y nefritis. Complementar con R 64.

Cálculos de las vías urinarias. Ver R 27.

Diabetes. Ver R 40.

Dismenorrea. Ver R 75.

Dolor alrededor del sacro en mujeres. Ver R 50.

Inflamación pélvica. Ver R 38 / R 39.

Nefrolitiasis. Complementar con R 27, 10-15 gotas 2 veces al día.

Prostatitis. Alternarse con R 25.

Dr. Reckeweg® R 19

Regulación de la función glandular masculina.
Gotas.

Composición: EUGLANDIN-M

Gotas: *Glandula suprarenalis* (suis) D12 1 g, *Glandula thymi* (suis) D12 1 g, *Hypophysis* (suis) D12 1 g, *Pancreas* (suis) D12 1 g, *Testis* (suis) D12 1 g, *Thyreoidinum* (suis) D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 4 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Estimulante y regulador de la función glandular masculina.

Advertencias:

En caso de enfermedad tiroidea, no administrar sin consultar al especialista (*Thyreoidinum*).

No administrar a niños menores de 12 años.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Glandula suprarenalis* (suis): debilidad, enflaquecimiento, miastenia. Estados alérgicos, asma, hipoglicemia, hipertensión, hipotensión.
- Glandula thymi* (suis): extenuación.
- Hypophysis* (suis): influencia central en todo el sistema hormonal.
- Pancreas* (suis): diabetes del páncreas, trastornos del fermento digestivo.
- Testis* (suis): senilidad, disminución vital.
- Thyreoidinum* (suis): regulador de la glándula tiroides, mixedema, enanismo.

En casos de:

Adiposidad. Complementar con R 59.
Astenia. Ver Vita-C 15 Forte.
Astenia sexual. Ver R 41, R 41 Forte.
Deterioro psíquico senil. Ver R 54.
Diabetes. Ver R 40.
Hipertiroidismo. Ver R 51.
Hipotensión arterial. Ver R 44.
Hipotiroidismo. Ver R 12, R 59.
Obesidad. Ver R 59.
Reconvalecencia. Ver R 26, R 95.

Dr. Reckeweg® R 20

Regulación de la función glandular femenina.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

EUGLANDIN-F

Gotas: *Glandula suprarenalis* (suis) D12 1 g, *Glandula thymi* (suis) D12 1 g, *Hypophysis* (suis) D12 1 g, *Ovarium* (suis) D12 1 g, *Pancreas* (suis) D12 1 g, *Thyreoidinum* (suis) D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 4 g, 36% vol. alcohol.

R 20 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Glandula suprarenalis* (suis) D12 0,2 g, *Glandula thymi* (suis) D12 0,2 g, *Hypophysis* (suis) D12 0,2 g, *Ovarium* (suis) D12 0,2 g, *Pancreas* (suis) D12 0,2 g, *Thyreoidinum* (suis) D12 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Estimulante y regulador de la función glandular femenina.

Advertencias:

En caso de enfermedad tiroidea, no administrar sin consultar al especialista.
No administrar a niños menores de 12 años.
Durante el embarazo y período de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Glandula suprarenalis* (suis): debilidad, enflaquecimiento, miastenia. Estados alérgicos, asma, hipoglicemia, hipertensión-hipotensión.
- Glandula thymi* (suis): extenuación.
- Hypophysis* (suis): influencia central en todo el sistema hormonal.
- Ovarium* (suis): trastornos de la menstruación.
- Pancreas* (suis): diabetes del páncreas, trastornos del fermento digestivo.
- Thyreoidinum* (suis): regulador de la glándula tiroides, mixedema, enanismo.

En casos de:

Adiposidad. Complementar con R 59.
Astenia. Ver Vita-C 15 Forte.
Deterioro psíquico senil. Ver R 54.
Diabetes. Ver R 40.
Hipertiroidismo. Ver R 51.

Hipotensión arterial. Ver R 44.
Hipotiroidismo. Ver R 12.
Obesidad. Ver R 59.
Convalecencia. Ver R 26, R 95.

Dr. Reckeweg® R 21

Tratamiento constitucional de la piel.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

MEDORRHAN

Gotas: *Medorrhinum* D30 1 g, *Psorinum* D30 1 g, *Thuja* D30 1 g, *Vaccinium* D30 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 6 g. 36% vol. alcohol.

R 21 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Medorrhinum* D30 0,2 g, *Psorinum* D30 0,2 g, *Thuja* D30 0,2 g, *Vaccinium* D30 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Remedio constitucional para las enfermedades cutáneas crónicas y dolores reumáticos.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 10 gotas disueltas en un poco de agua 1 vez al día, salvo prescripción facultativa. La dosis puede repetirse después de una semana si es necesario.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Medorrhinum:** prurito difuso, especialmente por la noche, manchas rojizas y oscuras en la piel, verrugas. Consecuencias de gonorrea suprimida.

-**Psorinum:** acciona especialmente el sistema glandular y linfático. Erupciones cutáneas y pústulas. Debilidad general.

-**Thuja:** hipersensibilidad al contacto en la piel, prurito, eczemas húmedos, especialmente de la región capilar y la cara; verrugas.

-**Vaccinium:** complicaciones concomitantes de la vacuna contra la viruela. Eczemas.

En casos de:

Acné. Ver R 53.

Costra láctea. Ver R 34.

Dermatitis varicosa. Ver R 42.

Dermatitis en diabéticos. Ver R 40.

Dermatitis tras herpes zóster. R 68.

Eczemas. Ver R 23 y R 53.

Psoriasis. Ver R 65.

Precisar un estímulo de las fuerzas inmunes del organismo. Ver R 26.

Psoriasis. Ver R 65.

Dr. Reckeweg® R 22

Alteraciones cardíacas de origen nervioso.

Gotas.

Composición:

NAJASTHEN

Gotas: *Grindelia robusta* D4 1 g, *Lachesis* D12 1 g, *Naja tripudians* D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 7 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Coadyudante en trastornos cardiacos de origen nervioso con sensación de presión y de ahogo tales como neurosis cardiaca, trastornos cardiacos con sofocos, taquicardia, miocarditis, endocarditis.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 1-2 horas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la dosis a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Grindelia robusta*: congestión súbita en la respiración, sobresaltos durante el sueño.

-*Lachesis*: estenocardia con dificultad respiratoria durante el sueño. Sensación de ahogo, astenia cardiaca.

-*Naja tripudians*: taquicardia, pulso débil. Tendencia al colapso.

En casos de:

Anemia. Ver R 31.

Angina pectoral. Ver R 2.

Arritmia cardiaca. Ver R 66.

Asma bronquial. Ver R 43.

Climaterio. Ver R 10.

Descompensación cardiaca y circulatoria. Ver R 58.

Hipertiroidismo. Ver R 51.

Hipotensión. Ver R 44.

Infarto cardiaco. Ver R 55 y R 67.

Insuficiencia cardiaca y degeneración del miocardio. Complementar con R 3.

Síndrome gastro-cardiaco. Ver R 5.

Síndrome de descompensación cardiocirculatoria. Ver R 58.

Somatización por ansiedad. Ver R 14 y R 47.

Trastornos del ritmo cardiaco. Ver R 66.

Dr. Reckeweg® R 23

Eczemas.

Gotas.

Composición:**NOSODERM**

Gotas: *Apis* D30 1 g, *Arsenicum album* D30 1 g, *Rhus toxicodendron* D30 1 g, *Sulfur* D30 1 g, *Ethanolum* / *Aqua purificata* 6 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Eczema agudo y crónico. Exantemas alérgicos, urticaria. Herpes.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua una vez al día, salvo prescripción facultativa. Si los síntomas persisten, repetir la dosis después de 2-3 semanas. Si no hay mejoría, incrementar la dosis a 5-10 gotas una o dos veces al día durante una semana.

Bebés de 0 a 12 meses: tomar 2-3 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Apis*: hinchazones edematosos y erisipela. Inflamación de piel serosa. Afecciones cutáneas con prurito, urticaria.

-*Arsenicum album*: agotamiento general e inquietud. Diferentes enfermedades de la piel como pústulas, pápulas, gangrena.

-*Rhus toxicodendron*: erupciones de ampollas, hinchazones dolorosas y rojizas.

-*Sulfur*: curativo de acción profunda y prolongada. Piel sucia amarillenta, ruda e incurable. Eczema de tipo seco con prurito y sensación de calor, en especial durante la noche.

En casos de:

Acné. Ver R 53.
Costra láctea. Complementar con R 34.
Dermatitis supurativa. Ver R 1.
Eczema crónico. Complementar con R 21.
Eczema exudativo. Ver R 32.
Eczema paratraumático asociado a fístula. Ver R 1.
Eczema psoriásico. Ver R 65.
Eczema varicoso. Ver R 42.
Enfermedades exantémicas. Ver R 1 y R 62.
Escarlatina y otras infecciones con alteraciones de la piel. Ver R 21.
Herpes zóster. Ver R 68.
Precisar la estimulación de la producción de anticuerpos. Ver R 26.
Sarampión. Ver R 62.
Seborrea constitucional. Ver R 34.

Dr. Reckeweg® R 24

Inflamaciones de la pleura y otras membranas serosas.
Gotas.

Composición:**PLEURASIN**

Gotas: *Bryonia* D4 1 g, *Kalium carbonicum* D6 1 g, *Ranunculus bulbosus* D4 1 g, *Ethanolum* / *Aqua purificata* 7 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Inflamaciones serosas, artritis y poliartritis. Pleuritis agudas.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.
Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.
Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Bryonia***: dolores punzantes al iniciarse un movimiento, dolores en el pecho al respirar. Mejoría de los dolores al guardar reposo. Tos irritante y seca.
- Kalium carbonicum***: debilidad, sudor. Punzadas en el pecho y el corazón.
- Ranunculus bulbosus***: piel serosa del tórax con catarro y dolores intercostales. Congestión respiratoria.

En casos de:

Anginas. Ver R 1.
Apendicitis aguda, hasta su posible intervención quirúrgica. Alternarse con R 24 y R 38, tomándose cada 1-2 horas de 10-15 gotas.
Artritis y poliartritis aguda. Alternarse con R 1, 10-15 gotas una vez al día.
Pleuritis asociada a insuficiencia respiratoria. Ver R 57.
Bronquitis y tos. Ver R 8 y R 9.
Catarros bronquiales. Ver R 48.
Infecciones gripales precedentes. Adicionar R 6, 2 o 3 veces al día.
Neuralgia intercostal. Alternarse con R 69.
Ovaritis. Complementar con R 1. Ver R 38 y R 39.

Dr. Reckeweg® R 25

Afecciones de la próstata.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

PROSTATAN

Gotas: *Chimaphila umbellata* D3 1 g, *Conium* D5 1 g, *Ferrum picrinicum* D4 1 g, *Pareira brava* D2 1 g, *Populus tremuloides* D3 1 g, *Pulsatilla* D3 1 g, *Sabal serrulatum* D2 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 3 g. 56% vol. alcohol.

R 25 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Chimaphila umbellata* D5 0,2 g, *Clematis vitalba* D3 0,2 g, *Conium* D5 0,2 g, *Ferrum picrinicum* D6 0,2 g, *Pareira brava* D6 0,2 g, *Populus tremuloides* D4 0,2 g, *Pulsatilla* D4 0,2 g, *Sabal serrulatum* D4 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Coadyudante en prostatitis aguda y crónica e hipertrofia prostática.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años. No administrar a mujeres.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Chimaphila umbellata*: sensación de hinchazón en el periné. Retención de orina, orina espesa, mucosa y sanguinolenta.
- Clematis vitalba*: chorro de orina interrumpido, estenosis uretral inicial. Anamnesis con historial gonorréico.
- Conium*: micción débil.
- Ferrum picrinicum*: nicturia, micción en general.
- Pareira brava*: orina sanguinolenta y mucosa, dolor de la uretra.
- Populus tremuloides*: relación organotrópica a las vías urinarias. Dolor durante la micción, retención de la orina.
- Pulsatilla*: necesidad frecuente de orinar, micción involuntaria.
- Sabal serrulatum*: micción difícil, nicturia, polaquiuria.

En casos de:

Arteriosclerosis. Complementar con R 12.
Astenia sexual. Ver R 41, R 41 Forte.
Ciática. Ver R 71.
Esclerosis coronaria. Complementar con R 2.
Hemorroides. Ver R 13.
Nefrosis. Ver R 64.
Pielitis y cistitis. Ver R 18.
Prostatitis aguda. Complementar con R 1.

Dr. Reckeweg® R 26

Estimulación de las defensas del organismo.

Gotas.

Composición:

REMISIN

Gotas: *Acidum nitricum* D12 1 g, *Acidum phosphoricum* D12 1 g, *Calcium iodatum* D12 1 g, *Ferrum iodatum* D12 1 g, *Sulfur iodatum* D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Estimulante de las defensas del organismo.

Advertencias:

Si existe una enfermedad tiroidea no debe utilizarse el preparado sin consultar previamente al médico.

Durante el embarazo y lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua una o dos veces al día, salvo prescripción facultativa.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Acidum nitricum:** curativo de la mucosa cutánea, secreciones y transpiraciones malolientes.

-**Acidum phosphoricum:** debilidad y extenuación corporal y psíquica. Sudor.

-**Calcium iodatum:** hinchazón crónica de las mucosas. Inflammaciones de las glándulas linfáticas. Supuraciones en el oído medio y en los huesos. Efectivo para la glándula tiroidea.

-**Ferrum iodatum:** circulación irregular de la sangre, cara ruborizada por cualquier motivo, debilidad, inapetencia, hinchazón de las glándulas.

-**Sulfur iodatum:** componente principal en el caso de falta de reacción del cuerpo a la toma de medicamentos. Ofrece una curación por sí misma o también en el caso de una terapia que no haya funcionado ni logrado una cura definitiva.

En caso de:

Enfermedades de tipo crónico, podrá adicionarse el R 26 al tratamiento habitual, o tomar tan solo el R 26 hasta lograr una mejora definitiva.

Dr. Reckeweg® R 27**Litiasis renal.**

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:**RENOCALCIN**

Gotas: *Acidum nitricum* D6 1 g, *Berberis vulgaris* D3 1 g, *Lycopodium* D5 1 g, *Sarsaparilla* D3 1 g, *Ethanololum / Aqua purificata* 6 g. 36% vol. alcohol.

R 27 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Acidum nitricum* D6 0,2 g, *Berberis vulgaris* D4 0,2 g, *Lycopodium* D6 0,2 g, *Sarsaparilla* D4 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Cálculos renales, arenillas, diátesis úrica.

Advertencias:

Gotas: no administrar a niños menores de 12 años. En mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, sólo bajo control médico.

Ampollas: en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Acidum nitricum:** secreciones malolientes, albúmina en la orina.

-**Berberis vulgaris:** estimulante de la función renal y hepática. Dolor en la región renal y en la uretra. Orina mucosa, sedimento rojo.

-**Lycopodium:** estimulante de la eliminación del ácido úrico aumentando la función hepática.

-**Sarsaparilla:** orina escasa, mucosa y con presencia de arenillas. Micción dolorosa.

En casos de:

Albumina y nefrosis. Ver R 64.

Cólicos, cálculos renales. Complementar con R 37, 10 gotas cada 1/4-1/2 hora en un poco de agua.

Cistitis, cistopielitis y bacteriuria. Complementar o alternar con R 18.

Cistitis concomitante en caso de hipertrofia de la próstata. Ver R 25.

Dr. Reckeweg® R 28

Metrorragias y menorragias.
Gotas.

Composición:

SECALEN

Gotas: *Acidum sulfuricum* D4 1 g, *Aesculus* D2 1 g, *Crocus* D4 1 g, *Ferrum phosphoricum* D8 1 g, *Hamamelis* D6 1 g, *Secale cornutum* D6 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 4 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Hipermenorrea, trastornos de la circulación periférica, cansancio, como consecuencia de pérdida sanguínea.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.

En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de la administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Acidum sulfuricum*: hemorragia dolorosa con extenuación.

-*Aesculus*: trastornos vasomotores, ulceraciones, congestiones venosas en la pelvis baja, dolor lumbar.

-*Crocus*: congestiones uterinas. Metrorragia por cualquier excitación. Sangre oscura y mucosa.

-*Ferrum phosphoricum*: debilidad. Regla temprana y prolongada, hemorragia interrumpida.

-*Hamamelis*: hemorragias venosas, dolor lumbar, del peritoneo y de la pelvis.

-*Secale cornutum*: dolor del útero, como contracciones uterinas, hemorragias masivas y oscuras.

En casos de:

Anemia. Ver R 31.

Dismenorrea. Ver R 75.

Dolores lumbares de la mujer. Ver R 50.

Estasis venosa. Ver R 42.

Ginecopatías inflamatorias. Completar con R 38 y R 39.

Metrorragias climatéricas. Complementar o alternar con R 10.

Dr. Reckeweg® R 29

Vértigos. Pérdida de memoria.
Gotas.

Composición:

THERIDON

Gotas: *Argentum nitricum* D30 1 g, *Cocculus* D30 1 g, *Conium* D30 1 g, *Theridion curassavicum* D30 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 6 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Vértigo, mareos, pérdida de memoria y debilidad de ésta como consecuencia de alteraciones circulatorias centrales.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.

En mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 10 gotas disueltas en un poco de agua una vez al día, salvo prescripción facultativa. El tratamiento debe prolongarse hasta 4-6 semanas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Argentum nitricum:** punto principal de acción en el sistema nervioso vegetativo. Extenuación, mareos, debilidad cerebral.
- Cocculus:** irritación nerviosa, extenuación. Vértigos por cualquier movimiento. Los síntomas empeoran al viajar.
- Conium:** vértigos por cualquier movimiento, en especial giratorio. Arteriosclerosis cerebral, irritación, memoria débil. Enfermedades seniles.
- Theridion curassavicum:** vértigos después de tomar el sol, sensibilidad nerviosa, especialmente a los ruidos. Vértigos al cerrar los ojos.

En casos de:

Angina de pecho. Complementar con R 2.
Arteriosclerosis. Complementar con R 12.
Climaterio. Complementar con R 10.
Hipotonía. Complementar con R 44.
Tendencia a colapsos. Ver R 22 o R 67.
Vértigos de origen cardiaco. Complementar con R 3.
Vértigos ligados a artrosis cervical. Ver R 11.
Vértigos por somatización de ansiedad. Ver R 47.
Vértigos al dejar de fumar. Ver R 77.

Dr. Reckeweg® R 30

Procesos inflamatorios y medicina del deporte.
Pomada.

Composición:

ATOMARE BECKERON

Pomada: *Arnica* D3 0,1 g, *Belladonna* D3 0,1 g, *Calendula* D3 0,1 g, *Camphora* D3 1,0 g, *Dulcamara* D3 0,1 g, *Echinacea angustifolia* D3 0,1 g, *Hamamelis* D3 0,1 g, *Hypericum* D3 0,1 g, *Millefolium* D3 0,1 g, *Nux vomica* D3 0,1 g, *Oleum Lavandulae* 1,0 g, *Oleum Pini silvestris* D1 2,0 g, *Oleum Rosmarini* D1 1,0 g, *Rhus toxicodendron* D3 0,1 g, *Unguentum Alcoholum Lanae ad* 100,0 g.

Indicaciones:

Neuralgia, torceduras, dolores musculares, masaje general. Uso frecuente en medicina del deporte. Forúnculos.

Advertencias:

Hipersensibilidad a la árnica; hipersensibilidad al zumaque venenoso, mujeres embarazadas, enfermos de asma bronquial y de tosferina. Las madres lactantes no deben aplicarse la pomada en los pechos. No aplicar la pomada en la cara, especialmente en la nariz. No aplicar sobre marcas o heridas abiertas en la piel. Lavar bien las manos después de cada aplicación. Infrecuentemente pueden producirse reacciones alérgicas de la piel. En algunos casos, posibilidad de reacciones cutáneas alérgicas y dermatitis de contacto. Puede aumentar los espasmos bronquiales. Puede irritar la piel y las membranas mucosas.

Posología:

Pomada: salvo prescripción facultativa, aplicar tópicamente sobre la zona dolorida 2 o 3 veces al día. Si es necesario se puede aplicar con más frecuencia. Masajear la zona. No aplicar en heridas abiertas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Arnica:** efecto específico en todas las heridas y traumatismos.
- Belladonna:** eficaz para toda clase de inflamaciones e hiperemias locales.
- Calendula:** acción en caso de heridas y contusiones.
- Camphora:** espasmos, dolores debidos a esguinces y torceduras, sensación de entumecimiento y sensación de frío.
- Dulcamara:** curativo contra influencias de humedad y frío, sobre todo reumatismo muscular y neuralgia.
- Echinacea angustifolia:** incrementa la resistencia del tejido.
- Hamamelis:** venas inflamadas y sangrantes, dolor general.
- Hypericum:** magulladuras en los riñones, neuralgias y ciática.
- Millefolium:** efecto antihemorrágico.
- Nux vomica:** dolor lumbar durante la noche. Tirones en la espalda. Imposibilidad de moverse en la cama, espasmos musculares.

-Rhus toxicodendron: cura consecuencias de catarro, fuerzas excesivas, distorsiones, etc.
Reumatismo muscular, reumatismo de las articulaciones y discopatías.

En casos de:

Artrosis. Ver R 73.
Ciática. Ver R 71.
Dolor lumbar de la mujer. Ver R 50.
Espondiloartrosis y osteocondrosis. Ver R 11.
Neuralgia de la cabeza y occipital. Ver R 16.
Reumatismo de los hombros y antebrazos. Ver R 46.
Reumatismo muscular y articular, artritis y osteocondrosis. Ver R 11.

Dr. Reckeweg® R 31

Anemia y falta de apetito.
Gotas.

Composición:

CONTRAEMIN

Gotas: *China* D6 1 g, *Ferrum sesquichloratum* D6 1 g, *Lycopodium* D12 1 g, *Sulfur* D30 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 6 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Anemia, falta de apetito, especialmente de los niños. Cansancio escolar.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- China:** astenia y debilidad con sudor, especialmente después de haber perdido sangre. Zumbidos en los oídos. Meteorismo.
- Ferrum sesquichloratum:** anemia secundaria. Congestiones en la cara, palidez, debilidad.
- Lycopodium:** reconstituyente del hígado, aumenta el metabolismo. Falta de apetito.
- Sulfur:** de gran acción curativa, activador del metabolismo sulfúrico en general. Congestiones de la cabeza, trastornos de la circulación.

En casos de:

Astenia general. Ver R 26.
Convalecencia. Ver Vita-C 15, R 95.
Raquitismo en niños. Ver R 34.
Trastornos de las glándulas endocrinas. Ver R 19 y R 20.

Dr. Reckeweg® R 32

Hipersudoración.
Gotas.

Composición:

ANTIHDROSIN

Gotas: *Jaborandi* D4 1 g, *Lachesis* D30 1 g, *Salvia officinalis* D30 1 g, *Sepia* D30 1 g, *Veratrum album* D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Hiperhidrosis de diversa etiología.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 2-3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 1 vez al día.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Jaborandi:** sudores intensivos, sensación de calor, sudor nocturno.

-**Lachesis:** sofocamiento con sudor fuerte, tendencia a debilidad cardiaca y estados de colapsos.

-**Salvia officinalis:** exudación. Sudor nocturno.

-**Sepia:** oleadas de calor con sudor durante el climaterio.

-**Veratrum album:** colapso con sudores fríos.

En casos de:

Afecciones tuberculosas. Ver R 48 y R 57.

Anginas. Ver R 1.

Colapso circulatorio. Ver R 67.

Enfermedades bronquiales. Ver R 8, R 9 y R 43.

Enfermedades circulatorias. Ver R 3.

Infecciones gripales. Ver R 6.

Insuficiencia coronaria. Ver R 2.

Sudoración asociada al climaterio. Ver R 10.

Tireotoxicosis. Ver R 51.

Dr. Reckeweg® R 33

Tratamiento constitucional de la epilepsia.

Gotas.

Composición:**BUFORAN**

Gotas: *Belladonna* D30 1 g, *Bufo* D200 1 g, *Cuprum metallicum* D12 1 g, *Silicea* D30 1 g, *Zincum metallicum* D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Tratamiento constitucional de la epilepsia, calambres musculares.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 vez al día, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría tomar 5-10 gotas cada 1-2 semanas.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3 gotas.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5 gotas disueltas en medio vaso de agua administrado periódicamente durante todo el día. Si se aprecia mejoría, tomar 3-5 gotas disueltas en una cucharadita de agua cada 1-2 semanas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Belladonna:** congestión cerebral, delirios, calambres.

-**Bufo:** ataques epilépticos. Calambres de las extremidades.

-**Cuprum metallicum:** calambres musculares parciales o en general. Inconsciencia acompañada de calambres fuertes.

-**Silicea:** reconstituyente en el caso de transpiraciones de la cabeza, tendencia a resfriados. Epilepsias traumáticas, ataques especialmente durante la noche de luna llena.

-**Zincum metallicum:** debilidad de concentración, calambres nerviosos de diversa etiología, epilepsia.

En casos de:

Ataques de formas histéricas. Ver R 47.

Dentición dolorosa en niños. Ver R 35.

Inquietud e irritabilidad nerviosa. Ver R 14.

Precisar un complemento para esta terapia. Ver R 36.

Tetania y eclampsia. Ver R 34.

Dr. Reckeweg® R 34

Trastornos en el metabolismo del calcio y del crecimiento óseo.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

CALCOSSIN

Gotas: *Calcium carbonicum Hahnemanni* D30 1 g, *Calcium fluoratum* D12 1 g, *Calcium phosphoricum* D12 1 g, *Hekla Lava* D12 1 g, *Silicea* D30 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g, 37% vol. alcohol.

R 34 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Calcium carbonicum Hahnemanni* D30 0,2 g, *Calcium fluoratum* D12 0,2 g, *Calcium hypophosphorosum* D6 0,2 g, *Calcium phosphoricum* D12 0,2 g, *Chamomilla* D6 0,2 g, *Hekla Lava* D12 0,2 g, *Mercurius praecipitatus ruber* D12 0,2 g, *Mezereum* D6 0,2 g, *Silicea* D30 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Trastornos en el metabolismo del calcio y crecimiento óseo.

Advertencias:

Gotas: durante el embarazo y periodo de lactancia sólo bajo consulta médica.

Ampollas: no administrar a niños menores de 12 años.

En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Bebés de 0 a 12 meses: tomar 2-3 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Calcium carbonicum Hahnemanni:* sudor de la cabeza, raquitismo y linfatismo, espasmofilia. Tetania.
- Calcium fluoratum:* fortalece los huesos, tendones y tejidos conectivos. Actúa probablemente por medio de la glándula paratiroides.
- Calcium hypophosphorosum* y *Calcium phosphoricum:* tipo asténico, trastornos del crecimiento óseo, mala formación del callo.
- Chamomilla:* enojo fastidioso, sudoración de cabeza, molestias en la dentición de los niños.
- Hekla Lava:* específico en caso de otitis y exostosis, inflamación de la mandíbula y la encía, dentición difícil.
- Mercurius praecipitatus ruber:* proliferaciones óseas, exostosis. Periostitis con dolores nocturnos de los huesos.
- Mezereum:* efecto sobre la piel, dolores nocturnos del periostio de los huesos largos, especialmente de la tibia.
- Silicea:* afinidad por el tejido conectivo. Supuraciones de los huesos y de las fístulas. Sudores de la cabeza.

En casos de:

Artrosis. Complementar con R 73.

Complicaciones en la dentición de los niños. Complementar con R 35.

Costra Láctea. En caso necesario, complementar con R 23.

Hiperhidrosis. Ver R 32.

Osteocondrosis del disco vertebral, espondilosis y espondiloartrosis de la columna vertebral.

Complementar con R 11.

Dr. Reckeweg® R 35

Trastornos de la dentición.
Gotas.

Composición: CHADONTIN

Gotas: *Calcium carbonicum Hahnemanni* D30 1 g, *Chamomilla* D4 1 g, *Staphisagria* D8 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 7 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Retraso en la dentición, dolores dentales.

Posología:

Gotas: en casos agudos diluir 30 gotas en un vaso de agua y tomar una cucharadita cada 15 minutos.

Si se aprecia mejoría, cada 2 horas, salvo prescripción facultativa.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Calcium carbonicum Hahnemanni:** estimula el proceso de la dentición.
- Chamomilla:** irritación, sudor de la cabeza, dolor de muelas o dientes.
- Staphisagria:** irritación hipocondriaca. Dolor de muelas, dientes, especialmente durante el frío.

En casos de:

Dolores neurálgicos como consecuencia de los dientes. Ver R 70 y R 16.
Infección gripal simultánea. Complementar con R 6.
Inflamación de la raíz del diente. Alternar con R 1 cada 1/2-1-2 horas.
Requerir un sedante. Complementar o alternar con R 14.
Trastornos de la dentición. Alternar con R 34, 1-2 veces al día.

Dr. Reckeweg® R 36

Tics. Hiperactividad.
Gotas.

Composición: CHORESAN

Gotas: *Agaricus* D12 1 g, *Ignatia* D12 1 g, *Lachesis* D30 1 g, *Magnesium phosphoricum* D12 1 g, *Phosphorus* D30 1 g, *Zincum valerianicum* D8 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 4 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Tics, hiperactividad.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Con ataques frecuentes, tomar 5 gotas 3 veces al día durante 1-2 semanas.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Agaricus:** movimientos no coordinados de las extremidades. Espasmos musculares en la cara.
- Ignatia:** calambres a causa de emociones. Síntomas no acertados.
- Lachesis:** irritación nerviosa que empeora con el sueño.
- Magnesium phosphoricum:** hipersensibilidad nerviosa con calambres.
- Phosphorus:** irritación y debilidad del sistema nervioso central.
- Zincum valerianicum:** en especial, calambres de diversa etiología.

En casos de:

Precisar un complemento para esta terapia. Ver R 33.
Precisar un sedante. Ver R 14.

Dr. Reckeweg® R 37

Meteorismo, cólicos intestinales, estreñimiento.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

COLINTESTON

Gotas: *Alumina* D12 1 g, *Bryonia* D4 1 g, *Colocynthis* D4 1 g, *Lycopodium* D4 1 g, *Nux vomica* D6 1 g, *Sulfur* D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 4 g. 41% vol. alcohol.

R 37 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Alumina* D12 0,2 g, *Bryonia* D4 0,2 g, *Colocynthis* D4 0,2 g, *Lachesis* D30 0,2 g, *Lycopodium* D6 0,2 g, *Mercurius sublimatus corrosivus* D8 0,2 g, *Nux vomica* D6 0,2 g, *Plumbum aceticum* D12 0,2 g, *Sulfur* D12 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Meteorismo, cólicos intestinales, estreñimiento.

Advertencias:

Gotas: durante el embarazo o periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Ampollas: no administrar a niños menores de 12 años. Durante el embarazo y periodo de lactancia sólo bajo control médico.

Tras la administración podría darse diarrea por lo que debería suspenderse el tratamiento.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Alumina:* espasmos intestinales, debilidad y tenesmo.

-*Bryonia:* dolores punzantes a causa de irritaciones serosas. Estreñimiento, mucosa seca.

-*Colocynthis:* cólicos, en especial después de emociones e irritaciones.

-*Lachesis:* abultamiento del cuerpo con gran sensibilidad a la presión ejercida por la ropa.

-*Lycopodium:* abdomen impulsivo, plenitud gástrica, meteorismo. Formación de cálculos biliares, estreñimiento. Espasmos de la vejiga.

-*Mercurius sublimatus corrosivus:* tenesmo rectal doloroso que no cede, diarreas mucilaginosas, tenesmo vesical doloroso.

-*Nux vomica:* estreñimiento espasmódico, plétora abdominal, sensación de defecar.

-*Plumbum aceticum:* estreñimiento espástico. Plétora abdominal. Tenesmo rectal infructuoso.

-*Sulfur:* aumenta la reacción física, flatulencia maloliente, diarreas en la mañana.

En casos de:

Cistitis. Ver R 18.

Cólicos biliares. Complementar o alternar con R 7.

Cólicos renales. Complementar o alternar con R 27.

Enterocolitis. Alternar con R 4.

Pancreatitis. Ver R 72.

Precisar un sedante. Ver R 14.

Úlcera de duodeno y gastritis. Complementar con R 5.

Dr. Reckeweg® R 38

Afecciones del abdomen (costado derecho).

Gotas.

Composición:

DEXTRONEX

Gotas: *Apis* D6 1 g, *Apisinum* D12 1 g, *Arsenicum album* D200 1 g, *Bryonia* D30 1 g, *Sulfur* D30 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Afecciones e inflamaciones de los ovarios (costado derecho), quistes de ovario.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.

Durante el embarazo o periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Apis** y **Apisinum**: inflamación exudativa con formaciones edematosas y secreciones serosas. Relación organotrópica, entre otros, con los ovarios especialmente del costado derecho.

-**Arsenicum album**: inquietud y extenuación, dolores fuertes.

-**Bryonia**: inflamación exudativa de piel serosa, dolores punzantes al moverse que mejoran al acostarse sobre el lado afectado. Apendicitis, irritaciones del peritoneo.

-**Sulfur**: aumenta el efecto de los sustratos restantes. Estimulante.

En casos de:

Dolores lumbares de la mujer. Ver R 50.

Espasmos concomitantes del intestino. Ver R 37.

Inflamaciones de ambos ovarios y las trompas uterinas. Completar con R 39.

Irritación crónica y recidiva del apéndice. Completar con R 1, 10-15 gotas 1 vez al día, R 24 una vez al día y R 38 una vez al día.

Meno y metrorragia relacionada con anexitis. Ver R 28.

Presentar tumores benignos. Completar con R 17.

Trastornos endocrinos. Ver R 20.

Trastornos hormonales simultáneos. Ver R 10.

Dr. Reckeweg® R 39

Afecciones del abdomen (costado izquierdo).

Gotas.

Composición:**SINISTRONEX**

Gotas: *Lachesis* D30 1 g, *Lycopodium* D30 1 g, *Palladium metallicum* D12 1 g, *Vespa crabro* D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 6 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Afecciones e inflamaciones de los ovarios (costado izquierdo), quistes de ovario.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años. Durante el embarazo o periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Lachesis**: acción principal en el costado izquierdo. Hipersensibilidad al contacto, dolores en el costado izquierdo.

-**Lycopodium**: sensación de estrechez en el talle, dolor hipogástrico izquierdo de la zona del colon descendente hasta el sigmoideo. Espasmos dolorosos.

-**Palladium metallicum**: dolor en la región ovárica hasta la pelvis. Quistes en el ovario.

-**Vespa crabro**: especialmente en el caso de ovaritis del lado izquierdo.

En casos de:

Anexitis de ambos lados. Completar o alternar con R 17.

Dolores lumbares de la mujer. Ver R 50.

Espasmos concomitantes del intestino. Ver R 37.

Inflamaciones febriles. Completar con R 1.

Meno y metrorragia relacionada con anexitis. Ver R 28.

Presentar tumores benignos. Completar con R 17.

Trastornos endocrinos. Ver R 20.

Trastornos hormonales simultáneos. Ver R 10.

Dr. Reckeweg® R 40

Coadyuvante en diabetes mellitus.
Gotas.

Composición: DIAGLUKON

Gotas: *Acidum phosphoricum* D12 1 g, *Arsenicum album* D8 1 g, *Lycopodium* D30 1g, *Natrium sulfuricum* D12 1 g, *Secale cornutum* D4 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Tratamiento coadyuvante en diabetes mellitus.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
Durante el embarazo o periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: como terapia suplementaria tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 2 veces al día. La dosis tiene que estar en concordancia con los niveles de azúcar y los medicamentos alopáticos habituales.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Acidum phosphoricum*: debilidad y extenuación, sed frecuente, orina clara.
- Arsenicum album*: sed incalmable, extenuación progresiva.
- Lycopodium*: estimula la función hepática, pesadez.
- Natrium sulfuricum*: efectivo para la función del hígado y la bilis. Diabetes.
- Secale cornutum*: sed incalmable, parestesia.

En casos de:

Climaterio. Complementar con R 10.
Diabetes senil y arterioesclerosis. Complementar con R 12.
Formación de furúnculos. Complementar con R 1.
Hipofunción del sistema glandular. Alternar con R 19 o R 20.
Meteorismo y espasmos intestinales. Ver R 37.
Trastornos de la circulación de la sangre. Complementar con R 63.
Trastornos de la función hepática. Complementar con R 7.

Dr. Reckeweg® R 41

Neurastenia y debilidad sexual masculina.
Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición: FORTIVIRONE

Gotas: *Acidum phosphoricum* D12 1 g, *Agnus castus* D8 1 g, *Conium* D30 1 g, *Damiana* D6 1 g, *Testis (suis)* D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 37% vol. alcohol.

R 41 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Acidum phosphoricum* D12 0,2 g, *Agnus castus* D8 0,2 g, *China* D12 0,2 g, *Conium* D30 0,2 g, *Damiana* D6 0,2 g, *Phosphorus* D6 0,2 g, *Sepia* D30 0,2 g, *Testis (suis)* D12 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Impotencia, astenia sexual.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
Durante el embarazo o periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.
Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Acidum phosphoricum**: cansancio, dolor lumbar y extenuación, poluciones atónicas.
- Agnus castus**: efecto especial en la función sexual en caso de impotencia, falta de erección y espermatorrea.
- China**: tónico tras las pérdidas de jugos, excesos sexuales o enfermedades agotadoras.
- Conium**: irritación, falta de concentración, hipocondria de origen sexual y senil.
- Damiana**: afrodisíaco para la debilidad sexual en general.
- Phosphorus**: agotamiento nervioso, poluciones, palpitaciones cardíacas después del coito, neurastenia sexual.
- Sepia**: irritación sexual con poluciones, libido deficiente, tardía e impotencia.
- Testis (suis)**: efecto activo y específico en el sentido de una terapia orgánica.

En casos de:

Anemia. Complementar con R 31.
Arterioesclerosis. Ver R 12.
Hipofunción del sistema glandular. Complementar con R 19.
Neurastenia. Ver Vita-C 15, Vita-C 15 Forte.
Trastornos de la circulación concomitantes. Ver R 2 y R 3.

Dr. Reckeweg® R 41 Forte

Neurastenia y debilidad sexual masculina.

Ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

R 41 FORTE INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Acidum phosphoricum* D8 0,05 ml, *Agnus castus* D6 0,10 ml, *China* D8 0,10 ml, *Conium* D30 0,05 ml, *Damiana* D6 0,10 ml, *Glandula suprarenalis* (suis) D12 0,05 ml, *Glandula thymi* (suis) D12 0,05 g, *Hypophysis* (suis) D12 0,05 ml, *Lecithinum* D6 0,20 ml, *Panax ginseng* D6 0,20 ml, *Pancreas* (suis) D12 0,05 ml, *Phosphorus* D8 0,10 ml, *Procainum hydrochloricum* D3 0,20 ml, *Sepia* D30 0,05 ml, *Testis* (suis) D8 0,30 ml, *Thyreoidinum* (suis) D12 0,05 ml, *Tocopherol* D6 0,20 ml, *Yohimbinum hydrochloricum* D4 0,10 ml, in isotonic solution.

Indicaciones:

Impotencia, astenia sexual.

Advertencias:

Hipersensibilidad a la procaína; deficiencia de pseudocolinesterasa, combinación con sulfamidas; combinación con inhibidores de colinesterasa. No tomar sin consultar previamente al médico, si se padecen enfermedades del tiroides.

Urticaria, edema de la mucosa, sarpullido; reacciones locales como edemas, erupciones cutáneas, eczemas, hematomas.

No administrar a niños menores de 12 años.

Sulfamidas (efecto disminuido de las sulfamidas), inhibidor de la colinesterasa (inhibición de la degradación de la procaína).

Posología:

Ampollas inyectables (también bebibles): durante los 5 primeros días, 1 ampolla diaria por vía subcutánea. Continuar con 1 ampolla al día cada 2-3 días.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Acidum phosphoricum**: cansancio, dolor lumbar y extenuación, poluciones atónicas.
- Agnus castus**: efecto especial en la función sexual en caso de impotencia, falta de erección y espermatorrea.
- China**: tónico tras las pérdidas de jugos, excesos sexuales o enfermedades agotadoras.
- Conium**: irritación, falta de concentración, hipocondria de origen sexual y senil.
- Damiana**: afrodisíaco para la debilidad sexual en general.
- Ginseng**: estados de agotamiento nervioso. Aumenta el libido y muchas veces también la potencia.
- Glandula suprarenalis**: adinamia. Estados de agotamiento. Geriátrico.
- Hypophysis**: trastornos del endocrino. Influencia central de la totalidad del sistema hormonal mediante los más diversos componentes estimulantes. Estimulación específica de los órganos de la función hipofisaria.

- Lecithinum**: estados de agotamiento, especialmente después de un exceso de trabajo mental.
- Pancreas**: marasmo, caquexia y adinamia.
- Phosphorus**: agotamiento nervioso, poluciones, palpitaciones cardíacas después del coito, neurastenia sexual.
- Procinum hydrochloricum**: molestias seniles.
- Sepia officinalis**: irritación sexual con poluciones, libido deficiente, tardía e impotencia.
- Testis (suis)**: efecto activo y específico en el sentido de una terapia orgánica.
- Tocopherol**: trastornos de la fertilidad del hombre.
- Thymi glandula**: estados de agotamiento.
- Thyreoidinum**: ejerce un efecto regulador sobre el peso y sobre la función de la tiroides, caquexia.
- Yohimbinum hydrochloricum**: congestión en la zona de los órganos sexuales. Estados de agotamiento. Impotencia viril.

En casos de:

- Anemia. Complementar con R 31.
- Arterioesclerosis. Ver R 12.
- Hipofunción del sistema glandular. Complementar con R 19.
- Neurastenia. Ver Vita-C 15, Vita-C 15 Forte.
- Trastornos de la circulación concomitantes. Ver R 2 y R 3.

Dr. Reckeweg® R 42

Varices y otras afecciones venosas.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

HAEMOVENIN

Gotas: *Aesculus* D30 1 g, *Carduus marianus* D12 1 g, *Hamamelis* D6 1 g, *Pulsatilla* D30 1 g, *Secale cornutum* D30 1 g, *Vipera berus* D12 1 g, *Ethanolum* / *Aqua purificata* 4 g, 37% vol. alcohol.

R 42 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Aesculus* D30 0,2 g, *Belladonna* D12 0,2 g, *Calcium fluoratum* D30 0,2 g, *Carduus marianus* D12 0,2 g, *Hamamelis* D6 0,2 g, *Mezereum* D12 0,2 g, *Placenta (suis)* D30 0,2 g, *Pulsatilla* D30 0,2 g, *Secale cornutum* D30 0,2 g, *Vipera berus* D12 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Tratamiento constitucional de la insuficiencia venosa crónica. Varices. Flebitis y tromboflebitis.

Advertencias:

- No administrar durante el embarazo o periodo de lactancia.
- No administrar a niños menores de 12 años.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Aesculus**: acción especial en el sistema venoso, principalmente en la pelvis.
- Belladonna**: efectiva en las inflamaciones disimuladas.
- Calcium fluoratum**: venas dilatadas y diáfnas azules. Varices, hemangiomas.
- Carduus marianus**: especialmente varices y úlceras de las piernas provocadas por congestión de la vena porta.
- Hamamelis**: congestión venosa, hemorragia venosa, dolores de las venas varicosas, inflamaciones de las venas, formación de varices durante la gestación.
- Mezereum**: inflamaciones cutáneas con intenso prurito.
- Placenta**: fomenta la irrigación sanguínea y estimula la totalidad del sistema glandular hormonal.
- Pulsatilla**: dolor en las piernas, tumefacción de los pies, venas sensibles.
- Secale cornutum**: curativo especial en el caso de espasmos vasculares de anastomosis arterio-venosas y precapilares.
- Vipera berus**: contra afecciones sépticas. Flebitis, tromboflebitis y varices.

En casos de:

Afecciones venosas de la región pélvica. Ver R 38 o R 39, también R 50.

Dermatopatía varicosa. Ver R 23.

Hemorroides. Complementar con R 13.

Obesidad. Ver R 59.

Tromboflebitis. Complementar con R 1. Dosis según los síntomas de la enfermedad.

Precisar la estimulación de las fuerzas inmunes del organismo de personas débiles. Complementar con R 26 una vez al día.

Dr. Reckeweg® R 43

Tratamiento constitucional del asma.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:**HERBAMINE**

Gotas: *Arsenicum album* D8 1 g, *Carbo vegetabilis* D30 1 g, *Kalium phosphoricum* D30 1 g, *Natrium sulfuricum* D200 1 g, *Yerba santa* D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g, 37% vol. alcohol.

R 43 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Arsenicum album* D8 0,2 g, *Belladonna* D30 0,2 g, *Bryonia* D12 0,2 g, *Carbo vegetabilis* D30 0,2 g, *Hypophysis (suis)* D30 0,2 g, *Kalium phosphoricum* D30 0,2 g, *Natrium chloratum* D30 0,2 g, *Natrium sulfuricum* D200 0,2 g, *Veratrum album* D30 0,2 g, *Yerba santa* D12 0,2 g.

Indicaciones:

Tratamiento constitucional del asma.

Advertencias:

Ampollas: no administrar a niños menores de 12 años.

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Puede administrarse por un periodo mayor de tiempo.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Arsenicum album*: intranquilidad y miedo, empeoramiento durante la noche.

-*Belladonna*: convulsiones espásticas, mucosas secas, golpes de tos en forma de ataques.

-*Bryonia*: tos irritativa seca, dolores de pecho y sed.

-*Carbo vegetabilis*: debilidad y deseos de respirar aire fresco a consecuencia de la disnea. Ataques de tos con crepitación y silbido de pecho.

-*Hypophysis*: estimulación específica de los órganos de la función hipofisiaria.

-*Kalium phosphoricum*: en caso de agotamiento de las fuerzas, medicamento para la nutrición de los nervios.

-*Natrium chloratum*: tos seca espasmódica, irritación de las mucosas.

-*Natrium sulfuricum*: medio constitucional en caso de hidrogenoide. Tos seca irritativa sobre todo en caso de tiempo húmedo y nublado.

-*Veratrum album*: estados de debilidad similares al colapso. Tos hueca, espasmódica, estrangulación en el pecho como para asfixiarse.

-*Yerba santa*: bronquitis asmática con tos y crepitación mucosa en el pecho.

En casos de:

Afecciones de laringe. Ver R 45.

Angina de pecho. Complementar con R 2.

Astenia cardíaca. Complementar con R 3.

Bronquitis crónica tuberculosa de carácter asmático. Complementar con R 57.

Catarro crónico bronquial. Complementar con R 48.

Constitución alérgica. Ver R 76.

Constitución linfático-tuberculínica. Ver R 26 y R 57.

Requerir estimular la función glandular. Ver R 19 o R 20, para el sexo masculino ver R 41.

Requerir un sedante. Complementar con R 14.

Dr. Reckeweg® R 44

Hipotensión.
Gotas.

Composición: HYPOTONOL

Gotas: *Crataegus* D1 1 g, *Laurocerasus* D3 1 g, *Oleander* D3 1 g, *Spartium scoparium* D2 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 6 g. 39% vol. alcohol.

Indicaciones:

Hipotonía, agotamiento, cansancio. Distonía neurovegetativa.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 10 gotas disueltas en un poco de agua 2-3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.
En casos de trastorno circulatorio agudo, 10 gotas cada 1-2 horas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Crataegus:** acción específica orgánica en el corazón y el sistema vascular. Regulador en el caso de hipotensión e hipertensión.
- Laurocerasus:** debilidad cardíaca con cianosis y estasis pulmonar.
- Oleander:** trastornos del corazón y la circulación con hipotonía. Pulso acelerado, también intermitente.
- Spartium scoparium:** pulso acelerado, irregular y a veces intermitente. Sensación de pulsaciones en la carótida.

En casos de:

Angina de pecho. Complementar con R 2.
Colapso circulatorio. Complementar con R 67.
Descompensación coronaria. Complementar con R 58.
Estasis venosa. Ver R 12.
Hipertonía. Ver R 12.
Insuficiencia cardíaca. Complementar R 44 con R 3.
Trastornos circulatorios periféricos. Complementar con R 63.

Dr. Reckeweg® R 45

Laringitis. Afonía.
Gotas.

Composición: LARYNGIN

Gotas: *Argentum nitricum* D12 1 g, *Arnica* D30 1 g, *Arum maculatum* D12 1 g, *Calcium carbonicum Hahnemanni* D30 1 g, *Phosphorus* D30 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 36% alcohol.

Indicaciones:

Laringitis aguda y crónica. Ronquera.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 vez al día, salvo prescripción facultativa.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Argentum nitricum:** ronquera hasta una total afonía, sensación de cuerpos extraños en el fondo de la laringe, secreción purulenta y mucosa. Irritaciones como consecuencia de esforzar la voz.
- Arnica:** ronquera después de resfriados y esfuerzos de la voz. Curativo de inflamaciones.
- Arum maculatum:** estado inflamatorio de la laringe con dolores y congestión de la voz.

- Calcium carbonicum Hahnemanni**: constitucional de acción efectiva en general. Ronquera.
- Phosphorus**: constitucional y selectivo eficaz de ronqueras y bronquedad en la laringe, laringe sensible al tacto, dolor al hablar.

En casos de:

Enfermedades bronquiales concomitantes. Alternar con R 8, R 9 y R 43.
 Inflamaciones de la laringe y angina. Ver R 1.
 Resfriados agudos. Ver también R 6.
 Trastornos crónicos. Ver R 57.
 Trastornos de la glándula tiroides. Ver R 51.
 Tuberculosis. Ver R 48.

Dr. Reckeweg® R 46

Artritis y reumatismo de las articulaciones de hombro y extremidad superior.
 Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

MANURHEUMIN

Gotas: *Ferrum phosphoricum* D12 1 g, *Lithium carbonicum* D12 1 g, *Natrium sulfuricum* D30 1 g, *Nux vomica* D30 1 g, *Rhododendron* D6 1 g, *Spiraea ulmaria* D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 4 g. 36% vol. alcohol.

R 46 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Ferrum phosphoricum* D12 0,2 g, *Lithium carbonicum* D12 0,2 g, *Natrium sulfuricum* D30 0,2 g, *Nux vomica* D30 0,2 g, *Rhododendron* D6 0,2 g, *Spiraea ulmaria* D12 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Artritis y reumatismo de las articulaciones de hombro y extremidades superiores. Epicondilitis (codo de tenista).

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
 Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control medico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1-2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Ferrum phosphoricum**: reumatismo de las articulaciones del hombro y del músculo deltoides con fiebre e inflamación.
- Lithium carbonicum**: disposición reumática. Ácido úrico.
- Natrium sulfuricum**: reumatismo causado por frío y humedad.
- Nux vomica**: dolores de espalda durante la noche, picazón y nerviosismo en los brazos.
- Rhododendron**: reumatismo de los antebrazos y dedos con sensibilidad al cambio de tiempo.
- Spiraea ulmaria**: dolores tirantes en las articulaciones. Dolores convulsivos, especialmente en los antebrazos.

En casos de:

Artrosis de las articulaciones grandes. Complementar con R 73.
 Ciática y síndrome radicular. Ver R 71.
 Dolores lumbares de la mujer. Ver R 50.
 Lumbago, como consecuencia de osteocondrosis del disco o espondilartrosis de la columna. Ver R 11.
 Neuralgia intercostal. Ver R 69.
 Osteoporosis concomitante. Complementar con R 34.
 Requerir un tratamiento tópico. Ver las pomadas curativas R 30 y R 61.
 Reumatismo agudo de las articulaciones. Ver R 24 y R 1.
 Síndrome cervical y braquialgia. Complementar o alternar con R 11.

Dr. Reckeweg® R 47

Inestabilidad nerviosa e histeria.
Gotas.

Composición: NEUROGLOBIN

Gotas: *Coffea* D30 1 g, *Glonoinum* D12 1 g, *Ignatia* D30 1 g, *Lachesis* D30 1 g, *Moschus* D12 1 g, *Ethanololum / Aqua purificata* 5 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Trastornos histeroides. Bolo histórico.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 vez al día, salvo prescripción facultativa.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Coffea:** medicamento para los nervios y los vasos en caso de insomnio y nerviosismo doloroso. Trastornos causados por irritaciones o sustos. Hipersensibilidad.
- Glonoinum:** angioespasmos y estonocardia. Congestiones de la cabeza.
- Ignatia:** hipersensibilidad del sistema nervioso con contracciones y calambres. Espasmos, especialmente del esófago. Tristeza y tendencia a depresiones con cambios visibles externos.
- Lachesis:** excitaciones psíquicas y oleadas de calor causadas por trastornos de la secreción interna de la glándula tiroides y de la hipófisis durante el climaterio. Irritación.
- Moschus:** irritaciones nerviosas con tendencia a espasmos y desmayos. Risas y llantos convulsivos.

En casos de:

Climaterio. Complementar con R 10.
Dolores durante la dentición. Ver R 35.
Dolor de cabeza. Ver R 16.
Espasmo-filia. Ver R 34.
Extenuación. Ver R 31 y Vita-C 15.
Migrañas con componente hormonal. Complementar con R 20.
Requerir un sedante. Se puede combinar con R 14.
Tics. Ver R 36.
Trastornos de la glándula tiroides. Ver R 51.
Trastornos de las glándulas endocrinas. Ver R 19 y R 20.

Dr. Reckeweg® R 48

Patología pulmonar crónica.
Gotas.

Composición: PULMOSOL

Gotas: *Dulcamara* D30 1 g, *Ferrum phosphoricum* D12 1 g, *Kalium carbonicum* D6 1 g, *Phosphorus* D30 1 g, *Silicea* D30 1 g, *Ethanololum / Aqua purificata* 5 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Catarro pulmonar crónico. Catarro del fumador. Asma con bronquitis concomitante.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 vez al día, salvo prescripción facultativa.
Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas en un poco de agua 1 vez al día.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Dulcamara:** complicaciones de resfriados y enfriamientos. Tos irritante con flemas.
- Ferrum phosphoricum:** tos frecuente e irritación de la mucosa de las vías respiratorias altas después de resfriados. Bronquitis con fiebre y peri bronquitis con tendencia a bronconeumonía. También en caso de tuberculosis pulmonar con temperaturas febriles y subfebriles (febrícula).
- Kalium carbonicum:** debilidad entre los hombros, sudores nocturnos de pecho. Bronquitis crónica, tuberculosis pulmonar y exudación aguda, así como pleuritis crónica y asma bronquial.
- Phosphorus:** cambios infecciosos de las mucosas, tuberculosis de pulmón, neumonía, laringo-bronquitis. Habitus astenico. Agotamiento, escozor en el pecho, tos seca, expulsión de flema con sangre o color rojiza.
- Silicea:** en caso de tuberculosis en cualquier estadio sobre todo en caso de tuberculosis glandular. Sudores de cabeza y nocturnos, debilidad y adelgazamiento.

En casos de:

- Bronquitis espástica. Ver R 43.
- Sudoración constante. Ver R 32.
- Fomentar la calcificación en caso de tuberculosis, complementarse con R 34.
- Inflamaciones de la laringe. Ver R 45.
- Pleuritis. Ver R 24.
- Requerir la estimulación del sistema inmune se puede complementar también con R 26.
- Resfriado o gripe. Ver R 6, R 8 o R 9.
- Tuberculosis crónica. Complementar o alternar con R 57.

Dr. Reckeweg® R 49

Sinusitis y rinitis.
Gotas.

Composición: RHINOPULSAN

Gotas: *Arsenicum album* D12 1 g, *Calcium carbonicum Hahnemanni* D30 1 g, *Cinnabaris* D12 1 g, *Kalium bichromicum* D12 1 g, *Mercurius solubilis Hahnemanni* D30 1 g, *Pulsatilla* D12 1 g, *Sulfur* D30 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 3 g, 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Catarro agudo y crónico de la nariz y del seno maxilar (sinusitis). Pólipos nasales. Tratamiento postoperatorio en las rinoplastias.

Advertencias:

Gotas: no administrar a niños menores de 12 años.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas en un poco de agua 1 o 2 veces al día.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Arsenicum album:** eficaz en caso de catarros crónicos de la mucosa. Nariz congestionada después de resfriados.
- Calcium carbonicum Hahnemanni:** tipo torpe con tendencia a adiposidad, linfatismo, escrofulosis. Catarro frecuente de la mucosa nasal. Catarro nasal hipertrófico, pólipos nasales. De efecto constitucional.
- Cinnabaris:** medicamento de efecto específico en catarros de senos paranasales, fomenta la excreción cuando se estanca la secreción.
- Kalium bichromicum:** especial en caso de catarros de la garganta y sinusitis. Secreción de mucosa purulenta. Pérdida del olfato.
- Mercurius solubilis Hahnemanni:** nariz irritada, mucosa purulenta. Exudación pegajosa. Empeoramiento por las noches.
- Pulsatilla:** catarro de la mucosa con secreciones amarillentas. Pérdida total de olfato y del gusto.
- Sulfur:** medio de reacción y de constitución.

En casos de:

Afecciones de las amígdalas. Ver R 1.
Bronquitis. Ver R 8 y R 9.
Catarro de la laringe. Se puede complementar con R 45.
Gripe. Complementar con R 6.
Neuralgia supra-infraorbital. Alternar con R 70.
Pleuritis. Complementar con R 24.

Dr. Reckeweg® R 50

Lumbalgia de etiología ginecológica.
Gotas.

Composición:**SACROGYNOL**

Gotas: *Aesculus* D6 1 g, *Cimicifuga* D4 1 g, *Colocynthis* D6 1g, *Natrium chloratum* D30 1 g, *Nux vomica* D30 1 g, *Phytolacca* D8 1 g, *Strontium carbonicum* D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 3 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Dolor lumbar de origen ginecológico.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
Durante el embarazo o periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 vez al día, salvo prescripción facultativa.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Aesculus:** congestión venosa en la pelvis y dolores lumbares.
- Cimicifuga:** presión y dolor en la región del sacro. Dolores ginecopáticos, espasmos del útero.
- Colocynthis:** trastornos neurálgicos, espasmos de la musculatura lisa.
- Natrium chloratum:** dolores de espalda. Dolores lumbares al sentarse.
- Nux vomica:** dolores lumbares que se extienden hacia la región baja con deposiciones frecuentes. Sensación de dolores lumbares fuertes, especialmente durante la noche en la cama.
- Phytolacca:** dolor de espalda, nuca y la región lumbar.
- Strontium carbonicum:** dolor lumbar y de la cadera.

En casos de:

Ciática o síndrome radicular. Ver R 71.
Dolores lumbares agudos, lesiones del disco, osteocondrosis o espondilartrosis de la columna. Ver R 11.
Dismenorrea. Complementar con R 28 o R 75.
Hemorroides. Complementar con R 13.
Inflamaciones ginecológicas y quistes ováricos. Complementarse con R 38 o R 39.
Requerir tratamiento tópico. Utilizar pomada R 30.
Trastornos durante el climaterio. Complementar con R 10.
Varices. Complementar con R 42.

Dr. Reckeweg® R 51

Hipertiroidismo.
Gotas.

Composición:**THYREOSAN**

Gotas: *Iodum* D30 1 g, *Lapis albus* D12 1 g, *Lycopus virginicus* D12 1 g, *Natrium chloratum* D30 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 6 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Tratamiento coadyudante del bocio, hipertiroidismo.

Advertencias:

Si existe una enfermedad de la tiroides, no debe utilizarse el preparado sin consultar previamente al médico.

Durante el embarazo o periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas durante una semana, salvo prescripción facultativa. Pasado este tiempo, tomar 5-10 gotas 2 veces al día durante otra semana. La tercera semana tomar 5-10 gotas una vez al día. Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas de acuerdo con las indicaciones anteriores. El tratamiento puede ser administrado durante un periodo mayor de tiempo.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Iodum:** pérdida de peso a pesar de buena comida, taquicardia, pulsaciones en todo el cuerpo. Inquietud, sofocación y exudación.
- Lapis albus:** reconstituyente en el caso de estruma fibroso.
- Lycopus virginicus:** función cardíaca acelerada y arritmia.
- Natrium chloratum:** constitucional de irritaciones nerviosas, taquicardia y pérdida de peso.

En casos de:

Anemia. Ver R 31.

Angina de pecho. Ver R 2.

Climaterio. Complementar con R 10.

Diarreas. Ver R 4.

Estruma. Ver R 12.

Neurosis cardíaca. Ver R 22.

Requerir un sedante. Ver R 14.

Síntomas de insuficiencia cardíaca. Ver R 3.

Taquicardia y trastornos del ritmo cardíaco. Complementar con R 66.

Trastornos hormonales. Ver R 10, 19 o R 20.

Dr. Reckeweg® R 52

Malestar y mareo en viajes. Cinetosis.

Gotas.

Composición:**VOMISAN**

Gotas: *Apomorphinum hydrochloricum* D12 1 g, *Cocculus* D12 1 g, *Ipecacuanha* D8 1 g, *Nux vomica* D30 1 g, *Petroleum* D12 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g, 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Vómitos, mareos en viajes, hiperemesis gravídica. Vómitos acetonémicos de niños y lactantes. Mareos vestibulares (síndrome de Stokes-Adams). Náuseas por abuso de alcohol y nicotina.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 vez al día, salvo prescripción facultativa. Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas 1 vez al día.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Apomorphinum hydrochloricum:** vómitos de origen cerebral. Malestar constante.
- Cocculus:** sensación de vacío y mareos al mover la cabeza, al viajar en coche, por barco o avión.
- Ipecacuanha:** náuseas constantes con vómitos, incluso con el estómago vacío.
- Nux vomica:** irritaciones. Náuseas por abuso de alcohol y nicotina, vómitos por las mañanas.
- Petroleum:** irritación del canal digestivo con náuseas, mareos, especialmente al conducir.

En casos de:

Angina de pecho. Ver R 2.

Debilidad de la circulación de la sangre. Ver R 67.

Enfermedades renales. Ver R 64.

Espasmos intestinales. Ver R 37.
Hipotonía. Ver R 44.
Insuficiencia cardíaca. Ver R 3.
Jaqueca. Ver R 16.
Parásitos intestinales. Ver R 56.
Tosferina. Ver R 8 y R 9.
Trastornos del hígado. Ver R 7.
Úlceras gástricas e intestinales. Ver R 5.
Vértigos. Ver R 29.

Dr. Reckeweg® R 53

Acné.
Gotas.

Composición:

COMEDONIN

Gotas: *Bromum* D12 1 g, *Hepar sulfuris* D30 1 g, *Juglans* D30 1g, *Kalium bromatum* D12 1 g, *Natrium chloratum* D200 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Acné vulgar, granos. Piel grasa. Erupciones cutáneas en la pubertad.

Advertencias:

Hipersensibilidad al bromo.
Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Bromum, Kalium bromatum:** los componentes del bromo presentan un efecto específico a la piel. Pústula de acné duro con piel seca. Supuración de pústula seborréica.
- Hepar sulfuris:** efecto especial contra todo tipo de inflamaciones locales purulentas de la piel.
- Juglans:** específico contra acné, especialmente en el caso de jóvenes. Pústulas y comedones.
- Natrium chloratum:** acné, especialmente en la frente hasta la región capilar. Piel seca y grasienta.

En casos de:

Anemia. Ver R 31.
Ansiedad. Ver R 14.
Eczema. Ver R 23 y R 21.
Hiperhidrosis. Ver R 32.
Hipofunción glandular. Ver R 19 y R 20.
Precisar un depurativo sanguíneo. Alternar con R 60.
Supuraciones fuertes. Complementar con R 1.

Dr. Reckeweg® R 54

Falta de memoria.
Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

IMBELION

Gotas: *Anacardium* D6 1 g, *Kalium phosphoricum* D6 1 g, *Lycopodium* D30 1 g, *Phosphorus* D6 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 6 g. 43% vol. alcohol.

R 54 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Anacardium* D6 0,2 g, *Arsenicum album* D30 0,2 g, *Belladonna* D12 0,2 g, *Gelsemium* D12 0,2 g, *Kalium phosphoricum* D6 0,2 g, *Lycopodium* D30 0,2 g, *Phosphorus* D6 0,2 g, *Sepia* D8 0,2 g, *Isotonic NaCl solution* 0,4 g.

Indicaciones:

Falta de memoria. Trastornos del desarrollo psíquico de niños, dificultad escolar. Agotamiento mental. Reconstituyente cerebral.

Advertencias:

Gotas: durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Ampollas: no administrar a niños menores de 12 años. Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua una vez al día durante varias semanas, salvo prescripción facultativa.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas 1 vez al día.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Arsenicum album:** disminución de las fuerzas, sensaciones de angustia e intranquilidad. Miedo a la muerte, excitación y confusión en los pensamientos, debilidad de la capacidad de captación mental.

-**Anacardium:** relación organotrópica con el sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. Incapacidad de trabajo mental, falta de memoria, falta de confianza propia.

-**Belladonna:** congestión cerebral, hipersensibilidad de todos los sentidos. Somnolencia, falta de concentración.

-**Kalium phosphoricum:** con esfuerzos mentales excesivos acompañados de apatía, obnubilación de la cabeza y somnolencia diurna.

-**Lycopodium:** medio hepático. Mejora la función metabólica hepática. Tratándose de falta de memoria, confusión de palabras y de letras. Distracción y falta de pensamiento.

-**Phosphorus:** mucha excitabilidad nerviosa y debilidad del sistema nervioso. Temeroso y asustadizo, especialmente con tormentas y estando solo. Reconstituyente importante para el cerebro.

-**Sepia:** congestión en el sistema de la vena porta. Irritabilidad, embotamiento e indiferencia. Fala de concentración.

En casos de:

Anemia. Ver R 31.

Convulsiones. Ver R 33.

Envejecimiento. Ver R 2, R 12.

Hiperexcitabilidad neuromotora. Ver R 36.

Nerviosismo en niños. Complementar con R 36 o R 33.

Patologías geriátricas. Ver R 2 y R 12.

Trastornos del metabolismo del calcio. Ver R 34 o R 35.

Vértigos. Ver R 29.

Dr. Reckeweg® R 55

Heridas, lesiones y traumatismos.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:**RUTAVINE**

Gotas: *Arnica* D3 1 g, *Calendula* D3 1 g, *Hamamelis* D4 1 g, *Rhus toxicodendron* D6 1 g, *Ruta* D6 1 g, *Symphytum* D6 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 4 g, 47% vol. alcohol.

R 55 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Arnica* D4 0,2 g, *Belladonna* D4 0,2 g, *Calendula* D3 0,2 g, *Echinacea angustifolia* D4 0,2 g, *Hamamelis* D4 0,2 g, *Rhus toxicodendron* D6 0,2 g, *Ruta* D6 0,2 g, *Symphytum* D6 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Lesiones de todo tipo. Traumatismos. Prevención frente a agresiones (actividades violentas, extracciones dentales, etc.). Patología traumática de partes blandas. Traumatología deportiva. Agujetas.

Advertencias:

Hipersensibilidad al zumaque venenoso.

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en heridas y lesiones agudas, tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Arnica:** cuerpo cansado. Heridas sangrantes, remedio para la resorción en caso de hemorragias.

-**Belladonna:** obstrucciones sanguíneas locales con pulsación de los vasos y sensación de dolor golpeante.

-**Caléndula:** de acción especial en caso de heridas contusas y heridas difíciles de curar con destrucción del tejido.

-**Echinacea angustifolia:** previene las infecciones secundarias aumentando la resistencia a las infecciones bacterianas.

-**Hamamelis:** dolores y cansancio con relación organotrópica con el sistema venoso.

-**Rhus toxicodendron:** consecuencias de agotamientos y contusiones.

-**Ruta:** consecuencias de magulladuras, golpes o caídas. Cambios de tejido.

-**Symphytum:** lesiones de las articulaciones y del periostio. Estimula la formación de los huesos en caso de lesiones.

En casos de:

Infarto cardiaco. Alternar con R 67 y R 3 o R 2.

Profilaxis de trombosis venosa. Complementar con R 42.

Tendencia a colapso. Complementar con R 67.

Precisar un tratamiento externo. Ver R 30.

Dr. Reckeweg® R 56

Vermífugo.

Gotas.

Composición:**OXYSAN**

Gotas: *Artemisa vulgaris* D1 1 g, *Cina* D4 1 g, *Graphites* D30 1 g, *Mercurius sublimatus corrosivus* D6 1 g, *Tanacetum vulgare* D1 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 44% vol. alcohol.

Indicaciones:

Tratamiento de ayuda para la reducción de síntomas concomitantes de helmintiasis causadas por oxiuros o ascarides.

Advertencias:

Insuficiencia renal, hipersensibilidad al tanaceto y a otras flores compuestas. No debe administrarse a bebés ni infantes, ni debe utilizarse durante el embarazo ni el periodo de lactancia. Puede producirse sialorrea después de utilizar el preparado; en este caso, debe suspenderse el tratamiento.

Duración del tratamiento:

No debe utilizarse más de 1 semana sin consultar al médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1-2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas 1 o 2 veces al día, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Artemisa vulgaris:** convulsiones de niños con helmintiasis.

-**Cina:** niños pálidos con ojeras. Rechinamiento de dientes durante el sueño, miedo, convulsiones, picor de nariz. Sobre todo eficaz contra la ascárides.

- Graphites**: efecto constitucional. Hambre ávida, meteorismos, flatulencia.
- Mercurius sublimatus corrosivus**: inflamación de la mucosa intestinal y tenesmos. Sudor nocturno pegajoso.
- Tanacetum vulgare**: trastornos a causa de lombrices con prurito y sobresaltos durante el sueño.

En casos de:

- Asma alérgica. Ver R 43.
- Cólicos intestinales. Complementar con R 37.
- Enterocolitis. Ver R 4.
- Recidiva. Ver R 26.
- Trastornos hepáticos. Ver R 7.
- Trastornos estomacales. Ver R 5.
- Vómitos. Ver R 52.

Dr. Reckeweg® R 57

Insuficiencia pulmonar.
Gotas.

Composición:

SCOROSAN

Gotas: *Arsenum iodatum* D6 1 g, *Calcium carbonicum Hahnemanni* D30 1 g, *Lycopodium* D30 1 g, *Phosphorus* D30 1 g, *Silicea* D30 1 g, *Teucrium scorodonia* D6 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 4 g, 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Debilidad de los órganos parenquimatosos, especialmente de los pulmones.

Advertencias:

Si existe una enfermedad de tiroides, no debe utilizarse el preparado sin consultar previamente al médico.
Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 10 gotas disueltas en un poco de agua una vez al día durante una semana, continuar con la misma dosis 1 vez a la semana, salvo prescripción facultativa.
Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Arsenum iodatum**: tos irritativa con flema amarillenta, dolor en el pecho, sudor nocturno. Favorece la reabsorción, eficaz contra el proceso destructivo de los tejidos y la mucosa.
- Calcium carbonicum hahnemanni**: acción constitucional en el caso de flemáticos y escrofulosos con sudor en la cabeza, manos y pies húmedos, catarro de la mucosa crónico.
- Lycopodium**: desintoxica el hígado, aumenta el apetito.
- Phosphorus**: específico en el caso de enfermedades de los pulmones. Neumonía y afecciones tuberculosas. Constitucional sobre todo para asténicos.
- Silicea**: estimula el metabolismo del ácido silícico, en especial en caso de tuberculosis hiliar, pérdida de peso. Sudor.
- Teucrium scorodonia**: específico contra tuberculosis, enfermedades de los pulmones.

En casos de:

- Afecciones intestinales. Ver R 4.
- Bronquitis espástica. Complementar con R 8, R 9 o R 43.
- Complicaciones de la laringe. Ver R 45.
- Sudoración nocturna. Complementar con R 32.
- Pleuritis concomitante. Ver R 24.
- Requerir la estimulación del sistema inmune. Ver R 26.
- Sudoración nocturna. Ver R 32.
- Tuberculosis pulmonar incipiente. Ver R 48.

Dr. Reckeweg® R 58

Edema cardiaco.
Gotas.

Composición: VERNADON

Gotas: *Adonis vernalis* D2 1 g, *Convallaria majalis* D2 1 g, *Crataegus* D1 1 g, *Digitalis* D3 1 g, *Helleborus* D4 1 g, *Scilla* D2 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 4 g. 39% vol. alcohol.

Indicaciones:

Tratamiento coadyudante en descompensación cardiaca y circulatoria.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

En casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 2 horas, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Adonis vernalis:** efecto glucósido similar a digitalis, sin peligro de acumulación. Efecto diurético en el caso de arritmia y taquicardia.
- Convallaria majalis:** específico especial para trastornos del corazón.
- Crataegus:** debilidad del miocardio y de la circulación en la vejez, insuficiencia temprana. Eficaz para la coronaria.
- Digitalis:** insuficiencia cardiaca hipertrófica, pulso lento, arritmia y taquicardia, congestión del hígado y nicturia.
- Helleborus:** diuresis aumentada como consecuencia del efecto en el parénquima renal.
- Scilla:** fuerte efecto diurético sobre los riñones. Indicado para la hidropesía, pleuritis exudativa y arritmia.

En casos de:

Arritmia. Ver R 66.
Arterioesclerosis. Ver R 12.
Astenia. Ver Vita-C 15 Forte.
Climaterio. Ver R 10.
Diabetes mellitus. Ver R 40.
Edema renal. Ver R 64.
Inapetencia. Ver R 31.
Insuficiencia coronaria. Ver R 2.
Lesiones del miocardio, después de infarto cardiaco. Complementar con R 3.
Miocardiopatías de diversa etiología. Ver R 3.
Obesidad. Ver R 59.
Trastornos de la función glandular. Ver R 19 y R 20.

Dr. Reckeweg® R 59

Sobrepeso. Hipotiroidismo.
Gotas.

Composición: VESICULINE

Gotas: *Calcium carbonicum Hahnemanni* D12 1 g, *Fucus* D2 1 g, *Graphites* D12 1 g, *Natrium sulfuricum* D2 1 g, *Spongia* D3 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 5 g. 56% vol. alcohol.

Indicaciones:

Obesidad, tendencia a aumentar de peso por falta de actividad de la secreción glandular.

Advertencias:

Si existe una enfermedad de la tiroides, no debe utilizarse el preparado sin consultar previamente al médico.
Hipersensibilidad al yodo.
Puede agudizarse el hipertiroidismo.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 4-6 veces al día, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría reducir la frecuencia de administración a 1 o 2 veces al día. Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores. Se puede administrar durante un largo periodo de tiempo.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Calcium carbonicum Hahnemanni:** tipo adiposo con metabolismo lento. Manos y pies húmedos.
- Fucus y Spongia:** estimulante específico de la glándula tiroides.
- Graphites:** metabolismo débil con adiposidad y estreñimiento. Cansancio corporal y psíquico a menudo con hipo o amenorrea.
- Natrium sulfuricum:** estimulante de la función hepática y digestiva.

En casos de:

Adiposis hipofisaria. Complementar con R 19 o R 20.
Bocio. Ver R 12.
Celulitis. Ver R 1, R 20, R 27, R 42, R 60.
Climaterio. Complementar con R 10.
Descompensación cardíaca. Ver R 58.
Dismenorrea. Ver R 75.
Edemas renales. Ver R 64.
Estruma. Alternar con R 12.
Hipotensión. Ver R 44.
Insuficiencia cardíaca. Ver R 3.
Obesidad por disfunción hipofisaria. Ver R 19 o R 20.
Retención hídrica. Ver R 27, R 64.
Estasis circulatorio. Ver R 42.
Estasis linfático. Ver R 60.

Dr. Reckeweg® R 60

Depurativo general.
Gotas.

Composición:**PURHAEMINE**

Gotas: *Fumaria officinalis* D6 1 g, *Hepar sulfuris* D12 1 g, *Juglans* D6 1 g, *Sarsaparilla* D6 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 6 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Depurativo. Erupciones cutáneas crónicas asociadas a una deficiente depuración sanguínea.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 2-3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa. Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Fumaria officinalis:** afecciones escrofulosas, tumefacción de las glándulas e impurezas de la sangre.
- Hepar sulfuris:** curativo de forúnculos con pus y abscesos.
- Juglans:** depurativo de la sangre.
- Sarsaparilla:** niños con problemas de crecimiento y eczemas.

En casos de:

Anemia. Ver R 31.
Acné vulgar. Ver R 53.
Eczemas. Ver R 23 y R 21.
Exudación. Ver R 32.
Requerir la estimulación del sistema inmune. Ver R 26.
Tuberculosis pulmonar. Ver R 48 y R 57.
Tumores. Ver R 17.

Dr. Reckeweg® R 61

Reumatismo, lumbago, ciática.
Pomada.

Composición:

LUMBAGIN

Pomada: *Berberis* Ø=D1 0,1 g, *Camphora* D3 1,0 g, *Dulcamara* D1 0,1 g, *Nux vomica* D1 0,1 g, *Oleum Gaultheriae* D1 3,5 g, *Oleum Pini silvestris* D1 2,0 g, *Rhododendron* D1 0,1 g, *Rhus toxicodendron* D1 0,1 g, *Oleum Lavandulae* 1,0 g, *Unguentum Alcoholum Lanae ad* 100 g.

Indicaciones:

Reumatismo muscular agudo y crónico, lumbago, ciática, artritis.

Advertencias:

No usar en caso de: hipersensibilidad al salicilato y a las plantas de la familia anacardiáceas, piel hinchada, heridas abiertas, tos convulsiva, asma, ni en niños menores de 12 años.

Durante el periodo de embarazo y lactancia, no usar la pomada sin consultar a su médico. No aplicar en exceso en mujeres lactantes y no aplicar en la zona de los pechos.

En caso de irritación de piel con rojeces e hinchazón, ataque de bronquios intenso, se debe suspender el tratamiento y consultar con el médico.

Podría potenciar el efecto de otros medicamentos de uso tópico.

Posología:

Salvo recomendaciones específicas, aplique esta pomada 2-3 veces al día en la zona afectada. No aplicar la pomada en la cara, ojos o membranas mucosas. Aplicar sólo en la piel sana y sin heridas. Después de la aplicación lavar a fondo las manos.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Berberis:** dolor dorsal con sensación de cansancio.

-**Camphora:** espasmos, dolores debidos a esguinces y torceduras, sensación de entumecimiento y sensación de frío.

-**Dulcamara:** dolores reumáticos neurálgicos de las extremidades y articulaciones con entumecimientos muchas veces después de sentarse en fondos fríos.

-**Nux vomica:** dolores lumbares fuertes que empeoran estando sentado y por la noche, también al levantarse por la mañana.

-**Rhododendron:** reumatismo de las articulaciones pequeñas, con dolores fuertes antes de tormentas o lluvias.

-**Rhus toxicodendron:** tirones reumáticos de las extremidades y las articulaciones. Empeoramiento de los ataques por la noche e inmovilidad, durante movimiento constante presentan mejoría.

En casos de:

Precisar un tratamiento interno. Ver R 11 y R 71.

Dr. Reckeweg® R 62

Inflamaciones de las membranas mucosas, sarampión y rubeola.
Gotas.

Composición:

MORBILIN

Gotas: *Arum triphyllum* D3 2 g, *Belladonna* D4 2 g, *Ferrum phosphoricum* D8 2 g, *Mercurius solubilis Hahnemanni* D8 2 g, *Pulsatilla* D4 2 g. 35% vol. alcohol.

Indicaciones:

Inflamación de las membranas mucosas, sarampión y rubeola.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Puede producirse hipersecreción salival después de utilizar el preparado; en este caso, debe suspenderse el tratamiento.

Posología:

Gotas: en casos agudos; niños de 0-12 meses, tomar 2-3 gotas disueltas en un poco de agua cada 2 horas; niños de 2-5 años tomar 3-5 gotas; niños 6-12 años tomar 5-8 gotas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Arum triphyllum*: irritación y punzadas de la mucosa inflamada con picor en los ojos y exantema de la piel.
- Belladonna*: inflamación aguda con fiebre y congestión cerebral, mucosa seca. Eficaz especialmente en el caso de enfermedades de las vías respiratorias altas con fiebre.
- Ferrum phosphoricum*: conjuntivitis, hipersensibilidad a la luz, exudación pegajosa.
- Mercurius solubilis Hahnemanni*: conjuntivitis, hipersensible a la luz. Sudor pegajoso.
- Pulsatilla*: específico contra el sarampión.

En casos de:

- Afecciones pulmonares (riesgo). Ver R 48.
- Anemia. Ver R 31.
- Anginas u otitis media concomitante. Complementar o alternar con R 1.
- Bronquitis. Complementar con R 8 y R 9.
- Conjuntivitis con enrojecimiento. Ver R 78.
- Convulsiones relacionadas con fiebre en enfermedades exantémicas. Ver R 33.
- Enfermedades gripales. Complementar o alternar con R 6.
- Enfermedades pulmonares específicas. Complementar con R 48.
- Exantema. Alternar con R 23.
- Predisposición a tuberculosis pulmonar. Ver R 57.
- Sarampión. Continuar la dosis con R 23.
- Sinusitis. Complementar con R 49.

Dr. Reckeweg® R 63

Afecciones de la circulación periférica. Raynaud. Sabañones. Calambres musculares. Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

ENDANGITIN

Gotas: *Cuprum aceticum* D6 1 g, *Secale cornutum* D4 1 g, *Tabacum* D4 1 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 7 g, 36% vol. alcohol.

R 63 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Aesculus* D6 0,6 g, *Cuprum aceticum* D6 0,2 g, *Potentilla anserina* D6 0,4 g, *Secale cornutum* D6 0,2 g, *Tabacum* D6 0,2 g, *Veratrum album* D6 0,2 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Vasculopatías periféricas, acroparestesia, calambres en las pantorrillas, venopatías. Endangeitis obliterante. Síndrome de Leriche. Enfermedad de Raynaud.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.
Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa. Puede ser administrado durante un largo periodo de tiempo.
Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Aesculus*: congestión venosa especialmente en pelvis pequeñas.
- Cuprum aceticum*: estados convulsivos de la musculatura voluntaria e involuntaria. Calambres en las pantorrillas.
- Tabacum*: calambres en los brazos y piernas con debilidad. Cosquilleo y hormigueo.
- Potentilla anserina*: espasmos de diversos géneros, especialmente también calambres en las pantorrillas.
- Secale cornutum*: gangrena diabética, sensación de entumecimiento y parestesias en los miembros. Calambres de la musculatura con frío e insensibilidad.
- Veratrum album*: sensación de frío en todo el cuerpo, calambres en los músculos de las pantorrillas, entumecimiento e insensibilidad.

En casos de:

Angina de pecho. Ver R 2.
Angiopatía diabética. Ver R 40.
Arterioesclerosis. Complementar con R 12.
Diabetes angiopática. Complementar con R 40.
Estasis venosa. Complementar con R 42.
Parestesia. En caso de ciática ver R 71.

Dr. Reckeweg® R 64

Albuminuria.
Gotas.

Composición:
NEPHRALBIN

Gotas: *Helonias dioica* D3 2 g, *Kalium arsenicosum* D4 2 g, *Phosphorus* D6 2 g, *Plumbum metallicum* D12 2 g, *Solidago virgaurea* D2 2 g. 41% vol. alcohol.

Indicaciones:

Proteinuria, coadyudante en el tratamiento de la nefrosis, nefroesclerosis.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Duración del tratamiento:

No debe utilizarse más de 4 semanas.

Posología:

Gotas: tomar 10-15 gotas disueltas en un poco de agua, 3 veces al día 30, minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Helonias dioica*: extenuación, dolores lumbares. Sensación de presión y tirantez en la región de los riñones.
- Kalium arsenicosum*: nefritis crónica con edemas, trastornos cardiacos.
- Phosphorus*: debilidad. Orina albuminosa con sangre y cilindros. Degeneración del parénquima.
- Plumbum metallicum*: orina escasa, albuminuria.
- Solidago virgaurea*: efecto específico orgánico en los riñones. Nefritis crónica.

En casos de:

Cistitis concomitante con adenoma prostático. Ver R 25.
Cistopielitis. Ver R 18 y R 1.
Nefritis aguda y crónica. R1, R 6.
Nefrolitiasis. Ver R 27 y/o R 1.
Recidiva. Alternar con R 1.
Estimulación del drenaje mesenquimal. Ver R 60.

Dr. Reckeweg® R 65

Psoriasis.
Gotas.

Composición:
PSORIASIN

Gotas: *Arsenicum album* D12 1 g, *Berberis aquifolium* Ø=D1 3 g, *Calcium carbonicum Hahnemanni* D30 1 g, *Graphites* D12 1 g, *Hydrocotyle asiatica* D2 3 g, *Natrium chloratum* D30 1 g. 70% vol. alcohol.

Indicaciones:

Psoriasis vulgar, eczemas psoriasiformes.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Arsenicum album:** piel con escozor y prurito, piel seca, escamosa.

-**Berberis aquifolium:** especial en el caso de psoriasis.

-**Calcium carbonicum Hahnemanni:** constitucional, efectivo para el metabolismo con tendencia a diátesis exudativa, linfatismo.

-**Graphites:** de efecto constitucional, acciona el metabolismo retardado con tendencia a obesidad. Piel seca y agrietada. Erupción de caspa y sudor en la piel de la cabeza.

-**Hydrocotyle asiatica:** apariciones diferentes en la piel. Manchas rojizas con borde escamoso.

-**Natrium chloratum:** efecto constitucional en el metabolismo, de disposición hipertiroidea. Eficaz en la piel con eczema prolongado.

En casos de:

Artropatía psoriásica. Ver R 73.

Conjuntivitis. Ver R 78.

Desear aumentar el efecto de Dr. Reckeweg R 65. Complementar con R 21, tomando 10-15 gotas en un poco de agua 1-2 veces al día durante un tiempo prolongado.

Estimulación del drenaje mesenquimal. R 60 + R 64 + R 7.

Tensión nerviosa. Ver R 14.

Trastornos de la función endocrina. Complementar con R 19 o R 20, tomando 10-15 gotas en un poco de agua una vez al día, durante una semana.

Dr. Reckeweg® R 66

Arritmia cardíaca.

Gotas.

Composición:**ARRHYTHMIN**

Gotas: *Iberis amara* D3 1 g, *Leonurus cardiaca* D2 2 g, *Oleander* D3 1 g, *Spartium scoparium* D2 2 g, *Sumbulus moschatus* D2 2 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 2 g. 39% vol. alcohol.

Indicaciones:

Coadyudante en el tratamiento de trastornos del ritmo cardíaco. Neurosis cardíaca.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años. Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos, tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-**Iberis amara:** palpitaciones por cualquier movimiento. Dolor cardíaco con pulso irregular. Excitabilidad nerviosa.

-**Leonurus cardiaca:** efecto tónico al miocardio.

-**Oleander:** taquicardia y dolores cardíacos, luego con pulso lento e interrupciones.

-**Spartium scoparium:** irregularidades aceleradas con interrupción del pulso. Taquicardia e intranquilidad con empeoramiento durante la noche.

-**Sumbulus moschatus:** palpitaciones fuertes por el menor movimiento. Arritmia cardíaca.

En casos de:

Alteraciones del ritmo con base coronario-esclerótica. Ver R 12.

Angina de pecho. Ver R 2.

Descompensación. Ver R 58.

Infarto cardíaco. Ver R 67 y R 55.

Insuficiencia cardíaca y degeneración del miocardio. Ver R 3.

Miocarditis y endocarditis. Ver R 22.

Dr. Reckeweg® R 67

Insuficiencia circulatoria aguda y crónica.
Gotas.

Composición:

KOLLAPSIN

Gotas: *Acidum hydrocyanicum* D6 1 g, *Ammonium carbonicum* D2 1 g, *Camphora* D2 2 g, *Carbo vegetabilis* D30 1 g, *Tabacum* D6 1 g, *Veratrum album* D4 3 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 1 g. 38% vol. alcohol.

Indicaciones:

Insuficiencia circulatoria aguda, colapso vasomotor, debilidad circulatoria crónica.

Advertencias:

No administrar a bebés ni a niños menores de 8 años.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 15 minutos, salvo prescripción facultativa.

Para estabilizar la circulación tomar 5-10 gotas 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas. Puede ser administrado durante un periodo de tiempo mayor.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Acidum hydrocyanicum*: colapso cardiaco con exudación fría y sofocos. Vértigos y colapsos.

-*Ammonium carbonicum*: pulso débil con exudación y miedo.

-*Camphora*: analéptico de colapsos vasomotores con sudor frío, palidez y cianosis, pulso débil.

-*Carbo vegetabilis*: sensación de irritación en el pecho con debilidad y taquicardia. Miedos y sofocos.

-*Tabacum*: pulso muy débil con palidez de la cara, sudor y náuseas.

-*Veratrum album*: colapso total de la circulación, sudor frío, pulso débil, manos frías y pálidas, desvanecimiento.

En casos de:

Astenia circulatoria en climaterio. Complementar con R 10.

Convalecencia. Ver R 31.

Gripe. Ver R 6.

Hipotonía. Alternarse con R 44.

Hipotonía durante enteritis. Ver R 4.

Infarto cardiaco agudo. Complementar con R 67, R 55 y R 2. Al comienzo, aplicar cada 5-10 minutos según la gravedad, luego se reduce a 1/2-1-2 horas.

Requerir un profiláctico. Está indicado R 3 alternado con R 2.

Síndrome psicoasténico. Ver Vita-C 15.

Vértigos. Ver R 29.

Dr. Reckeweg® R 68

Herpes zóster y varicela.
Gotas.

Composición:

HERPEZOSTIN

Gotas: *Croton tiglium* D6 2 g, *Mezereum* D3 5 g, *Natrium chloratum* D6 1 g, *Rhus toxicodendron* D4 2 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Herpes zóster, varicela.

Advertencias:

Hipersensibilidad al zumaque venenoso.

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Raramente pueden darse molestias gastrointestinales o reacciones cutáneas, incluso varios días después de la medicación. En estos casos, el tratamiento debe ser interrumpido.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 1-2 horas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Croton tiglium*: ampollas rojizas con prurito y ardor.

-*Mezereum*: ampollitas humectantes rojizas con prurito e irritación. Neuralgia.

-*Natrium chloratum*: herpes labiales.

-*Rhus toxicodendron*: ampollitas con prurito y ampollas en la piel. Piel rojiza y dolorosa.

En casos de:

Eczema agudo y crónico. Ver R 23.

Inflamación local de las glándulas linfáticas. Complementar con R 1.

Linfoadenopatía satélite. Ver R 1.

Localización del herpes en el tórax. Combinar R 68 con R 69, tomándose 10 gotas cada 1/2-1-2 horas. Con mejoría se reduce la dosis.

Localización oftálmica. Ver R 78.

Neuralgia concomitante. Complementar con R 69 y R 70.

Pecisar tratamiento tópico. Ver R 30.

Recuperación lenta. Complementar con R 26.

Varicela. Complementar con R 6.

Dr. Reckeweg® R 69

Neuralgias intercostales.

Gotas.

Composición:

INTERCOSTALIN

Gotas: *Arsenicum album* D12 1 g, *Colocynthis* D12 1 g, *Ranunculus bulbosus* D2 7 g, *Rhus toxicodendron* D30 1 g, 39% vol. alcohol.

Indicaciones:

Neuralgia intercostal.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años. Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 1-2 horas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 2-3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Arsenicum album*: dolores punzantes con mejora al contacto externo con calor y muchas veces empeoramiento durante la noche.

-*Colocynthis*: neuralgia y dolores neuríticos. Dolor intercostal.

-*Ranunculus bulbosus*: relación organotrópica a la caja torácica con dolores fuertes.

-*Rhus toxicodendron*: dolores reumáticos neurálgicos con inquietud y mejoría después de movimiento.

En casos de:

Ciática. Ver R 71.

Espondilartrosis de la columna vertebral dorsal. Complementar con R 11.

Hernias discales y osteocondrosis dorsal. Ver R 11.

Herpes zóster adicional. Complementar con R 68, tomándose cada 1/2-1-2 horas.

Neuralgia del trigémino facial. Adicionar R 70.

Pleuritis. Complementar con R 24.

Pecisar tratamiento tópico. Ver R 30 o R 61.

Dr. Reckeweg® R 70

Dolores neurálgicos de diversa localización especialmente en la zona de la cabeza.
Gotas.

Composición: PROSOPALGIN

Gotas: *Aconitum* D4 2 g, *Cedron* D4 2 g, *Colocynthis* D6 2 g, *Kalmia* D3 2 g, *Verbascum* D2 2 g, 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Neuralgias de todo tipo. Neuralgia del trigémino. Neuritis.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años. Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 1-2 horas, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Aconitum:** dolores irritantes, parestesia y anestesia después de influencia del frío fresco.
- Cedron:** ataques de dolor periódicos, muchas veces en el lado izquierdo supraorbital.
- Colocynthis:** dolores espasmódicos, con frecuencia en la región infraorbital con radiaciones a la vista, en especial el lado izquierdo.
- Kalmia:** punzadas e irritaciones imprevistas, en especial en el lado derecho supraorbital.
- Verbascum:** neuralgia infra y supraorbital periódica.

En casos de:

Ataques neurálgicos reumáticos. Complementar con R 11.
Ciática. Ver R 71.
Neuralgia intercostal. Ver R 69.
Neuralgia del occipital y ciliar. Alternar con R 16.
Precisar tratamiento tópico. Complementar con R 30 o R 61.
Reumatismo del hombro. Ver R 46.
Sinusitis concomitante adicional. Alternar con R 49 (cada 1-2 horas).

Dr. Reckeweg® R 71

Ciática.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebida diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición: ISCHIALGIN

Gotas: *Aconitum* D4 2 g, *Arsenicum album* D30 2 g, *Colocynthis* D4 2 g, *Gnaphalium polycephalum* D3 2 g, *Magnesium phosphoricum* D8 2 g, 36% vol. alcohol.

R 71 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Aconitum* D4 0,4 g, *Arsenicum album* D30 0,4 g, *Colocynthis* D4 0,4 g, *Gnaphalium polycephalum* D3 0,4 g, *Magnesium phosphoricum* D8 0,4 g, en solución isotónica.

Indicaciones:

Ciática, isquialgia. Hernia discal. Parestesia en extremidades inferiores.

Advertencias:

Ampollas: no administrar a niños menores de 12 años. Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 1-2 horas, salvo prescripción facultativa.
Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Ampollas inyectables (también bebibles): 1 ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Aconitum:** picazón y dolores en las piernas después de resfriado.
- Arsenicum album:** dolores irritantes, especialmente durante la noche con mejoría al contacto con el calor.
- Colocynthis:** dolores fuertes que aumentan con el mínimo movimiento, frío o contacto. Sensación de tirantez espasmódica del nervio ciático.
- Gnaphalium polycephalum:** nerviosismo con picazón y prurito con mejoría al sentarse.
- Magnesium phosphoricum:** dolores durante la noche que mejoran al presionar y al contacto con el calor.

En casos de:

Adenomatosis prostática. Ver R 25.
Ciática después de humedades. Complementar con R 11.
Diabetes mellitus concomitante. Ver R 40.
Hipertrofia de la próstata. Completar con R 25.
Neuralgia intercostal. Ver R 69.
Neuralgia del trigémino facial. Ver R 70.
Precisar tratamiento tópico. Ver R 61 y R 30.
Síndrome radicular (hernia discal, espondilartrosis de la columna vertebral). Completar con R 11.
Trastornos de la circulación con acroparatesias, Ver R 63.

Dr. Reckeweg® R 72

Afecciones pancreáticas.
Gotas.

Composición:
PANKROPATIN

Gotas: *Colocynthis* D6 2 g, *Lycopodium* D6 2 g, *Momordica balsamina* D3 2 g, *Phosphorus* D6 2 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 2 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:
Pancreopatías.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años. Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 vez al día, salvo prescripción facultativa.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Colocynthis:** ataques espásticos en el vientre, que mejoran al encogerse.
- Lycopodium:** meteorismo en el epigastrio izquierdo.
- Momordica balsamina:** flatulencia a la altura de la flexura del brazo.
- Phosphorus:** síntomas gástricos, deposiciones grasosas. Degeneración adiposa.

En casos de:

Afecciones estomacales. Complementar con R 5.
Cólicos abdominales. Ver R 37.
Comienzo de pancreatitis aguda. R 1 de 10-15 gotas cada 4-6 veces al día; así como también R 72 de 10-15 gotas 3 veces al día antes de las comidas. Con mejoría se reduce la frecuencia.
Inapetencia. Ver R 31.
Síntomas concomitantes del hígado y vesícula. Complementar con R 7.
Vómitos. Ver R 52.

Dr. Reckeweg® R 73

Artrosis.

Gotas y ampollas inyectables o bebibles (toda ampolla inyectable puede administrarse como bebible diluyéndola en un vaso o botella pequeña de agua y tomándola a pequeños sorbos a lo largo del día).

Composición:

SPONDARTHIN

Gotas: *Acidum sulfuricum* D6 2 g, *Argentum metallicum* D12 1 g, *Arnica* D4 2 g, *Bryonia* D4 2 g, *Causticum Hahnemanni* D12 1 g, *Ledum* D3 2 g. 38% vol. alcohol.

R 73 INJECT

Ampollas inyectables (también bebibles): *Acidum sulfuricum* D6 0,4 ml, *Argentum metallicum* D12 0,2 ml, *Arnica* D4 0,4 ml, *Bryonia* D4, 0,4 ml, *Causticum Hahnemanni* D12 0,2 ml, *Ledum* D4 0,4 ml, en solución isotónica.

Indicaciones:

Artrosis, particularmente de las articulaciones grandes. Coxatrosis, gonartrosis. Espondiloartrosis.

Advertencias:

No administrar a menores de 12 años. Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 2 horas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Ampollas inyectables (también bebibles): una ampolla 1-3 veces a la semana por vía subcutánea u oral. En casos agudos, 1 ampolla diaria.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- ***Acidum sulfuricum:*** dolores de las diferentes articulaciones. Influencia intensiva del metabolismo del cartílago.
- ***Argentum metallicum:*** artralgia y degeneración de las articulaciones.
- ***Arnica:*** sensibilidad dolorosa de las articulaciones.
- ***Bryonia:*** articulaciones inflamadas, rígidas con dolor al moverse.
- ***Causticum Hahnemanni:*** deformación de las articulaciones con debilidad y rigidez semejante a la parálisis.
- ***Ledum:*** dolores reumáticos de las articulaciones, calambres dolorosos en las caderas.

En casos de:

Adenomatosis prostática. Ver R 25.

Artritis aguda. Ver R 24.

Ciática. Complementar con R 71.

Dolores lumbares de la mujer. Ver R 50.

Hipertrofia de la próstata. Ver R 25.

Osteoporosis. Complementar con R 34.

Precisar tratamiento tópico. Ver R 30 y R 61.

Reumatismo escapular de los brazos y de las manos. Ver R 46.

Síntomas reumáticos concomitantes, así como hernia discal y espondiloartrosis de la columna vertebral. Alternar con R 11.

Dr. Reckeweg® R 74

Debilidad de la vejiga.

Gotas.

Composición:

NOCTURNIN

Gotas: *Causticum Hahnemanni* D30 1 g, *Ferrum phosphoricum* D8 2 g, *Kalium phosphoricum* D12 2 g, *Pulsatilla* D12 2 g, *Sepia* D6 2 g, *Ethanolum / Aqua purificata* 1 g. 36% vol. alcohol.

Indicaciones:

Eneuresis nocturna y diurna, vejiga débil.

Advertencias:

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Niños de 2 a 5 años: tomar 3-5 gotas en un poco de agua, 30 minutos antes de las comidas. La dosis puede reducirse a 2 veces al día después de 2-3 semanas.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Causticum Hahnemanni:** eficaz especialmente para la insuficiencia del músculo de la vejiga.
- Ferrum phosphoricum:** orina involuntaria, también durante el día.
- Kalium phosphoricum:** predisposición nerviosa. Debilidad nerviosa de los músculos.
- Pulsatilla:** orina involuntaria, especialmente de jovencitas.
- Sepia:** enuresis al primer sueño. Relación al sistema sexual.

En casos de:

Afecciones prostáticas. Complementarse con R 25.

Cistitis. Complementarse con R 18.

Dr. Reckeweg® R 75

Dismenorrea.
Gotas.

Composición:**DOLOMENSIN**

Gotas: *Caulophyllum* D2 2 g, *Chamomilla* D30 1 g, *Cimicifuga* D3 2 g, *Cuprum aceticum* D4 2 g, *Magnesium phosphoricum* D6 1 g, *Viburnum opulus* D2 2 g. 39% vol. alcohol.

Indicaciones:

Dolores de la menstruación, dismenorrea. Espasmos dolorosos del útero.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Caulophyllum:** ataques y dolores espasmódicos en el abdomen.
- Chamomilla:** dolores insoportables con hipersensibilidad.
- Cimicifuga:** dolores fuertes punzantes en el vientre.
- Cuprum aceticum:** dismenorrea grave.
- Magnesium phosphoricum:** dismenorrea con mejoría al comienzo de la menstruación.
- Viburnum opulus:** espasmos del hipogastrio. Regla frecuentemente interrumpida.

En casos de:

Afecciones abdominales laterales. Ver R 38, R 39.

Espasmos en el abdomen. Complementar con R 37.

Hipotensión. Ver R 44.

Migrañas. Ver R 16.

Menorragia y metrorragia. Ver R 28.

Vómitos. Ver R 52.

Dr. Reckeweg® R 76

Tratamiento constitucional del asma.
Gotas.

Composición:

HERBAMINE FORTE

Gotas: *Aconitum* D3 0,1 g, *Ammi visnaga* D2 0,1 g, *Convallaria majalis* D1 0,5 g, *Drosera* D1 2,5 g, *Kalium iodatum* D3 0,1 g, *Lobelia inflata* D3 0,2 g, *Mentholum* D2 2,5 g, *Stramonium* D3 0,2 g, *Ethanolum* / *Aqua purificata* 3,8 g. 52% vol. alcohol.

Indicaciones:

Tratamiento constitucional del asma.

Advertencias:

Hipersensibilidad a la iodina. En caso de enfermedad de tiroides consultar al especialista.
No administrar a bebés ni a niños menores de 12 años.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Aconitum:** punzadas en el pecho, angustia y miedo a la muerte, tos seca y jadeante, sensación de opresión en el pecho.
- Ammi visnaga:** trastornos circulatorios, afecciones cardíacas.
- Convallaria majalis:** gran disnea, taquisistolia, dolores punzantes en el pecho.
- Drosera:** asma con violentos espasmos, cianosis y náuseas.
- Kalium iodatum:** despliega su acción en las fases de respuesta con debilidad de la defensa propia del cuerpo.
- Lobelia inflata:** asma bronquial, tos espasmódica.
- Mentholum:** para una mejor respiración y para abrir las vías respiratorias.
- Stramonium:** respiración jadeante, opresión en el pecho.

En casos de:

Angina de pecho. Ver R 2.
Asma bronquial (terapia constitucional). Ver R 43.
Catarro del fumador. Ver R 48.
Complicaciones infectivas. Ver R 1 y R 6.
Debilidad nerviosa. Ver Vita-C 15.
Diátesis tuberculosa en fase de latencia. Ver R 57.
Insuficiencia cardíaca. Ver R 3.
Laringitis aguda y crónica. Ver R 45.
Precisar depuración sanguínea. Ver R 60.
Recidiva y estados agudos. Ver R 43.
Tabaquismo. Ver R 77.
Trastornos del sueño. Ver R 14.

Dr. Reckeweg® R 77

Síndrome de abstinencia al tabaco y síntomas de un excesivo consumo de éste.
Gotas.

Composición:

FUMACIN

Gotas: *Agaricus* D5 1,5 g, *Echinacea angustifolia* D10 1,2 g, *Natrium chloratum* D2 2,4 g, *Robinia pseudacacia* D6 1,2 g, *Tabacum* D4 2,4 g, *Ethanolum* / *Aqua purificata* 1,3 g. 38% vol. alcohol.

Indicaciones:

Tratamiento de los efectos secundarios del tabaquismo. Abstinencia del fumador.

Advertencias:

No administrar a menores de 12 años. Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa. (Se prohíbe estrictamente fumar).

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Agaricus:** estados de excitación, apoplejía irregular. Intranquilidad motriz.
- Echinacea angustifolia:** estimulación de los sistemas de defensa. Estimulación de los mecanismos desintoxicadores de las células. Afecciones inflamatorias y sépticas.
- Natrium chloratum:** dolores de la cabeza en los temporales, palpitación arrítmica, estreñimiento con heces duras y secas. Irritabilidad nerviosa con hipersensibilidad contra las influencias externas.
- Robinia pseudacacia:** debilidad gástrica con dolores de la cabeza en la frente, obnubilación e insuficiencia cardíaca.
- Tabacum:** contrarresta el abuso de nicotina con colapso, palidez, sudoración, temblor, frío en los miembros, neuralgias y vértigo, náuseas y vómitos. De acción específica contra los trastornos de la perfusión arteriales periféricos. Constricciones vasculares de las piernas. Angiospasmos. Parestesias.

En casos de:

Afecciones hepáticas y biliares. Ver R 7.
Ansiedad. Ver R 14.
Arterioesclerosis general. Ver R 12.
Catarro del fumador. Ver R 48, R 8.
Molestias varicosas. Ver R 42.
Nerviosismo asociado. Ver R 14.
Precisar aumentar la capacidad de respuesta a la medicación. Ver R 26.
Precisar depuración sanguínea. Ver R 60.
Tendencia al sobrepeso. Ver R 59.
Trastornos de la perfusión periférica. Ver R 63.

Dr. Reckeweg® R 78

Afecciones oculares (vía oral).
Gotas.

Composición:**OCUVIT**

Gotas: *Aconitum* D4 0,75 g, *Apis* D4 0,75 g, *Belladonna* D4 0,75 g, *Euphorbia cyparissias* D3 0,70 g, *Euphorbium* D4 0,05 g, *Euphrasia* D2 0,70 g, *Hamamelis* D2 0,75 g, *Kalium carbonicum* D4 0,70 g, *Mercurius biiodatus* D5 0,70 g, *Rhus toxicodendron* D4 0,70 g, *Ruta* D2 0,75 g, *Scrophularia nodosa* D2 1,00 g, *Spigelia anthelmia* D4 0,70 g, *Staphisagria* D4 0,70 g, *Sulfur* D4 0,30 g. 40% vol. alcohol.

Indicaciones:

Conjuntivitis crónica, orzuelos, blefaritis, conjuntivitis catarral, dolores de los ojos.

Advertencias:

Insuficiencia renal; hipersensibilidad al zumaque venenoso.
No debe administrarse a bebés ni infantes, ni debe utilizarse durante el embarazo ni el periodo de lactancia. Si existe una enfermedad de la tiroides, no debe utilizarse el preparado sin consultar previamente al médico.
Puede producirse sialorrea después de utilizar el preparado; en este caso, debe suspenderse el tratamiento. Raramente pueden darse molestias gastrointestinales y reacciones cutáneas incluso días después de la medicación. En estos casos debe suspenderse el tratamiento.

Duración del tratamiento:

No debe utilizarse más de 1 semana sin consultar al médico.

Posología:

Gotas: tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Aconitum:** tonificación vascular, de acción antineurálgica.
- Apis:** dolores urentes, punzantes, tumefacciones edematosas, sensibilidad al tacto.
- Belladonna:** fases de respuesta localizadas, blefaritis marginal, dolores de la cabeza, espasmos, sequedad de la mucosa.
- Euphorbia cyparissias:** irritaciones de los nervios y de la mucosa.

- Euphorbium**: lagrimeo, catarros de la mucosa, trastornos visuales, diplopía, blefaritis, conjuntivitis.
- Euphrasia**: oftalmodinia, fotofobia, presión del bulbo ocular, conjuntivitis, lagrimeo, blefaritis ciliar, úlcera corneal, iritis con trastornos visuales y astenopía. Glaucoma.
- Hamamelis**: oftalmodinia, hemorragia cristalina, debilidad vascular, catarros por estasis e inflamación.
- Kalium carbonicum**: tumefacción edematosa de los párpados superiores y rubefacción de la conjuntiva.
- Mercurius biiodatus**: blefaritis ciliar, iritis, neuralgia ciliar, especialmente a la siniestra. Granulaciones de los párpados y oftalmia escrofulosa.
- Rhus toxicodendron**: conjuntivitis con tumefacción de los párpados y secreciones purulentas, bases reumáticas. Iritis e iridociclitis.
- Ruta**: trastornos visuales debidos a un esfuerzo excesivo de los ojos. Vista cansada, oftalmodinia general.
- Scrophularia nodosa**: oftalmias escrofulosas, orzuelo, párpados inflamados y purulentos.
- Spigelia anthelmia**: neuralgia ciliar, conjuntivitis con fotofobia. Iritis.
- Staphisagria**: orzuelo y chalazión. Blefaritis, trastornos visuales, prurito y escozor del borde palpebral.
- Sulfur**: oftalmias escrofulosas, párpados muy enrojecidos, orzuelo, catarata incipiente, blefaritis.

En casos de:

- Blefaritis. Ver R 21, R 23, R 53.
- Conjuntivitis asociada a diabetes. Ver R 40 y R 26.
- Conjuntivitis asociada a enfermedades exantémicas. Ver R 62.
- Conjuntivitis asociada a resfriado. Ver R 1 y R 6.
- Dolores. Ver R 81.
- Escozores y punzadas en las mucosas sensibles con irritaciones de los ojos. Ver R 62.
- Inflamaciones. Ver R 1 y R 55.
- Precisar aumentar la capacidad de respuesta. Ver R 26.
- Procesos inflamatorios. Alternar R 1 y R 62 con el R 78.

Dr. Reckeweg® R 80 - MUSCULIN

Lesiones musculares, entumecimiento articular.
Aceite.

Composición:

Oleum arachidis, *Oleum olivarium*, *Oleum arnicae infusum*, cera líquida.

Indicaciones:

Aceite para masajes terapéuticos musculares y en articulaciones.

Advertencias:

- Hipersensibilidad a la árnica o a otro de los ingredientes.
- No aplicar en heridas abiertas. Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.
- Infrecuentemente pueden producirse reacciones alérgicas de la piel.

Posología:

Aplicación tópica según necesidad.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Oleum arachidis**: ligero y excepcionalmente rico en vitaminas y minerales. Es bueno para todo tipo de pieles.
- Oleum olivarium**: suavizante y emoliente.
- Oleum arnicae infusum**: contiene un aceite esencial, fenoles, flavonoides y taninos. Posee un notable efecto sobre la circulación.

La acción conjunta de estos tres aceites produce un efecto vulnerario y antiinflamatorio local, siendo un gran remedio para aliviar dolores musculares y dolores provocados por contusiones.

En casos de:

- Ciática. Ver R 71.
- Cólicos. Ver R 37.
- Dolores intercostales. Ver R 69.
- Dolores nerviosos. Ver R 70.
- Dolores de espalda de la mujer. Ver R 50.

Espasmos de la menstruación. Ver R 75.
Jaqueca. Ver R 16.
Molestias ginecopáticas del costado derecho. Ver R 38.
Molestias ginecopáticas del costado izquierdo. Ver R 39.
Molestias de la dentición. Ver R 35.
Reuma muscular y molestias del cartílago intervertebral. Ver R 11.

Dr. Reckeweg® R 81

Dolores.
Gotas.

Composición:

MALDOL

Gotas: *Aranea diadema* D4 1 g, *Cimicifuga* D4 1 g, *Cocculus* D4 1 g, *Colocynthis* D4 1 g, *Cyclamen* D4 2 g, *Gelsemium* D3 1 g, *Ginkgo* D3 2 g, *Spigelia anthelmia* D4 1 g. 37% vol. alcohol.

Indicaciones:

Dolores de cabeza, dolores neurálgicos, dolores miálgicos, artralgias.

Advertencias:

Hipersensibilidad al Ginkgo biloba.
Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Gotas: en casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 2 horas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Niños de 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Aranea diadema:** trastornos de la tensión sanguínea, dolores de los nervios que se presentan periódicamente, artropatía dolorosa.
- Cimicifuga:** dolores reumáticos y de condición raquítea de los músculos, dolores espasmódicos del corazón, del conducto gastrointestinal, de la vesícula biliar y en área de los órganos sexuales femeninos.
- Cocculus:** sensación de vértigo de las más diversas etiologías, dolores de cabeza en el occipucio, espasmos, trastornos de la menstruación.
- Colocynthis:** espasmos dolorosos del conducto gastrointestinal, del sistema biliar, de los órganos urinarios, neuritis y dolores de los nervios, particularmente de la cara, dolor ciático.
- Cyclamen:** dolores de la cabeza, jaqueca, diversos dolores de la menstruación, reumatismo.
- Gelsemium:** dolores de la cabeza, afecciones espasmódicas.
- Ginkgo:** dolores de la cabeza, espasmos dolorosos que se producen al escribir. Trastornos de la perfusión particularmente en el área de la cabeza.
- Spigelia anthelmia:** carditis aguda, angina de pecho, dolores de los nervios, dolores de la cabeza.

En casos de:

Ciática. Ver R 71.
Colecistopatías. Ver R 7.
Cólico abdominal. Ver R 37.
Dismenorrea. Ver R 75.
Dolores articulares. Ver R 73.
Dolores intercostales. Ver R 69.
Dolores nerviosos. Ver R 70.
Dolores de espalda de la mujer. Ver R 50.
Espasmos de la menstruación. Ver R 75.
Jaqueca. Ver R 16.
Molestias ginecopatías del costado derecho. Ver R 38.
Molestias ginecopáticas del costado izquierdo. Ver R 39.
Molestias de la dentición. Ver 35.
Reuma muscular y las molestias del cartílago intervertebral. Ver R 11.
Sinusitis. Ver R 49.
Vértigos. Ver R 29.

Dr. Reckeweg® CICATÍN - Jugo de caléndula

Heridas de difícil cicatrización.
Jugo.

Composición:

Extracto de *Calendula officinalis* 100 g, excipientes c.s.p. 150 ml. 69,9% vol. alcohol.

Indicaciones:

Loción calmante y regeneradora de la piel.

Especialmente indicada en el tratamiento tópico de afecciones diversas de la piel y mucosas, como heridas, pieles inflamadas y reseca, picaduras de insectos y medusas, llagas y magulladuras, verrugas, contusiones e incluso para aliviar las molestias que ocasionan las leves quemaduras solares.

Aftas bucales, boqueras.

Advertencias:

No administrar a niños menores de 12 años.

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Posología:

Uso tópico. Aplicar la loción tópicamente sobre la piel afectada y dejar actuar.

Se puede diluir 1:10 con agua hervida para enjuagues bucales (aftas...).

Agitar antes de usar.

No utilizar sobre heridas abiertas, debido a su contenido en etanol.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

-*Calendula officinalis*: heridas y úlceras de mala curación; alivio del dolor, fomento de la cicatrización.

En casos de:

Inflamaciones. Ver R 1.

Lesiones. Ver R 55.

Precisar depurativo sanguíneo. Ver R 60.

Precisar linimento. Ver R 30.

Dr. Reckeweg® R 95 - Tónico de alfalfa

Anemia, pérdida de apetito, convalecencia, apoyo al crecimiento.
Jarabe.

Composición:

Jarabe: *Acidum phosphoricum* D2 4,0 ml, *Avena sativa* Ø 5,0 ml, *Calcium phosphoricum* D6 0,1 g, *China* Ø 0,25 ml, *Cinnamomum* Ø 0,5 ml, *Hydrastis* Ø 0,5 ml, *Magnesium phosphoricum* D6 0,1 g, *Alfalfa* Ø 1,0 ml, *Nux vomica* D3 1,0 ml, *Panax ginseng* Ø 1,0 ml, *Excip ad* 100 ml. 12% vol. alcohol.

Indicaciones:

Anemia, pérdida de apetito, convalecencia, especialmente después de fiebres debilitantes o de intervenciones quirúrgicas, pérdida de peso y apoyo al crecimiento.

Advertencias:

Hipersensibilidad a la quinina. Hipertensión. Su uso está contraindicado en bebés, niños pequeños y durante el embarazo y la lactancia.

No administrar a niños menores de 12 años, debido a la falta de datos.

Este producto contiene un 12% vol. alcohol. Cada dosis contiene hasta 0,5 g de alcohol.

Perjudicial para los que sufren enfermedades hepáticas, alcoholismo, epilepsia, lesión o enfermedad cerebral así como para embarazadas y niños. Puede modificar o incrementar los efectos de otras medicinas.

Si se toma durante un periodo prolongado de tiempo puede dar lugar a indigestión y estreñimiento.

En casos aislados podría propiciar la aparición de hemorragias debido a que induce a la trombocitopenia. Ocasionalmente, pueden aparecer reacciones alérgicas como reacciones cutáneas y fiebre.

Anticoagulantes orales (incrementa los efectos de los anticoagulantes).

Posología:

Jarabe: Adultos, 1 cucharada 3 veces al día; niños, 1 cucharadita 3 veces al día antes de las comidas.

Nota para diabéticos: una cucharadita de café = 5 ml = 0,09 BU.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Acidum phosphoricum**: agotamiento físico y psíquico, impotencia, debilidades de la concentración, apatía, cansancio diario.
- Alfalfa**: suministra aminoácidos.
- Avena sativa**: neurastenia, trabajo psíquico excesivo, debilidad sexual; contiene vitaminas y sustancias minerales.
- Calcium phosphoricum**: deficiencia de calcio, trastornos del crecimiento óseo.
- China**: tónico para el agotamiento general y enfermedad con impotencia subsiguiente.
- Cinnamomum**: hemorragias, inclinación a las hemorragias.
- Hydrastis**: aumenta el tono con pérdida de peso condicionada por la enfermedad.
- Magnesium phosphoricum**: estabilización del sistema nervioso central, dolores y espasmos de los nervios y de los músculos, neuralgia.
- Nux vomica**: dolores lumbares fuertes que empeoran estando sentado y por la noche, también al levantarse por la mañana.
- Panax ginseng**: estados de agotamiento de todas las clases; contiene vitaminas B1 y B2 (tiamina y riboflavina), así como componentes minerales con una alta cuota de sulfuro.

En casos de:

Anemia y falta de apetito. Ver R 31.

Debilidad general. Ver R 26.

Convalecencia. Ver Vita-C 15 Forte.

Trastornos glandulares de la secreción interna. Ver R 19 y R 20.

Dr. Reckeweg® Pulsatilla compositum nasal spray

Catarros agudos y crónicos de la mucosa nasal.
Spray nasal 15 ml.

Composición:

Calcium carbonicum Hahnemanni D12 2,5 g, *Cinnabaris* D8 2,5 g, *Kalium bichromicum* D6 2,5 g, *Pulsatilla* D6 2,5 g en 10 g de solución isotónica.

Indicaciones:

Catarros agudos y crónicos de la mucosa nasal.

Advertencias:

Hipersensibilidad al cromo.

Durante el embarazo y periodo de lactancia, sólo bajo control médico.

Raramente podrían darse reacciones cutáneas o diarrea, en este caso debería suspenderse el tratamiento.

Posología:

Adultos: 1 nebulización en cada fosa nasal 3-5 veces al día.

Niños de 6 a 12 años: 1 nebulización en cada fosa nasal 3-4 veces al día.

Niños de 1 a 6 años: 1 nebulización en cada fosa nasal 2-3 veces al día.

Hasta 12 meses: 1 nebulización en cada fosa nasal 1-2 veces al día.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- Calcium carbonicum Hahnemanni**: resfriado pertinaz con excitación y estornudos frecuentes, resfriado lento.
- Cinnabaris**: secreción de mucosidad en forma de hilo.
- Kalium bichromicum**: secreción de mucosidad pertinaz en forma de hilo, mucosidad abundante con pus, faringitis crónica.
- Pulsatilla**: pérdida del sentido del olfato, catarro de la mucosa con secreción suave y amarillenta y ojos lagrimosos.

En casos de:

Anginas. Ver R 1.

Bronquitis crónica catarral. Ver R 48.

Bronquitis crónica espástica. Ver R 8 o R 9.

Bronquitis y traqueitis. Ver R 6 y R 8 o R 9.

Faringolaringitis. Ver R 45.

Faringoamigdalitis. Ver R 1.

Gripe. Ver R 6.

Afecciones catarrales. Ver R 8 y R 9.

Sinusitis y rinitis. Ver R 49.



ÍNDICE DE
CONSTITUYENTES

ÍNDICE DE CONSTITUYENTES

A

Acidum ascorbicum.....	D1 (Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®)
Acidum hydrocyanicum.....	D6 (R67)
Acidum lacticum.....	D4 (R17)
Acidum nitricum.....	D6 (R13, R27) D12 (R26)
Acidum phosphoricum.....	D2 (R95) D3 (R4, Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®)
.....	D8 (R41 Forte ampollas) D12 (R26, R40, R41)
Acidum sulfuricum.....	D4 (R10, R28) D6 (R73)
Aconitum.....	D3 (R76) D4 (R6, R70, R71, R78) D6 (R2)
Adonis vernalis.....	D2 (R58)
Aesculus.....	D2 (R13 gotas, R28) D3 (R13 ampollas)
.....	D6 (R50, R63 ampollas) D30 (R42)
Agaricus.....	D5 (R77) D12 (R36)
Agnus castus.....	D6 (R41 Forte ampollas) D8 (R41)
Alfalfa.....	Ø (R95)
Alumina.....	D12 (R37)
Ammi visnaga.....	D2 (R76)
Ammonium bromatum.....	D4 (R14 ampollas)
Ammonium carbonicum.....	D2 (R67)
Ammonium causticum.....	D2 (R8)
Anacardium.....	D6 (R5, R54)
Apis.....	D4 (R1, R78) D6 (R38) D30 (R23)
Apisinum.....	D12 (R38)
Apomorphinum hydrochloricum.....	D12 (R52)
Aranea diadema.....	D4 (R81)
Argentum metallicum.....	D12 (R73)
Arnica.....	D3 (R2 gotas, R12 gotas, R30, R55 gotas) D4 (R2 ampollas,
.....	R12 ampollas, R55 ampollas, R73) D30 (R45)
Argentum nitricum.....	D6 (R5) D12 (R45) D30 (R29)
Arsenicum album.....	D4 (R5 gotas) D5 (R3) D6 (R5 ampollas) D8 (R40, R43)
.....	D12 (R49, R65, R69) D30 (R23, R54 ampollas, R71) D200 (R38)
Arsenum iodatum.....	D4 (R12 ampollas) D6 (R57)
Artemisia vulgaris.....	D1 (R56)
Arum maculatum.....	D12 (R45)
Arum triphyllum.....	D3 (R62)
Aurum chloratum.....	D6 (R2, R12 ampollas)
Avena sativa.....	Ø (R95) D1 (R14 gotas) D3 (R14 ampollas)

B

Baptisia.....	D4 (R6)
Barium chloratum.....	D4 (R12), D6 (R1 ampollas)
Belladonna.....	D2 (R8) D3 (R30) D4 (R1, R5, R9, R55 ampollas,
.....	R62, R78) D12 (R42 ampollas, R54 ampollas) D30 (R33, R43 ampollas)
Berberis aquifolium.....	Ø (R65)
Berberis vulgaris.....	D1 (R61) D3 (R27 gotas) D4 (R11, R18, R27 ampollas)
Bromum.....	D12 (R53)
Bryonia.....	D2 (R8) D3 (R9) D4 (R6, R24, R37, R73)
.....	D12 (R43 ampollas) D30 (R38)
Bufo.....	D200 (R33)

C

Cactus.....	D2 (R3) D4 (R2)
Calcium carbonicum Hahnemanni.....	D12 (R59, R96) D30 (R34, R35,

.....	R45, R49, R57, R65)
Calcium fluoratum	D12 (R34) D30 (R42 ampollas)
Calcium hypophosphorosum	D6 (R34 ampollas)
Calcium iodatum	D4 (R1, R12 ampollas) D12 (R26)
Calcium phosphoricum	D6 (R95) D12 (R11, R34)
Calendula.....	Ø (R94) D3 (R30, R55)
Camphora	D2 (R67) D3 (R6 gotas, R30, R61)
Cantharis	D4 (R18 gotas)
Carbo vegetabilis.....	D8 (R5 gotas) D10 (R5 ampollas) D30 (R43, R67)
Carduus marianus	D2 (R7 gotas) D4 (R7 ampollas) D12 (R42)
Caulophyllum.....	D2 (R75)
Causticum Hahnemanni	D6 (R6, R11) D12 (R73) D30 (R74)
Cedron.....	D4 (R70)
Cetiol	(R80)
Chamomilla	D2 (R5 gotas, R8) D4 (R4, R5 ampollas, R14, R35)
.....	D6 (R34 ampollas) D30 (R75)
Chelidonium	D2 (R7 gotas) D4 (R5 ampollas, R7 ampollas)
Chimaphila umbellata	D3 (R25 gotas) D5 (R25 ampollas)
China.....	Ø (R95) D3 (R7 gotas) D4 (R7 ampollas) D6 (R31)
.....	D8 (R41 Forte ampollas) D12 (R41 ampollas)
Cholesterinum.....	D6 (R7)
Cimicifuga.....	D3 (R75) D4 (R10, R16, R50, R81)
Cina	D4 (R56)
Cinnabaris.....	D8 (R96) D12 (R49)
Cinnamomum	Ø (R95)
Citrus limum.....	Ø (Vita-C 15, Vita-C 15 Forte®)
Clematis vitalba.....	D3 (R25 ampollas)
Cocculus	D4 (R81) D5 (Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®)
.....	D12 (R52) D30 (R29)
Coccus cacti.....	D5 (R8) D6 (R9)
Coffea	D4 (R14) D30 (R47)
Collinsonia canadensis	D4 (R13)
Colocynthis.....	D4 (R37, R71, R81) D6 (R4, R7, R50,
.....	R70, R72) D12 (R69)
Conium.....	D5 (R12, R25) D30 (R29, R41, R41 Forte ampollas)
Convallaria majalis	D1 (R76) D2 (R58)
Corallium rubrum	D12 (R9) D10 (R8)
Crataegus	Ø (R2 gotas, R3) D1 (R44 gotas, R58)
.....	D4 (R2 ampollas)
Crocus	D4 (R28)
Croton tiglium.....	D6 (R68)
Cuprum aceticum.....	D4 (R75) D6 (R63) D10 (R8) D12 (R9)
Cuprum metallicum.....	D12 (R33)
Cyclamen	D4 (R81)

D

Damiana	D6 (R41, R41 Forte ampollas)
Digitalis.....	D3 (R2 gotas, R3, R58) D4 (R2 ampollas)
Drosera.....	D1 (R76) D2 (R8) D4 (R9)
Dulcamara.....	D1 (R61) D3 (R30) D4 (R11, R18) D30 (R48)

E

Echinacea angustifolia	D3 (R30) D4 (R55 ampollas) D10 (R77)
Equisetum hiemale.....	D6 (R18)
Eschscholzia californica	D2 (R14 gotas) D4 (R14 ampollas)
Eucalyptus	D3 (R6 gotas)

Eupatorium perfoliatum.....	D3 (R6)
Eupatorium purpureum	D6 (R18)
Euphorbia cyparissias.....	D3 (R78)
Euphorbium.....	D4 (R78)
Euphrasia.....	D2 (R78)

F

Ferrum sesquichloratum.....	D6 (R31)
Ferrum iodatum	D12 (R26)
Ferrum phosphoricum	D8 (R6, R28, R62, R74) D12 (R46, R48)
Ferrum picricum.....	D4 (R25 gotas) D6 (R25 ampollas)
Fructus Cynosbati.....	(Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®)
Fructus Sorbi aucupariae	(Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®)
Fucus.....	D2 (R59)
Fumaria officinalis	D6 (R60)

G

Gelsemium	D3 (R16 gotas, R81) D4 (R16 ampollas)
.....	D6 (R6) D12 (R54 ampollas)
Gingko.....	D3 (R81)
Glandula suprarenalis (suis).....	D12 (R19, R20, R41 Forte ampollas)
Glandula thymi (suis).....	D12 (R19, R20, R41 Forte ampollas)
Glonoinum	D6 (R12) D12 (R47)
Gnaphalium polycephalum.....	D3 (R71)
Graphites.....	D9 (R13 ampollas) D12 (R59, R65) D30 (R56)
Grindelia robusta	D4 (R22)

H

Hamamelis	D2 (R78) D3 (R13 gotas, R30) D4 (R13 ampollas, R55)
.....	D6 (R28, R42)
Hekla lava.....	D12 (R34)
Helleborus	D4 (R58)
Helonias dioica	D3 (R64) D5 (Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®)
Hepar sulfuris.....	D12 (R1, R60) D30 (R53)
Humulus lupulus.....	D2 (R14 gotas) D3(R14 ampollas)
Hydrastis.....	Ø (R95)
Hydrocotyle asiatica.....	D2 (R65)
Hypericum	D3 (R30)
Hypophysis	D12 (R19, R20, R41 Forte ampollas)
.....	D30 (R43 ampollas)

I

Iberis amara.....	D3 (R66)
Ignatia	D5 (Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®) D6 (R2 ampollas)
.....	D6 (R14) D12 (R36) D30 (R47)
Iodum	D30 (R51)
Ipecacuanha	D3 (R8) D8 (R52) D6 (R9)
Iris versicolor.....	D2 (R16 gotas) D4 (R16 ampollas)

J

Jaborandi.....	D4 (R32)
Juglans	D6 (R60) D30 (R53)

K

Kalium arsenicosum.....	D4 (R64)
Kalium bichromicum	D4 (R1 gotas, R2 ampollas)
.....	D6 (R1 ampollas, R96) D12 (R49)
Kalium bromatum.....	D12 (R53)
Kalium carbonicum.....	D3 (R3) D4 (R78) D6 (R13 ampollas, R24, R48)
Kalium iodatum.....	D3 (R76) D4 (R12 ampollas)
Kalium phosphoricum.....	D4 (R2 ampollas) D6 (R54) D12 (R74)
.....	D30 (R43)
Kalmia	D3 (R3, R70)

L

Lachesis	D12 (R1, R10, R22)
.....	D30 (R32, R36, R37 ampollas R39, R47)
Lapis albus	D12 (R51)
Laurocerasus	D3 (R2 gotas, R44 gotas) D4 (R2 ampollas)
Lecithinum.....	D6 (R41 Forte ampollas)
Ledum.....	D3 (R73 gotas) D4 (R73 ampollas)
Leonurus cardiaca	D2 (R66)
Lithium carbonicum.....	D12 (R46)
Lobelia inflata.....	D3 (R76)
Lycopodium.....	D4 (R7 gotas, R37 gotas) D5 (R5 gotas, R13, R27 gotas)
.....	D6 (R5 ampollas, R7 ampollas, R13 ampollas, R27 ampollas,
.....	R37 ampollas, R72) D12 (R31) D30 (R39, R40, R54, R57)
Lycopus virginicus.....	D12 (R51)

M

Magnesium phosphoricum.....	D6 (R75, R95) D8 (R71) D12 (R36)
Marum verum.....	D6 (R1)
Medorrhinum.....	D30 (R21)
Mentholum.....	D2 (R76)
Mercurius biiodatus.....	D5 (R78)
Mercurius praecipitatus ruber.....	D12 (R34 ampollas)
Mercurius sublimatus corrosivus.....	D5 (R1, R4) D6 (R56),
.....	D8 (R1 ampollas, R37 ampollas)
Mercurius solubilis Hahnemani	D8 (R62) D30 (R49)
Mezereum.....	D3 (R68) D6 (R34 ampollas) D12 (R42 ampollas)
Millefolium	D3 (R30)
Momordica balsamina.....	D3 (R72)
Moschus.....	D12 (R47)

N

Naja tripudians.....	D6 (R17 gotas) D8 (R17 ampollas) D12 (R22)
Natrium chloratum.....	D2 (R77) D6 (R68) D30 (R43 ampollas, R50, R51, R65)
.....	D200 (R53)
Natrium sulfuricum.....	D2 (R59) D12 (R40) D30 (R46) D200 (R43)
Nux vomica.....	D1 (R61) D3 (R30, R95) D4 (R5, R7, R11, R13)
.....	D6 (R37) D30 (R46, R50, R52)

O

Oleander.....	D3 (R44, R66) D6 (R4)
Oleum Arachidis.....	(R80)
Oleum Arnicae infusum.....	(R80)
Oleum Gaultheriae	D1 (R61)

Oleum Lavandulae	(R30, R61)
Oleum Olivarum	(R30, R80)
Oleum Pini silvestris	(R30, R61)
Oleum Rosmarini	(R30)
Ovarium (suis).....	D12 (R20)

P

Paeonia officinalis	D3 (R13)
Palladium metallicum	D12 (R39)
Panax ginseng.....	Ø = D1 (Vita-C 15 Forte®, R95) D6 (R41 Forte ampollas)
Pancreas (suis).....	D12 (R19, R20, R41 Forte ampollas)
Pareira brava	D2 (R25 gotas) D6 (R25 ampollas)
Passiflora incarnata	D2 (R14 gotas) D3 (R14 ampollas)
Petroleum.....	D12 (R52)
Phosphorus.....	D5 (R3, R12) D6 (R12 ampollas, R41 ampollas, R54, R64, R72)
.....	D8 (R41 Forte ampollas) D30 (R36, R45, R48, R57)
Phytolacca	D4 (R1) D8 (R50)
Placenta	D30 (R42 ampollas)
Plumbum aceticum	D6 (R12 ampollas) D12 (R37 ampollas)
Plumbum metallicum	D12 (R64)
Populus tremuloides.....	D3 (R25 gotas) D4 (R25 ampollas)
Potentilla anserina.....	D6 (R63 ampollas)
Procainum hydrochloricum	D3 (R41 Forte ampollas)
Psorinum	D30 (R21)
Pulsatilla	D3 (R25 gotas) D4 (R25 ampollas, R62)
.....	D6 (R96) D12 (R49, R74) D30 (R42)

R

Ranunculus bulbosus	D2 (R69) D4 (R24)
Rhododendron	D1 (R61) D4 (R11) D6 (R46)
Rhus toxicodendron	D1 (R61) D3 (R30) D4 (R4, R11, R68, R78)
.....	D6 (R55) D30 (R23, R69)
Robinia pseudacacia	D6 (R77)
Ruta	D2 (R78) D6 (R55)

S

Sabadilla	D6 (R6)
Sabal serrulatum.....	D2 (R25 gotas) D4 (R25 ampollas)
Saccharum	(R8, Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®)
Saccharum tostum	(Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®, R8)
Salvia officinalis	D30 (R32)
Sanguinaria	D3 (R16 gotas) D4 (R10, R16 ampollas)
Sarsaparilla.....	D3 (R27 gotas) D4 (R27 ampollas) D6 (R60)
Scilla	D2 (R3, R58)
Scrophularia nodosa.....	D2 (R17 gotas, R78) D3 (R5 ampollas, R17 ampollas)
Secale cornutum.....	D4 (R40, R63 gotas) D6 (R28, R63 ampollas) D30 (R42)
Sepia.....	D4 (R10 gotas) D6 (Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®, R74)
.....	D8 (R10 ampollas, R54 ampollas)
.....	D30 (R32, R41 ampollas, R41 Forte ampollas)
Silicea.....	D30 (R33, R34, R48, R57)
Solidago virgaurea	D2 (R64)
Spartium scoparium	D2 (R44 gotas, R66)
Spigelia anthelmia.....	D3 (R2 gotas, R3) D4 (R2 ampollas, R16, R78, R81)
Spiraea ulmaria	D12 (R46)
Spongia.....	D3 (R59) D6 (R9)

Staphisagria	D4 (R78) D8 (R35)
Sticta.....	D4 (R9)
Stramonium.....	D3 (R76)
Strontium carbonicum	D12 (R50)
Strophanthus.....	D3 (R3)
Sulfur	D4 (R78) D5 (R13) D6 (R13 ampollas) D12 (R37)
.....	D30 (R23, R31, R38, R49)
Sulfur iodatum	D12 (R26)
Sumbulus moschatus	D2 (R66)
Symphytum.....	D6 (R55)

T

Tabacum	D4 (R63 gotas, R77) D6 (R63 ampollas, R67)
Tanacetum vulgare	D1 (R56)
Testis (suis).....	D8 (R41 Forte ampollas) D12 (R19, R41)
Teucrium scorodonia.....	D6 (R57)
Theridion curassavicum	D30 (R29)
Thuja	D30 (R21)
Thymus vulgaris.....	D2 (R8)
Thyreoidinum (suis).....	D12 (R19, R20, R41 Forte ampollas)
Tocopherol.....	D6 (R41 Forte ampollas)

U

Unguentum Alcoholum Lanae	(R30, R61)
---------------------------------	------------

V

Vaccininum	D30 (R21)
Valeriana.....	Ø (R14 gotas), D4 (R2 ampollas, R14 ampollas)
Veratrum album	D4 (R67) D6 (R4, R63 ampollas) D12 (R32)
.....	D30 (R43 ampollas)
Verbascum	D2 (R70)
Vespa crabro.....	D12 (R39)
Viburnum opulus	D2 (R75)
Vipera berus	D12 (R42)

Y

Yerba santa.....	D12 (R43)
Yohimbinum hydrochloricum	D4 (R41 Forte ampollas)

Z

Zincum metallicum	D6 (Vita-C 15°, Vita-C 15 Forte®)
.....	D12 (R33)
Zincum valerianicum	D6 (R14) D8 (R36)



ÍNDICE DE
APARATOS / SISTEMAS



ÍNDICE POR ÁREA TERAPÉUTICA

Aparato cardiovascular.....	89
Dermatología.....	89
Aparato digestivo.....	90
Aparato genito-urinario.....	91
Sistema osteoarticular.....	91
Aparato respiratorio / ORL.....	92
Pediatría.....	93
Sistema endocrino / metabólico.....	93
Sistema inmunitario.....	94
Sistema nervioso.....	94
Patología ocular.....	94

APARATO CARDIOVASCULAR

Acroparestesia: R 63.
Anemia: R 31.
Angina de pecho: R 2.
Arritmia cardíaca: R 66.
Arterioesclerosis. R 12.
Astenia miocárdica: R 3.
Astenia neurocirculatoria: R 67.
Claudicación intermitente: R 63.
Coronarioesclerosis: R 2, R 12.
Depuración sanguínea: R 60.
Descompensación cardiocirculatoria: R 58.
Disfunciones vasculares: R 63.
Distonía neurovegetativa: R 44.
Edema de origen cardíaco: R 58.
Edema de origen renal: R 64.
Endangitis obliterante: R 63.
Endocarditis: R 3, R 22.
Enfermedad de Raynaud: R 63.
Esclerosis aórtica: R 12.
Esclerosis cerebral: R 12, R 54.
Esclerosis coronaria: R 2, R 12.
Estasis venosa: R 42.
Fisura anal: R 13.
Flebitis: R 42, R 63.
Hemorroides: R 13.
Hipertensión arterial: R 12.
Hipotensión arterial: R 44, R 67.
Insuficiencia cardíaca: R 3.
Insuficiencia coronaria: R 2.
Miocardiopatías postinfarto: R 3, R 22.
Miocarditis: R 3, R 22.
Miocarditis senil: R 3.
Neurosis cardíaca: R 22, R 66.
Palpitaciones: R 22, R 66.
Profilaxis de infarto de miocardio: R 2.
Síndrome de Morgagni-Adams-Stokes: R 66.
Taquicardia: R 66.
Trastornos de la circulación periférica: R 63.
Trastornos de origen neurovegetativo: R 29.
Tromboflebitis: R 42.
Úlcera varicosa: R 42.
Varices: R 42.

DERMATOLOGÍA

Abscesos: R 1.
Acné vulgar: R 53.
Afecciones cutáneas: R 21.
Alergias cutáneas: R 23.
Comedones (espinillas): R 53.
Costra láctea: R 34.
Dermatitis: R 21.
Eczema: R 21, R 23.
Eczema anal: R 13.
Eczema crónico: R 21, R 23.
Eczema psoriasiforme: R 65.
Eczema varicoso: R 42.
Escrofulosis: R 60.
Exantema alérgico: R 23.
Flemones: R 1.
Forúnculos: R 1.

Herpes zóster: R 68.
Hiperhidrosis: R 32.
Lesiones: R 55.
Psoriasis: R 65.
Sudoración nocturna: R 32.
Traumatismos: R 55.
Urticaria: R 23.

APARATO DIGESTIVO

Aerofagia: R 5.
Afecciones hepáticas y biliares: R 7.
Apendicitis: R 24.
Ascitis: R 58.
Cálculos biliares: R 7.
Cefalea: R 81.
Cirrosis hepática inicial: R 7.
Colecistopatía: R 7, R 1.
Colelitiasis: R 7.
Cólico abdominal: R 37.
Cólico biliar: R 37.
Cólico intestinal: R 37.
Colitis: R 4.
Colon irritable: R 37.
Defecación dolorosa: R 13.
Diabetes mellitus: R 40.
Diarrea: R 4.
Diarrea con fiebre: R 4.
Diarrea con vómito: R 4.
Disentería: R 4.
Eczema anal: R 13.
Enteritis: R 4.
Enterocolitis: R 4.
Eructos: R 5.
Estreñimiento: R 7, R 37.
Fiebre tifoidea: R 4.
Fisura anal: R 13.
Flatulencias: R 5, R 7, R 37.
Gastritis: R 5.
Gastroduodenitis: R 5.
Gastroenteritis: R 4.
Gastroenterocolitis: R 4.
Gastroenterocolitis crónica: R 4.
Hemorroides: R 13.
Hepatitis: R 7.
Hepatopatías: R 7.
Ictericia: R 7.
Insuficiencia hepática: R 7.
Meteorismo: R 5, R 7.
Náuseas: R 52.
Pancreatitis: R 72.
Peritonitis: R 24.
Prurito anal: R 13.
Reflujo: R 52.
Síndrome gastrocardíaco: R 5.
Tenesmo: R 13, R 37.
Trastornos de la secreción biliar: R 7.
Úlcera duodenal: R 5.
Úlcera gástrica: R 5.
Úlcera prepilórica: R 5.
Vómitos: R 52.
Vómitos acetónicos: R 52.
Vómitos por piloroespasmos: R 52.

APARATO GENITO-URINARIO

Adenoma prostático: R 25.
Afecciones ginecológicas: R 50.
Afecciones prostáticas: R 25.
Albuminuria: R 64.
Anexitis: R 1, R 38, R 39.
Astenia sexual: R 41.
Bacteriuria: R 18.
Cistitis aguda y crónica: R 18.
Cistopielitis: R 18, R 27, R 64.
Climaterio: R 10.
Dismenorrea: R 75.
Dolor lumbosacro de la mujer: R 50.
Edema de origen renal: R 64.
Enuresis: R 74.
Espasmos de vejiga: R 37.
Glomerulonefritis: R 64, R 1.
Hipertrofia prostática: R 25.
Hiperuricemia: R 27.
Impotencia viril: R 41, R 41 Forte.
Incontinencia urinaria: R 74.
Infección de las vías urinarias: R 18.
Leucorrea: R 10.
Menorragia: R 28.
Metrorragia en el climaterio: R 28, R 10.
Nefritis: R 64.
Nefroangiosclerosis: R 64.
Nefrolitiasis: R 27.
Nefrosclerosis: R 12.
Nefrosis: R 64.
Ovaritis: R 1, R 24, R 38, R 39.
Parametritis: R 1, R 38, R 39.
Parametritis en climaterio: R 10.
Pielonefritis: R 1.
Prostatitis aguda y crónica: R 25.
Proteinuria: R 64.
Prurito vulvar: R 10.
Quistes ováricos lado derecho: R 38.
Quistes ováricos lado izquierdo: R 39.
Salpingitis (derecha): R 38.
Salpingitis (izquierda): R 39.
Síndrome nefrótico: R 64.
Sofocos: R 10.
Urolitiasis: R 27.

SISTEMA OSTEOARTICULAR

Alteraciones de espalda: R 11, R 61.
Artralgia: R 81.
Artritis: R 1, R 24, R 30, R 46.
Artritis aguda: R 24.
Artritis de cadera: R 73.
Artritis de hombro y brazo: R 46.
Artritis de húmero: R 46.
Artritis de mano: R 46.
Artrosis: R 73, R 30.
Braquialgia: R 11.
Ciática: R 71, R 11, R 30.
Condrosis: R 11, R 61.
Contusiones: R 55, R 30.
Coxartrosis: R 73.
Descalcificación: R 34.

Diátesis gotoso-reumática: R 46.
Dislocaciones: R 55, R 30.
Dolor lumbosacro en mujeres: R 50.
Dolores de cadera: R 30, R 71.
Dolores de espalda: R 61.
Dolores lumbosacros: R 11, R 30.
Dolores neurálgicos: R 81.
Esguince: R 30.
Espondilitis anquilopoyética: R 11.
Espondiloartrosis: R 73, R 11, R 61.
Fracturas: R 55.
Gonartrosis: R 73.
Hernia de disco: R 71.
Lesiones del disco intervertebral: R 1, R 11, R 71.
Lumbalgia: R 11, R 61, R 30.
Luxaciones: R 55.
Mialgia: R 81.
Neuralgia crural: R 71.
Neuralgia del trigémino: R 70.
Neuralgia facial: R 70.
Neuralgia intercostal: R 11, R 69.
Neuralgia occipital: R 16, R 70.
Neuritis: R 70.
Osteocondrosis: R 11, R 30, R 61.
Osteoporosis: R 34.
Parestesia de manos: R 63.
Parestesia. Prurito en piernas: R 71.
Periartritis: R 46.
Periostitis: R 34.
Poliartritis: R 24.
Poliartritis aguda: R 1.
Quiste óseo: R 34.
Reumatismo articular agudo: R 1, R 24, R 61.
Reumatismo articular crónico: R 11, R 46, R 30.
Reumatismo muscular: R 11, R 46, R 30.
Síndrome cervical: R 11, R 61.
Síndrome lumbar: R 11, R 61.
Tendinitis: R 1, R 11.
Torceduras: R 30, R 55.
Tortícolis: R 11.
Trastornos del crecimiento óseo: R 34.
Traumatismos: R 55.

APARATO RESPIRATORIO / ORL

Afecciones catarrales: R 8, R 9.
Afonía: R 45.
Amigdalitis: R 1.
Asma bronquial: R 34, R 43, R 48, R 76.
Bronconeumonía: R 6.
Bronquitis aguda: R 48, R 57.
Bronquitis con expectoración: R 8.
Bronquitis crónica: R 57.
Bronquitis de etiología vírica: R 6.
Bronquitis espástica: R 43.
Catarro con fiebre: R 6.
Catarro de la mucosa nasal: Pulsatilla compositum nasal spray.
Catarro del fumador: R 48.
Catarro nasal: Pulsatilla compositum nasal spray.
Cinetosis: R 29.
Gripe: R 6.
Hipertrofia tonsilar: R 1.
Laringitis aguda: R 45.

Laringitis crónica: R 45.
Otitis media: R 1.
Pérdida de gusto (ageusia): R 49.
Pérdida de olfato (anosmia): R 49.
Pleuritis: R 6, R 24.
Pólipos nasales: R 49.
Resfriado: R 6.
Rinitis: R 49.
Rinitis crónica: R 49.
Rinofaringitis: R 6.
Ronquera: R 45.
Síndrome de Ménière: R 29.
Sinusitis: R 49.
Tos seca: R 9.
Tos seca y productiva: R 8.
Tosferina: R 9.
Traqueítis bacteriana aguda o crónica: R 45.
Tuberculosis incipiente: R 48.
Tuberculosis: R 57.
Vértigos: R 29.

PEDIATRÍA

Amigdalitis: R 1.
Anemia: R 31.
Anorexia: R 31.
Ascariasis: R 56.
Caries dentales: R 34.
Costra láctea: R 34.
Denticiones difíciles: R 34, R 35.
Desmejoría: R 31.
Enuresis: R 74.
Escarlatina con afección ocular: R 1, R 62.
Espasmofilia: R 34.
Fiebre: R 6.
Helmintiasis: R 56.
Hiperexcitabilidad: R 36.
Linfatismo: R 1.
Neurastenia: R 54.
Oxiuriasis: R 56.
Paperas: R 1.
Raquitismo: R 34.
Rubeola con afección ocular: R 62.
Sarampión con afección ocular: R 62.
Tos: R 8.
Tosferina: R 9.
Trastornos de la dentición: R 35.
Trastornos del crecimiento óseo: R 34.
Trastornos del desarrollo psíquico: R 54.
Varicela: R 6, R 68.
Vómito acetónico: R 52.

SISTEMA ENDOCRINO / METABÓLICO

Bocio: R 19, R 20, R 51.
Bocio fibroso: R 51.
Bocio parenquimatoso: R 51.
Diabetes mellitus: R 40.
Disfunción endocrina: R 19, R 20, R 59.
Enfermedad de Addison: R 19, R 20.
Enfermedad de Basedow: R 19, R 20, R 51.
Gota: R 27.
Hipertiroidismo: R 51.

Hipotiroidismo: R 59.
Impotencia viril: R 41, R 41 Forte.
Insuficiencia eréctil: R 41 Forte.
Insuficiencia hipofisiaria: R 19, R 20.
Mixedema: R 51.
Obesidad: R 19 / R 20, R 59.
Pancreatitis: R 72.
Pancreopatías: R 72.
Tirotoxicosis: R 51.

SISTEMA INMUNITARIO

Aumento de las defensas orgánicas: R 26.
Formación de anticuerpos: R 26.

SISTEMA NERVIOSO

Acroparestesia: R 63.
Ansiedad: R 14.
Arterioesclerosis: R 12.
Astenia primaveral: Vita-C 15 y Vita-C 15 Forte.
Cambios de humor en el climaterio: R 47.
Cansancio psíquico: Vita-C 15 Forte.
Cefalea de origen psíquico: Vita-C 15.
Climaterio: R 10.
Corea menor: R 36.
Crisis epilépticas: R 33.
Decaimiento cerebral senil: R 54.
Depresión psíquica: Vita-C 15 Forte.
Depresión reactiva: R 14.
Epilepsia: R 33.
Esclerosis cerebral: R 12, R 54.
Estrés en el hombre: R 41.
Globo histérico: R 47.
Hiperexcitabilidad: R 36.
Histeria: R 47.
Impotencia viril: R 41, R 41 Forte.
Inquietud psíquica: R 14.
Insomnio: R 14.
Insomnio de base ansiosa: Vita-C 15.
Migraña: R 16.
Neuralgia: R 70.
Neuralgia occipital: R 70.
Neurastenia: Vita-C 15 y Vita-C 15 Forte.
Parestesia de extremidades inferiores: R 71.
Parestesia en manos: R 63.
Sobreexcitación nerviosa: R 14.
Vértigo: R 29, R 52.

PATOLOGÍA OCULAR

Blefaritis: R 78.
Conjuntivitis: R 78, R 62.
Hialitis: R 78.
Irritación ocular: R 78, R 62.
Oftalmalgia: R 78.
Orzuelo: R 78.
Reducción de la agudeza visual: R 78.



ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN
TERAPÉUTICA

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA

A

Abdominales, afecciones
R 37, R 38, R 39.

Abscesos
R 1.

Abstinencia del fumador
R 77.

Achaques climatéricos
R 10.

Acidez
R 5.

Acné vulgar
R 53.

Acroparestesia
R 60, R 63.

Acúfenos
R 1, R 29, R 34.

Adiposis
R 19, R 20, R 59.

Afonía
R 45.

Agotamiento mental
R 54.

Agotamiento nervioso
R 14, Vita-C 15.

Agotamiento, estados de Albuminuria
R 64.

Agujetas
R 55.

Albuminuria
R 64.

Alcohol, abuso de
R 7, R 14, R 47.

Alergia
R 23.

Alopecia
R 19, R 20, R 31.

Amigdalitis
R 1.

Anemia
R 31, R 95.

Anexitis
R 1, R 24, R 38, R 39.

Angina de pecho
R 2, R 3, R 66.

Angustia
R 14.

Ansiedad
R 14.

Apendicitis aguda
R 24, R 38.

Apendicitis crónica
R 1, R 24, R 38.

Apetito, exceso de
R 14.

Apetito, falta de
R 31, R 95.

Apoplejía
R 12, R 55, R 67.

Arenillas
R 27.

Arritmias cardiacas
R 3, R 66.

Arterioesclerosis
R 12.

Artralgias
R 81.

Artritis
R 1, R 24, R 30, R 46, R 61.

Artrosis
R 30, R 73.

Ascariasis
R 56.

Ascitis
R 7, R 18, R 58.

Asma
R 8, R 9, R 43, R 48, R 76.

Astenia
Vita-C 15.
Vita-C 15 Forte.
R 41.
R 41-Forte.
R 95.

Atonía intestinal
R 37.

B

Bacteriuria
R 18.

Basedow
R 51.

Blefaritis
R 78.

Bocio
R 19, R 20, R 51, R 59.

Bolo histérico
R 47.

Bronconeumonía
R 6.

Bronquitis
R 6, R 9, R 48, R 8, R 57.

Bursitis
R 1, R 73, R 81.

C

Cabeza, dolor de
R 16, R 81.

Calambres de la pierna
R 63.

Calambres musculares
R 33.

Calcio, trastornos en el metabolismo del
R 34.

Cálculos renales
R 27.

Cansancio
Vita-C 15, Vita-C 15 Forte,
R 95.

Carbunco
R 1.

Cardiospasma
R 2, R 3, R 22.

Catarro
R 1, R 6, R 8, R 9.

Catarro del fumador
R 8, R 48.

Catarró nasal
R 1, R 49, Pulsatilla
compositum nasal spray.

Catarró pulmonar
R 48.

Catarró tubárico
R 1, R 49.

Cefaleas
R 16, R 81.

**Cerebrovasculares,
accidentes**
R 12.

Ciática
R 11 + R 61, R 30, R 71.

Cicatrices
Cicatin - Jugo de caléndula.

Cinetosis
R 29.

**Circulación cerebral,
trastornos de**
R 12.

**Circulación periférica,
trastornos de**
R 13, R 42, R 63.

Cirrosis hepática
R 7, R 17.

Cistitis
R 18, R 25.

Cistopielitis
R 18, R 27, R 64.

Claudicación intermitente
R 12, R 63.

Climaterio
R 10, R 32, R 34.

Codo de tenista
R 1, R 46, R 55.

Colangítis
R 1, R 7.

Colapso
R 67.

Colecistitis
R 1, R 7.

Colelitiasis
R 1, R 7, R 37.

Colesterol, aumento de
R 7.

Cólicos biliares
R 7.

Cólicos intestinales
R 37.

Cólicos renales
R 27.

Colitis
R 4.

Colpitis
R 1, R 38, R 39.

Comedones
R 53.

Complejo gastrocardial
R 2, R 3, R 5.

**Condilomas (tratamiento
complementario)**
R 21.

**Conductos biliares,
afecciones de**
R 7.

Conjuntivitis
R 1, R 62, R 78.

**Contracciones
uterinas espasmódicas**
R 75.

Contusiones
R 30, R 55.

Convalecencia
Vita-C 15, Vita-C 15 Forte,
R 95.

Corazón senil
R 2, R 3.

Corea
R 36.

Costra láctea
R 23, R 34.

Coxartrosis
R 73.

Craurosis vulvar
R 17.

**Crecimiento óseo,
trastornos del**
R 34.

D

Dacriocistitis
R 78, R 1.

Debilidad, estados de
Vita-C 15, Vita-C 15 Forte,
R 95.

Debilidad cervical
Vita-C 15, Vita-C 15 Forte,
R 29, R 52.

Debilidad sexual
R 41, R 41-Forte.

**Defensas orgánicas,
estimulación de las**
R 26.

**Degenerativas,
enfermedades**
R 17.

Dentición
R 34, R 35.

Dentición difícil
R 35.

Depresión
Vita-C 15, Vita-C 15 Forte.

Depurativo
R 5, R 7, R 27, R 60.

Dermatitis, dermatosis
R 21, R 23.

**Desarrollo intelectual de los
niños, trastornos de**
R 54.

Descompensación cardiaca
R 3, R 58.

**Descompensación
circulatoria**
R 58.

Diabetes mellitus
R 40.

Diarrea
R 4.

Dietas de adelgazamiento
R 14, R 59.

Disbacteriosis
R 1.

Discopatías, osteocondrosis
R 11.

Dismenorrea
R 75.

Dispepsia
R 5.

Distonía vegetativa
R 2, R 44.

Diverticulitis
R 37.

Dolor aórtico
R 2, R 47.

Dolor dorsal
R 11, R 50.

Dolores en general
R 81.

**Dolores lumbares
de la mujer**
R 30, R 50.

Dolores menstruales
R 75.

Drenaje mesenquimal
R 60, R 64.

Duodenitis
R 1, R 5.

E

Eczema
R 21, R 23, R 65.

Eczema anal
R 13.

Edema
R 58, R 64.

**Edemas postquirúrgicos y
postraumáticos**
R 1, R 27, R 30, R 55.

Elefantiasis
R 1, R 27, R 64.

Empiema
R 1.

Endangeitis obliterante
R 63.

Endocarditis
R 3, R 22.

Endometritis
R 1, R 38, R 39.

Energía, falta de
Vita-C 15, Vita-C 15 Forte.

Enfisema
R 48, R 57.

Enteritis
R 4.

Enterocolitis
R 4.

Enuresis nocturna
R 74.

Envejecimiento
R 2, R 12, R 54.

Epicondilitis
R 1, R 46, R 55.

Epilepsia
R 33.

**Eritema exudativo,
multiforme y nodoso**
R 1, R 21.

**Eritema solar,
quemaduras solares**
R 30.

Escarlatina
R 1.

Esclerodermia
R 21.

Esclerosis aórtica
R 12.

Esclerosis cerebral
R 12, R 54.

Esclerosis coronaria
R 2, R 12.

Escrofulosis
R 60.

Esguinces
R 30, R 55.

Espalda, dolores de
R 11.

Espasmodia
R 34.

Espasmos intestinales
R 37.

Espondilartritis
R 11.

Espondilartrosis
R 46.

Espondilosis
R 11.

Estenocardia
R 2.

Estiloiditis, epicondilitis
R 46, R 55.

Estomatitis
R 5.

Estreñimiento
R 7, R 37.

Estrés
Vita-C 15 Forte.

Estruma
R 19, R 20, R 51, R 59.

Exantema
R 1, R 21, R 23.

**Excitación del ciego
crónica recidiva**
R 1, R 24, R 38.

Exostosis
R 34.

Extenuación nerviosa
R 14, Vita-C 15.

F

Faringitis
R 1, R 8, R 9.

**Fiebre del heno, rinitis
alérgica estacional**
R 49, Pulsatilla compositum
nasal spray.

Fisura anal
R 13.

Flatulencia, meteorismo
R 5, R 7, R 37.

Flebitis
R 42.

Flemones
R 1.

Flujo genital
R 10.

Forunculosis
R 1, R 30.

**Fracturas, favorecer
la consolidación de**
R 34.

G

Gastritis
R 5.

Gastroduodenitis
R 5.

Gastroenteritis
R 4, R 37.

Gingivitis
R 1, Cicatín - Jugo de caléndula.

Globus histericus
R 47.

Glomerulonefritis
R 27, R 64.

Gonartrosis
R 73.

Granos
R 53.

Gripe
R 6.

H

Helmintiasis
R 56.

Hematomas
R 30, R 55.

Hemicrania
R 16.

Hemorragias
capilares, petequias
R 42, R 63.

Hemorroides
R 13.

Hepatitis
R 1, R 7.

Hepatopatía
R 7.

Heridas
R 55, Cicatín - Jugo de caléndula.

Hernia discal
R 11, R 71.

Herpes
R 23.

Herpes zóster
R 68.

Hidronefrosis
R 27, R 64.

Hidropesía
R 58.

Hiperacidez
R 5.

Hiperactividad
R 14, Vita-C 15, R 36.

Hipercolesterolemia
R 7.

Hiperemesis
R 52.

Hiperexcitación
R 14, Vita-C 15, R 36.

Hiperhidrosis
R 32.

Hiperqueratosis
R 21, R 23, R 65.

Hipertiroidismo
R 19, R 20, R 51.

Hipertrofia amigdalár
R 1.

Hipertrofia prostática
R 25.

Hipotensión
R 44, R 67.

Hipotiroidismo
R 19, R 20, R 59.

Histeria
R 47.

Hormonales, disfunciones
(en hombres)
R 19, R 41, R 41-Forte, R 51,
R 59.

Hormonales, disfunciones
(en mujeres)
R 10, R 20, R 51, R 59.

Humedad, ciática por
R 11.

I

Ictericia
R 7.

Impétigo
R 1, R 21.

Impotencia sexual
R 41, R 41-Forte.

Inapetencia
R 31, R 95.

Incontinencia urinaria
R 25, R 74.

Inestabilidad nerviosa
R 47.

Infarto de miocardio
R 2, R 67.

Infecciones bacterianas
R 1.

Infecciones micóticas
R 1.

Infecciones víricas
R 1.

Infecciosas, enfermedades
(estímulo de defensas)
R 26.

Inflamaciones
R 1, R 24, R 30, R 55.

Inflamación de
membranas mucosas
R 62.

Inflamación de la
raíz del diente
R 1.

Influenza
R 6.

Inquietud en
niños, estados de
R 14, Vita-C 15, R 36.

Inquietud motora
R 36.

Insomnio
R 14.

Insuficiencia cardiaca
R 3.

Insuficiencia circulatoria
R 67.

Insuficiencia coronaria
R 2, R 3.

Insuficiencia pulmonar
R 57.

Insuficiencia venosa
R 42.

Intertrigo
R 1, R 21, R 65.

Isquialgia
R 71.

J

Jaqueca
R 16, R 81.

L

Laringitis
R 45.

Leriche, síndrome de
R 63.

Lesiones
R 30, R 55, R 80.

Linfadenitis
R 1.

Linfangitis
R 1.

Linfatismo, estimulación del
sistema linfático
R 1, R 27.

Lumbago
R 11 + R 61, R 27, R 30.

Lupus eritematoso
R 1, R 7, R 26.

M

Mareos
R 29, R 52.

Mastitis
R 1, R 26, R 30.

Memoria, pérdida de
R 29, R 54.

Menopausia
R 10, R 32, R 34.

Menorragia
R 28.

Metabolismo mineral,
regulación del
R 29, R 31, R 34.

Meteorismo
R 5, R 7, R 37.

Metritis, parametritis,
endometritis, miometritis
R 1, R 18, R 24, R 38, R 39.

Metrorragia
R 10, R 28.

Migraña
R 16, R 81.

Miocardio, afecciones del
R 2, R 3, R 22, R 67.

Miocarditis
R 3, R 22.

Mixedema
R 51.

Mucosas, afecciones de las
R 62.

Muñones, dolores en
R 81.

N

Náuseas
R 5, R 52.

Nefritis
R 18, R 64.

Nefroesclerosis
R 12, R 64.

Nefrolitiasis
R 27.

Nefropasias, tratamiento
biológico complementario
R 18, R 27.

Nefrosis
R 64.

Neumonía, tratamiento
complementario
R 1, R 6, R 24, R 26.

Neuralgia
R 30, R 70.

Neuralgia intercostal
R 24, R 68, R 69.

Neuralgia occipital
R 16, R 70, R 6.

Neurastenia
Vita-C 15, Vita-C 15 Forte.

Neurastenia sexual
R 41, R 41-Forte.

Neuritis
R 70.

Neurosis cardiaca
R 22, R 66.

Neurosis climática
R 14, Vita-C 15,
Vita-C 15 Forte.

Niños nerviosos
R 36, R 54.

O

Obesidad
R 59.

Ocena
R 49, Pulsatilla compositum
nasal spray.

Orzuelos
R 78.

Osteocondrosis
R 11.

Osteomalacia
R 34.

Osteomielitis
R 1.

Osteoporosis
R 34.

Otitis
R 1.

Otitis media
R 1.

Ovária, disfunción
R 10, R 20.

Ovariitis
R 1, R 24, R 38, R 39.

Oxiuriasis
R 56.

P

Pancreatitis
R 72.

Paperas
R 1.

Parametritis
R 1, R 10, R 24, R 38, R 39.

Parestesia
R 63, R 71.

Parodontosis, parodontitis
R 1.

Paroniquia
R 1.

Parotiditis
R 1.

Periartritis
R 1, R 24.

Periostitis
R 1, R 34.

Peritonitis
R 24.

Piel, enfermedades de la
R 21, R 23, R 53, R 65.

Pielitis
R 18.

Pielitis, pielonefritis
R 1, R 18, R 64.

Pirosis
R 5.

Pleuritis
R 1, R 6, R 24.

Poliartritis reumática
R 1, R 24.

Postinfarto
R 3.

Prostatitis
R 1, R 25.

Proteinuria
R 64.

Prurito anal
R 13.

Prurito vulvar
R 10.

Psoriasis
R 65.

Q

Quiste ovárico
R 38, R 39.

R

Raquitismo
R 34.

Raynoud
R 63.

Reconvalecencia
Vita-C 15, R 31, R 41, R 95.

Regulación glandular
R 19, R 20.

Rendimiento deportivo, mejora del
R 41, R 41-Forte.

Reumatismo
R 11 + R 61, R 46, R 30.

Reumatismo articular agudo
R 1, R 24.

Reumatismo articular crónico
R 11 + R 61, R 46, R 30.

Reumatismo del músculo
R 11 + R 61, R 30.

Rinitis alérgica estacional (para mejorar la respiración nasal)
R 49, Pulsatilla compositum nasal spray.

Rinitis bacteriana
R 49, Pulsatilla compositum nasal spray.

Rinitis viral
R 49, Pulsatilla compositum nasal spray.

Riñón y vejiga, afecciones de
R 18, R 27, R 64.

Ronquera
R 45.

Rubeola
R 62.

S

Sabañones
R 13, R 42, R 63.

Salpingitis
R 1, R 38, R 39.

Sarampión
R 62.

Síndrome de Adam Stokes
R 52, R 66.

Síndrome de Ménière
R 29.

Síndrome epigástrico
R 5, R 52.

Síndrome gastrocardiaco
R 22, R 46.

Síndrome hombro-brazo
R 46.

Sinusitis
R 1, R 49.

Sudoración, exceso de
R 32.

Supuración de las bolsas gingivales
R 1, Cicatín - Jugo de caléndula.

Supuraciones, fistulas
R 1.

T

Tabaquismo
R 14, R 77.

Taquicardia
R 22.

Telangiectasias
R 42, R 63.

Tendinitis, Tenosinovitis
R 1, R 11, R 55, R 61.

Tics nerviosos
R 36.

Tifus
R 4.

Tiroidea, disfunción
R 51, R 59.

Tirotoxicosis
R 51.

Torceduras

R 30, R 55.

Tortícolis

R 11, R 73.

Tos

R 8, R 9.

Tosferina

R 1, R 8, R 9, R 48.

Traqueitis

R 1, R 45, R 48.

Trastornos circulatorios

R 13, R 42, R 63, R 67.

Trastornos de la secreción interna

R 19, R 20, R 59.

Trastornos de metabolismo de calcio

R 34.

Trastornos glandulares

R 19, R 20.

Traumatismos

R 30, R 55.

Tromboflebitis

R 42.

Tuberculosis pulmonar

R 48, R 57.

Tumor, maligno, benigno

R 17.

U

Úlcera crural

R 26, R 42, Cicatín - Jugo de caléndula.

Úlcera gastroduodenal

R 5.

Uretritis

R 1, R 18.

Urinarios, trastornos

R 1, R 18, R 25, R 27, R 28.

Urticaria

R 23.

V

Vaginitis

R 1.

Varicela

R 68.

Varices

R 42.

Vegetaciones adenoides

R 1.

Vejiga irritable

R 18.

Vejiga, debilidad de

R 74.

Venosa, estasis

R 13, R 42, R 63.

Vértigo de diversa etiología

R 29, R 52.

Vesícula biliar, afecciones de

R 7.

Vías respiratorias medias-altas, afecciones catarrales de las

R 8, R 9.

Vías urinarias, procesos inflamatorios en las

R 1, R 18.

Vómitos de diversa etiología

R 52.



DR. RECKEWEG
EN EL MUNDO

DR. RECKEWEG EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND

Brauer Professional Pty. Ltd.
651 Portrush Road
Glen Osmond 5064
Phone: 61-881-30 87 00
Fax: 61-883-79 73 34
sales@brauer.com.au
www.brauer.com.au

AUSTRIA

APONOVA PHARMA
Handelsges. mbH
Niederhart 100
6265 Hart im Zillertal
Phone: 43-5288 64 88 5
Fax: 43-5288 64 88 55
info@eca-aponova.at
www.eca-aponova.at

BANGLADESH

Pabna Homoeo Hall (PVT.)
LTD
75, Swamibagh Road
Dhaka-1100
Phone: 880-2-955 83 33
Fax: 880-2-712 04 13
tasmergy@dhaka.net

BELGIUM

NUT HOM PHYT
Porte des Bâtisseurs 18
Rue de Warlengrie
7730 Estaimpuis
Phone: 32-56-86 33 34
Fax: 32-56-48 44 30
nhp@n-h-p.be

BRAZIL

For supplies please address to
Dr. Reckeweg & Co. GmbH,
Bensheim
Phone: 49-62 51-10 97-0
Fax: 49-62 51-33 42
info@reckeweg.de
www.reckeweg.de

CANADA

Bio Lonreco Inc.
667 Meloche Avenue
Dorval QC H9P 2T1
Phone: 1-514-631-0006
Fax: 1-514-631-0903
info@dr-reckeweg.ca
www.dr-reckeweg.ca

CENTRAL AMERICA

EUPHA Distribuidora de
Medicamentos S.A.
12 calle 0-85 area 9
Plaza Lorenzo local 2
01009 Ciudad de Guatemala
GUATEMALA C.A.
Phone: 502-2385-2973
Fax: 502-2331-7061
rafael.omeany@reckeweg-
ca.com

CHILE

For supplies please address
to
Dr. Reckeweg & Co. GmbH,
Bensheim
Phone: 49-62 51-10 97-0
Fax: 49-62 51-33 42
info@reckeweg.de
www.reckeweg.de

COLOMBIA

Dr. Reckeweg de Colombia
Ltda.
Apartado Aereo 50755
Calle 85#21-22 Oficina 502
Antiguo Country
Bogotá D.C.
Phone: 57-1-644 18 11
Fax: 57-1-218 02 09
info@reckewegcolombia.com
www.reckewegcolombia.com

CYPRUS

S.G. Bio Plus Ltd.
9(I) Panayioti Tsaggari St.
Potamos Yermasoyias
4042 Limassol
Phone: 357-5-25 879 006-7
Fax: 357-5-25-879 006-7
houvartas@cytanet.com.cy

CZECH REPUBLIC

For supplies please address
to
Dr. Reckeweg & Co. GmbH,
Bensheim
Phone: 49-62 51-10 97-0
Fax: 49-62 51-33 42
info@reckeweg.de
www.reckeweg.de

DENMARK

MaxiPharma A/S
Søren Nymarks Vej 25
8270 Århus-Højbjerg
Phone: 45-86-29 29 55
Fax: 45-86-29 25 60
jbj@maxipharma.dk
www.maxipharma.dk

ECUADOR / PERU

Biohealth International Cia.
Ltda.
Calle Isla Genovesa N°. 41-30
y Calle Isla Floreana
Quito
Phone: 593-2-3520 318
Fax: 593-2-3520 319
biohealt@uio.satnet.net

FINLAND

Circlum Farmasia OY
Siltasaarenkatu 18
00530 Helsinki
Phone: 358-9-77 38 40
Fax: 358-9-71 27 62
info@circlumfarmasia.fi
www.circlumfarmasia.fi

GREAT BRITAIN / IRELAND

Dr. Reckeweg (U.K.) Ltd.
Dalton House
33 Leigh Road
Westhoughton
Bolton BL5 2JE
Phone: 44-19 42-81 14 44
Fax: 44-19 42-81 98 21
info@reckeweg.co.uk
www.reckeweg.co.uk

INDIA

Dr. Roshan Lal Aggarwal
& Sons Pvt. Ltd.
16, Netaji Subhash Marg
Darya Ganj
New Delhi - 110 002
Phone: 91-11-2327 13 72
91-11-2326 56 98
Fax: 91-11-2328 20 80
roshanl@vsnl.com
www.reckeweg-india.com

DR. RECKEWEG EN EL MUNDO

ISRAEL

Dr. Samuelov
Importing & Marketing Ltd.
36 Ostrovsky St.
P.O.Box 197
Ra'anana 43372
Phone: 972-9-748 37 69
Fax: 972-9-748 37 68
info@drsamuelov.co.il

ITALY

Dr. Reckeweg Italia s.r.l.
Via Firenze 34
20069 Trezzano Rosa (MI)
Phone: 39-02-90 93 13-220
Fax: 39-02-90 93 13-211
dr.reckeweg.italia@omeoimo.it
www.omeoimo.it

MALAYSIA

Syarikat T.M. Shafi
7-4, Jalan Tun Sambanthan 4
(Brickfields)
50470 Kuala Lumpur
Phone: 60-3-22 74 56 27
Fax: 60-3-22 74 56 27
sufihom5@tm.net.my

NETHERLANDS

Holland Pharma
Bosberg 41
7270 Borculo
Phone: 31-545-251075
Fax: 31-545-251076
info@holland-pharma.nl
www.holland-pharma.nl

PAKISTAN

Dr. Salim Ahmed & Co.
310 Hashoo Centre
Abdullah Haroon Road
Saddar-74400
Karachi
Phone: 92-21-277 17 77
92-21-277 08 07
Fax: 92-21-272 08 07
drsalim@drsalim.com
www.drsalim.com

POLAND

Zymella Pharma Sp. z.o.o.
Ul. Kruczkowskiego 39a
41-813 Zabrze
Phone: 48-32-275 01 52
Fax: 48-32-272 87 94
gh.zymella@zymellapharma.com
www.zymellapharma.com

PORTUGAL

Dr. Reckeweg Portugal Lda. /
DietMed Lda.
Rua da Capela, Edificio
DietMed
Corvos à Nogueira
3505-276 Viseu
Phone: 351-23-293 00 20
Fax: 351-23-293 00 29
dietmed@dietmed.pt
www.dietmed.pt

RUSSIA

000 "Alliance Dr. Reckeweg"
Dmitrowskoe schosse Dom
29.K1. kw. 174
127550 Moscow
Phone: 7-495-977 40 39
Fax: 7-495-976 43 10
artsach@inbox.ru
www.basicin.org

SOUTH AFRICA

Dr. Reckeweg & Co. (Pty) Ltd
39 Waterfall Avenue
Craighall
Johannesburg 2196
Phone: 27-11-886 2555
Fax: 27-11-886 3939
info@reckeweg.co.za
www.reckeweg.de

SPAIN

Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Sucursal España
Polígono Industrial
Ugaldeguren I
48160 Derio (Vizcaya)
Phone: 34-94-454 50 57
Fax: 34-94-454 51 43
reckeweg@lavigor.com
www.grupotegor.com

SWEDEN / NORWAY

Biosan AB
Mohed 327
82692 Söderala
Phone: 46-270-42 58 30
Fax: 46-270-42 58 31
info@biosan.se
www.biosan.se

SWITZERLAND

Laboratoire homéopathique
Jacques Reboh
Ch. de Malley 30
1007 Lausanne
Phone: 41-21-661 26 76
Fax: 41-21-661 26 78
info@lhr.ch
www.lhr.ch

TAIWAN / CHINA

Eastern Harvester Corp.
No. 16, Tsun-Chung St.
403, Taichung
Phone: 886-4-2371 9268
Fax: 886-4-2371 3896
eastrn@yahoo.com.tw

UNITED ARAB EMIRATES

Riyadh Medicine & Medical
Equipment Store
P.O. Box 3805
Sharjah
Phone: 971-6-555 20 56
Fax: 971-6-555 20 57
rmmes_shj@yahoo.com
www.drriaz.com

USA

Dr. Reckeweg America Inc.
132 Lindsay Avenue
Dorval QC H9P 2T8
CANADA
Phone: 1-514-631-8605
Fax: 1-514-631-0903
info@reckeweg.com
www.reckeweg.com

WEST AFRICA

Dr. Reckeweg West Africa
Lord, J' Specialities Ltd.
Rev. Prince Kudolo
P.O. Box MP 2952
Mamprobi, Accra/GHANA
Phone: 233-21-319 598
Fax: 233-21-319 598
pkudolo@yahoo.com



APARATO LOCOMOTOR

R 73
GOTAS Y AMPOLLAS INYECTABLES

ARTROSIS:

- Gonartrosis
- Coxartrosis
- Expondiloartrosis
- Poliartrosis

R 46
GOTAS Y AMPOLLAS INYECTABLES

Artritis y reumatismo de las articulaciones del hombro y extremidad superior.

R 71
GOTAS Y AMPOLLAS INYECTABLES

Ciática, hernia discal, parestesia en extremidades inferiores.

R 30
POMADA

Golpes, traumatismos. Procesos inflamatorios.

R 11
GOTAS Y AMPOLLAS INYECTABLES

Dolores de espalda; reumatismo muscular: lumbago; ciática.

R 61
POMADA

Dolores de espalda; reumatismo muscular: lumbago; ciática.

R 1
GOTAS Y AMPOLLAS INYECTABLES

Inflamación aguda y crónica.

R 55
GOTAS Y AMPOLLAS INYECTABLES

Traumatismos; golpes, contusiones. Patología traumática de partes blandas.

R 63
GOTAS Y AMPOLLAS INYECTABLES

Acroparestesia, Calambres, Síndrome de Leriche, Enfermedad de Raynaud.

DR. RECKEWEG
48160 DERIO (Bizkaia)
Tfno.: (+34) 94 454 50 57 / Fax: (+34) 94 454 51 43
E-mail: reckeweg@lavigor.com
www.lavigor.com

