



PHARMAZEUTISCHE FABRIK

DR. RECKEWEG & CO
GMBH

VADEMÉCUM

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS





PHARMAZEUTISCHE FABRIK

DR. RECKEWEG & CO
GMBH



Dr Reckeweg: una historia de éxito en 4 generaciones

1877. Primera generación

La historia comienza en la década de 1920; fue entonces cuando Heinrich Reckeweg sentó las bases de las combinaciones de medicamentos homeopáticos de la serie Gastreu®. Debido a su propia experiencia de sufrimiento personal, se interesó profundamente en la naturopatía, llegando a formarse de manera autodidacta como naturópata. Su relación con el pastor Felke (1856-1926), considerado hoy en día como el fundador de la homeopatía compleja, impulsó la aparición de los primeros medicamentos combinados de la casa Reckeweg.

Como profesor, Heinrich Reckeweg trataba habitualmente a sus alumnos de resfriados, y con este propósito, desarrolló un jarabe especial para la tos, al que llamó "Jutussin Stickhustenhilfe". Este preparado se sigue comercializando hoy en día en todo el mundo con el nombre de "Jutussin® R8".

1947. Segunda generación

En 1947, dos de los hijos de Heinrich Reckeweg, Alfred y Klaus Gunther Reckeweg, ambos doctores en medicina, fundaron la empresa Dr. Reckeweg & Co. GmbH. Desarrollaron los primeros preparados de la mundialmente conocida serie Gastreu®, que hoy en día cubre una amplia gama de aplicaciones, que va desde resfriados y dolores de cabeza a hemorroides y síntomas de la menopausia, pasando por dolores nerviosos y trastornos del sueño.

1974. Tercera generación

En 1974, con la incorporación a la empresa de Michael Reckeweg, se inició algo más que un simple relevo generacional. El creciente interés mundial por la homeopatía existente en ese momento impulsó a Michael Reckeweg a iniciar la apertura de mercados en el exterior de Alemania. El éxito cosechado motivó que en 1981 se ampliara significativamente la superficie operativa, que pasa a ser de más de 2.000 m². La expansión a nivel internacional también se acompañó de un notable crecimiento interno de la gama de productos; Marita Reckeweg, esposa de Michael Reckeweg, se hizo cargo de la distribución en Alemania.

En 2014, se inauguró un nuevo edificio administrativo, con un amplio centro de comunicaciones que ofrece espacio para eventos y formación. El constante aumento de la producción hizo necesaria una nueva expansión en 2019 con un nuevo edificio que amplió el área productiva con una nueva nave y un nuevo almacén de considerable altura. Este hecho supuso un incremento de la superficie operativa que, distribuida en tres plantas, pasó a ser de 14.500 m². Hoy, Dr. Reckeweg & Co. GmbH mantiene intensos contactos con importadores de más de 40 países de todo el mundo.

Cuarta generación

A principios de 2022, Natalie Reckeweg y David Reckeweg-Lecompte asumieron la dirección de la empresa. Con el apoyo de Annabel y del Dr. Florian Reckeweg, la gestión de la empresa queda, por lo tanto, enteramente en manos familiares. Cuentan con grandes planes: dieron inicio a la diversificación con cannabis medicinal y están planificando otra división de productos. La joven dirección general también participa con entusiasmo en diversos puestos de voluntariado y proyectos para la región de Bergstrasse y nuestra sede en Bensheim.

Pero pese a todas las modernizaciones y el crecimiento económico, la cuarta generación continuará siendo fiel a nuestra tradición especial y conservando la potenciación manual como punto central en la producción de nuestros medicamentos.



ÍNDICE

Medicamentos homeopáticos sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizados mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE).



Dr. Reckeweg R1 Anginacid gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761885.0	06
Dr. Reckeweg R3 Corvosan gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761803.4	07
Dr. Reckeweg R5 Gastreu gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761989.5	08
Dr. Reckeweg R6 Gripfektan gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 762000.6	09
Dr. Reckeweg R7 Hepagalen gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761892.4	10
Dr. Reckeweg R8 Jutussin solución oral.....	150 ml	CN: 758165.9	11
Dr. Reckeweg R11 Lumbagin gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 762007.5	12
Dr. Reckeweg R14 Quieta gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761987.1	13
Dr. Reckeweg Vita-C 15 solución oral.....	250 ml	CN: 762074.7	14
Dr. Reckeweg Vita-C 15 Forte solución oral.....	12 ampollas	CN: 762073.0	15
Dr. Reckeweg R16 Cimisan gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 762004.4	16
Dr. Reckeweg Scrophularia nodosa D4 gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 759973.9	17
Dr. Reckeweg R20 Euglandin-F gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761890.4	18
Dr. Reckeweg R25 Prostan gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761843.0	19
Dr. Reckeweg R27 Renocalcin gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761998.7	20
Dr. Reckeweg R30 Atomare Beckeron pomada.....	85 g	CN: 762011.2	21
Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761992.5	22
Dr. Reckeweg R40 Diaglukon gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761994.9	23
Dr. Reckeweg R41 Fortivirone gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 762002.0	24
Dr. Reckeweg R42 Haemoverin gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761888.1	25
Dr. Reckeweg R55 Rutavine gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 762009.9	26
Dr. Reckeweg R56 Oxysan gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761845.4	27
Dr. Reckeweg R59 Vesiculine gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 759671.4	28
Dr. Reckeweg R61 Lumbagin pomada.....	85 g	CN: 762010.5	29
Dr. Reckeweg R71 Ischialgin gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761831.7	30
Dr. Reckeweg R73 Spondarhtrin gotas orales en solución.....	50 ml	CN: 761834.8	31
Dr. Reckeweg R95 Tónico de alfalfa solución oral.....	100 ml	CN: 761742.6	32
Dr. Reckeweg R96 Pulsatilla compositum solución para pulverización nasal.....	15 ml	CN: 759678.3	33

La información detallada de estos medicamentos está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>

Dr. Reckeweg R1 Anginacid

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Apis* D6 23,81 mg, *Belladonna* D6 23,81 mg g, *Calcium iodatum* D6 23,81 mg, *Hepar sulfuris* D12 23,81 mg, *Kalium bichromicum* D8 23,81 mg, *Lachesis* D12 23,81 mg, *Marum verum* D6 23,81 mg, *Mercurius sublimatus corrosivus* D12 23,81 mg, *Phytolacca* D6 23,81 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 38% V/V (73,99 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en estados agudos en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Población pediátrica: Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- **niños ≥ de 12 años:** 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- **niños 6 - 11 años:** 3 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- **niños 2 - 5 años:** 2 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- **niños menores de 2 años:** No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R1 Anginacid gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Según la literatura homeopática, en casos individuales, pueden producirse reacciones en la piel y sialorrea.

No se conocen riesgos específicos por la toma de medicamentos homeopáticos sobre la fertilidad ni durante el embarazo o la lactancia.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R1 Anginacid gotas orales en solución contiene 74 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,480 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. Es poco probable que la cantidad de alcohol que contiene este medicamento tenga algún efecto perceptible en adultos o adolescentes.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R3 Corvosan

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Cactus* D6 23,53 mg, *Crataegus* D6 47,07 mg, *Digitalis* D6 23,53 mg, *Kalium carbonicum* D6 11,77 mg, *Kalmia* D6 23,53 mg, *Phosphorus* D6 23,53 mg, *Scilla* D6 23,53 mg, *Spigelia anthelmia* D6 23,53 mg, *Strophanthus* D6 23,53 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 44% V/V (86,62 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.


La dosis recomendada en adultos es de 5 gotas de 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se conocen riesgos específicos por la toma de medicamentos homeopáticos sobre la fertilidad ni durante el embarazo o la lactancia.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R3 Corvosan gotas orales en solución contiene 87 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,732 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 3 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml



Dr. Reckeweg R5 Gastreu

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Anacardium D6* 23,94 mg, *Argentum nitricum D6* 23,94 mg, *Arsenicum album D6* 23,94 mg, *Belladonna D6* 23,94 mg, *Carbo vegetabilis D8* 23,94 mg, *Chamomilla D6* 23,94 mg, *Lycopodium D6* 23,94 mg, *Nux vomica D6* 23,94 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 33% V/V (65,70 mg).

Forma de administración y posología

Via oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en estados agudos en los adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis para 5 gotas 1 a 3 veces al día.

Población pediátrica:

- **niños \geq de 12 años:** 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- **niños 6 - 11 años:** 3 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- **niños 2 - 5 años:** 2 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- **niños menores de 2 años:** No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R5 Gastreu gotas orales en solución.


Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

La literatura homeopática describe que la administración anterior o posterior de *Coffea arabica* (Coffea) y *Vespa crabro* puede perjudicar el efecto terapéutico de *Argentum nitricum*.

No se conocen riesgos específicos por la toma de medicamentos homeopáticos sobre la fertilidad ni durante el embarazo o la lactancia.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R5 Gastreu gotas orales en solución contiene 66 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,314 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R6 Gripfektan

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Aconitum* D6 23,83 mg, *Baptisia* D6 23,83 mg, *Bryonia* D6 23,83 mg, *Camphora* D6 23,83 mg, *Causticum Hahnemanni* D6 23,83 mg, *Eucalyptus* D6 23,83 mg, *Eupatorium perfoliatum* D6 23,83 mg, *Ferrum phosphoricum* D8 23,83 mg, *Gelsemium* D6 23,83 mg, *Sabadilla* D6 23,83 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (73,20 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Población pediátrica:

- niños ≥ de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños 6 - 11 años: 3 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños menores de 6 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R6 Gripfektan gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

La literatura homeopática describe que la administración anterior o posterior de *Kalium nitricum* puede perjudicar el efecto terapéutico de *Camphora*.

No se dispone de datos suficientes que avalen la seguridad de Dr. Reckeweg R6 Gripfektan gotas orales en solución durante el embarazo o en periodo de lactancia por lo que no se recomienda su administración.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R6 Gripfektan gotas orales en solución contiene 74 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,464 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R7 Hepagalen

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Carduus marianus* D6 23,81 mg, *Chelidonium* D6 23,81 mg, *China* D6 23,81 mg, *Cholesterinum* D6 23,81 mg, *Colocynthis* D6 23,81 mg, *Lycopodium* D6 23,81 mg, *Nux vomica* D6 23,81 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (73,60 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en estados agudos en adultos es 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Población pediátrica

- niños ≥ de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños menores de 12 años: no se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R7 Hepagalen gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se dispone de datos suficientes que avalen la seguridad de Dr. Reckeweg R7 Hepagalen gotas orales en solución durante el embarazo o en periodo de lactancia por lo que no se recomienda su administración.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R7 Hepagalen gotas orales en solución contiene 74 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,472 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml



Dr. Reckeweg R8 Jutussin

Composición

Los principios activos por cada ml son: *Ammonium causticum* D6 (1,15 mg), *Belladonna* D6 (11,46 mg), *Bryonia* D6 (11,46 mg), *Chamomilla* D6 (1,15 mg), *Coccus cacti* D6 (11,46 mg), *Corallium rubrum* D12 (11,46 mg), *Cuprum aceticum* D12 (11,46 mg), *Drosera* D6 (11,46 mg), *Ipecacuanha* D6 (11,46 mg), *Thymus vulgaris* D6 (1,15 mg).

Los demás componentes (excipientes) son: Saccharum (sacarosa 458,40 mg), Saccharum tostum (color caramelo, E150A), Aqua purificata (agua purificada), etanol 13% v/v (103 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 ml (1 cucharadita) 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 ml (1 cucharadita) de 1 a 2 veces al día.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se conocen riesgos específicos por la toma de medicamentos homeopáticos sobre la fertilidad ni durante el embarazo o la lactancia.

Cada cucharadita (5 ml) de Dr. Reckeweg® R8 Jutussin solución oral contiene 2,29 g sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF), problemas de absorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. Puede perjudicar los dientes.

Cada cucharadita (5 ml) de Dr. Reckeweg® R8 Jutussin contiene 513 mg de alcohol (etanol), que equivale a 10,3 mg/kg. La cantidad contenida en una cucharadita (5 ml) equivale a 13 ml de cerveza o 6 ml de vino. Es poco probable que la cantidad de alcohol que contiene este medicamento tenga algún efecto perceptible en adultos o adolescentes.



solución oral
150 ml

Dr. Reckeweg R11 Lumbagin

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Berberis vulgaris* D4 23,78 mg, *Calcium phosphoricum* D12 23,78 mg, *Causticum Hahnemanni* D6 23,78 mg, *Dulcamara* D4 23,78 mg, *Rhododendron* D4 23,78 mg, *Rhus toxicodendron* D4 23,78 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 38% V/V (74,78 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Población pediátrica

- niños ≥ de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños 6 - 11 años: 3 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños 2 - 5 años: 2 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños menores de 2 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R11 Lumbagin gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se conocen riesgos específicos por la toma de medicamentos homeopáticos sobre la fertilidad ni durante el embarazo o la lactancia.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R11 Lumbagin gotas orales en solución contiene 75 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,496 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R14 Quieta

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Avena sativa* D4 23,57 mg, *Chamomilla* D4 23,57 mg, *Coffea* D4 23,57 mg, *Eschscholzia californica* D4 23,57 mg, *Humulus lupulus* D4 23,57 mg, *Ignatia* D6 23,57 mg, *Passiflora incarnata* D4 23,57 mg, *Valeriana* D4 23,57 mg, *Zincum valerianicum* D6 23,57 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 42% V/V (83,66 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Población pediátrica

- niños ≥ de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños 6 - 11 años: 3 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños menores de 6 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R14 Quieta gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se conocen riesgos específicos por la toma de medicamentos homeopáticos sobre la fertilidad ni durante el embarazo o la lactancia.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R14 Quieta gotas orales en solución contiene 84 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,673 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 3 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg Vita-C 15

Composición

Los principios activos por cada ml son: *Acidum phosphoricum* D6 10,58 mg, *Cocculus* D6 10,58 mg, *Helonias dioica* D6 10,58 mg, *Ignatia* D6 10,58 mg, *Sepia* D6 10,58 mg, *Zincum metallicum* D6 1,06 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Saccharum (sacarosa) 211,60 mg, Acidum ascorbicum (ácido ascórbico), *Citrus limon*, ethanol Extractum (extracto etanólico de limón), *Fructus Cynosbati*, ethanol Decoctum (decocción etanólica de escamaraju), Fructus Sorbi, ethanol Decoctum (extracto etanólico de los frutos del serbal de cazadores), Etanol 18% V/V (142,06 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 ml (1 cucharadita) 3 veces al día. Al remitir los síntomas, se debe reducir la frecuencia de la toma 1 a 2 veces al día.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

La literatura homeopática describe que la administración anterior o posterior de *Causticum H.* y *Coffea arabica* (Coffea) puede perjudicar el efecto terapéutico de *Anamirta cocculus* (Cocculus).

No se dispone de datos suficientes que avalen la seguridad de Dr. Reckeweg Vita-C 15 solución oral durante el embarazo o en periodo de lactancia por lo que no se recomienda su administración.

Cada cucharadita (5 ml) de Dr. Reckeweg Vita-C 15 solución oral contiene 1,06 g de sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF), problemas de absorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. Puede perjudicar los dientes.

Cada cucharadita (5 ml) de Dr. Reckeweg Vita-C 15 solución oral contiene 0,71 mg de alcohol (etanol), que equivale a 14,206 mg/kg. La cantidad contenida en una cucharadita (5 ml) equivale a 18 ml de cerveza o 8 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



solución oral
250 ml

Dr. Reckeweg Vita-C 15 forte

Composición

Cada ampolla (10 ml) de solución oral contiene como principios activos: *Acidum phosphoricum* D6 105,90 mg, *Cocculus* D6 105,90 mg, *Helonias dioica* D6 105,90 mg, *Ignatia* D6 105,90 mg, *Panax ginseng* D6 105,90 mg, *Sepia* D6 105,90 mg, *Zincum metallicum* D6 10,59 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Saccharum (sacarosa 2117,97 mg), Saccharum tostum (color caramelo, E150A), Acidum ascorbicum (ácido ascórbico), Citrus limon, ethanol Extractum (extracto etanólico de limón), Fructus Cynosbati, ethanol Decoctum (decocción etanólica de escamarijo), Fructus Sorbi, ethanol Decoctum (extracto etanólico de los frutos del serbal de cazadores), Ethanolum / Etanol 18% V/V (1420,63 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 1 ampolla 1 a 2 veces al día. Como medida preventiva tomar 1 ampolla una vez al día. Al remitir los síntomas, debe reducir la frecuencia de la toma.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

La literatura homeopática describe que la administración anterior o posterior de *Causticum H.* y *Coffea arabica* (Coffea) puede perjudicar el efecto terapéutico de *Anamirta cocculus* (Cocculus).

Según la literatura homeopática, pueden producirse los siguientes efectos secundarios: Malestar estomacal, náuseas, vómitos, epigastralgia, diarrea, estreñimiento, dolor de cabeza e insomnio, reacciones de hipersensibilidad como urticaria y picor.

No se dispone de información clínica suficiente que avale la seguridad durante el embarazo o la lactancia, por lo que no se recomienda su administración.

Cada ampolla (10 ml) de Dr. Reckeweg Vita-C 15 forte solución oral contiene 2,12 g sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF), problemas de absorción de glucosa o galactosa o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. Puede perjudicar los dientes.

Cada ampolla (10 ml) de Dr. Reckeweg Vita-C 15 forte solución oral contiene 1,42 g de alcohol (etanol), que equivale a 28,413 mg/kg. La cantidad contenida en una ampolla (10 ml) equivale a 36 ml de cerveza o 15 ml de vino. Es poco probable que la cantidad de alcohol que contiene este medicamento tenga algún efecto perceptible en adultos o adolescentes. Podría tener algunos efectos en niños pequeños, como por ejemplo somnolencia.



solución oral
12 ampollas de 10 ml

Dr. Reckeweg R16 Cimisan

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Cimicifuga* D6 23,81 mg, *Gelsemium* D6 23,81 mg, *Iris versicolor* D6 23,81 mg, *Sanguinaria* D6 23,81 mg, *Spigelia anthelmia* D6 23,81 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (72,81 mg).

Forma de administración y posología

Via oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Población pediátrica

- niños ≥ de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños 6 - 11 años: 3 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños menores de 6 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R16 Cimisan gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se conocen riesgos específicos por la toma de medicamentos homeopáticos sobre la fertilidad ni durante el embarazo o la lactancia.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R16 Cimisan gotas orales en solución contiene 73 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,456 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg **Scrophularia nodosa D4**

Composición

El principio activo por cada 5 gotas (0,25 ml) es: *Scrophularia nodosa* D4 231,46 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 52 V/V (103 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis, a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños ≥ de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños menores de 12 años: no se recomienda el uso de *Scrophularia nodosa* D4 gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se dispone de información clínica suficiente que avale la seguridad durante el embarazo o la lactancia, por lo que no se recomienda su administración.

Cada dosis (5 gotas) de *Scrophularia nodosa* D4 gotas orales en solución contiene 103 mg de alcohol (etanol), que equivale a 2,060 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) equivale a 3 ml de cerveza o 2 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R20 Euglandin-F

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Glandula suprarenalis* (suis) D12 23,83 mg, *Glandula thymi* (suis) D12 23,83 mg, *Hypophysis* (suis) D12 23,83 mg, *Ovarium* (suis) D12 23,83 mg, *Pancreas* (suis) D12 23,83 mg, *Thyreoidinum* (suis) D12 23,83 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (72,81 mg).

Forma de administración y posología

Via oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

Este medicamento está destinado a mujeres adultas. La dosis recomendada en mujeres adultas es de 5 gotas 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de administración.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a las sustancias activas o a alguno de los excipientes.

En caso de disfunción tiroidea, debe realizarse sólo bajo control médico.

No se dispone de datos suficientes que avalen la seguridad de Dr. Reckeweg R20 Euglandin F gotas orales en solución durante el embarazo o en periodo de lactancia por lo que no se recomienda su administración.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R20 Euglandin F gotas orales en solución contiene 73 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,456 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R25 Prostatan

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Chimaphila umbellata* D6 23,81 mg, *Conium* D6 23,81 mg, *Pareira brava* D6 23,81 mg, *Populus tremuloides* D6 23,81 mg, *Pulsatilla* D6 23,81 mg, *Sabal serrulatum* D6 23,81 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (73,60 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

Este medicamento está destinado a hombres adultos. La dosis recomendada en hombres adultos es de 5 gotas de 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R25 Corvosan gotas orales en solución contiene 74 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,472 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R27 Renocalcin

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Acidum nitricum* D6 23,81 mg, *Berberis vulgaris* D6 23,81 mg, *Lycopodium* D6 23,81 mg, *Sarsaparilla* D6 23,81 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (72,61 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en adultos es de 5 gotas de 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se dispone de datos suficientes que avalen la seguridad de Dr. Reckeweg R27 Renocalcin gotas orales en solución durante el embarazo o en periodo de lactancia por lo que no se recomienda su administración.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R27 Renocalcin gotas orales en solución contiene 73 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,452 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml



Dr. Reckeweg R30 Atomare Beckeron

Composición

Los principios activos por cada gramo son: *Arnica* D3 oleos 1 mg, *Belladonna* D3 oleos 1 mg, *Calendula* D3 oleos 1 mg, *Camphora* D3 oleos 10 mg, *Dulcamara* D3 oleos 1 mg, *Echinaceae* D3 oleos 1 mg, *Hamamelis* D3 oleos 1 mg, *Hypericum* D3 oleos 1 mg, *Millefolium* D3 oleos 1 mg, *Nux vomica* D3 oleos 1 mg, *Rhus toxicodendron* D3 oleos 1 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Oleum Lavandulae (aceite de lavanda) 10 mg (0,1 mg d-limoneno, 5 mg linalol, 0,1 mg geraniol), Oleum Pini silvestris 10% (aceite de pino silvestre) 20 mg (0,2 mg d-limoneno, 18 mg aceite de cacahuete), Oleum Rosmarini 10%, (aceite de romero) 10 mg (0,05 mg d-limoneno, 0,05 mg linalol, 9 mg aceite de cacahuete), Unguentum Alcoholum Lanae (lanolina) 940 mg.

Forma de administración y posología

Uso cutáneo exclusivamente externo.

La dosis recomendada en adultos es: aplicar extendiendo sobre la zona afectada una pequeña cantidad del tamaño de un guisante 1 a 3 veces al día. Después de la aplicación, limpiar bien las manos. Tras la aplicación de la pomada, opcionalmente se puede cubrir la zona con un vendaje de material permeable al aire (por ejemplo, algodón).

Población pediátrica. Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños \geq de 12 años: aplicar sobre la zona afectada una pequeña cantidad del tamaño de un guisante 1 a 3 veces al día. Después de la aplicación, limpiar bien las manos. Opcionalmente, utilizar un vendaje de material permeable al aire (por ejemplo, algodón).
- niños menores de 12 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R30 Atomare Beckeron pomada.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No aplicar en los ojos, nariz y en heridas profundas abiertas.

La pomada debe aplicarse sobre la piel intacta. No aplicar sobre las membranas mucosas, debe evitarse la aplicación sobre áreas extensas.

No se recomienda aplicar en caso de padecer de tos ferina (pertusis) y asma bronquial.

Puede producirse fotosensibilización, especialmente en personas de piel clara.

Este medicamento contiene fragancias con alérgenos como d-Limoneno, Linalol, Geraniol y aceite de cacahuete (aceite de arachis) que pueden producir reacciones alérgicas. No debe utilizarse en caso de alergia al cacahuete o a la soja.

Además de las reacciones alérgicas en pacientes sensibilizados, los pacientes no sensibilizados pueden llegar a sensibilizarse.

Este medicamento contiene grasa de lana (lanolina) que puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto).

La literatura homeopática describe que la administración anterior o posterior de *Potassium nitricum* puede perjudicar el efecto terapéutico de *Camphora*.

No aplicar Dr. Reckeweg R30 Atomare Beckeron pomada durante el embarazo y la lactancia.



pomada de **85 g**

Dr. Reckeweg R37 Colinteston

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas son: *Alumina D12* 23,83 mg, *Bryonia D6* 23,83 mg, *Colocynthis D6* 23,83 mg, *Lycopodium D6* 23,83 mg, *Nux vomica D6* 23,83 mg, *Sulfur D12* 23,83 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (73,20 mg).

Forma de administración y posología

Via oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Población pediátrica

- niños \geq de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños 6 - 11 años: 3 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños menores de 6 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se conocen riesgos específicos por la toma de medicamentos homeopáticos sobre la fertilidad ni durante el embarazo o la lactancia.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R37 Colinteston gotas orales en solución contiene 73 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,464 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R40 Diaglukon

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Acidum phosphoricum* D12 23,83 mg, *Arsenicum album* D8 23,83 mg, *Natrium sulfuricum* D12 23,83 mg, *Secale cornutum* D4 23,83 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (73,20 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en adultos es de 5 gotas de 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños \geq de 12 años: 5 gotas 1 a 3 al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.
- niños 6 - 11 años: 3 gotas hasta 1 a 3 al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños menores de 6 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R40 Diaglukon gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se dispone de información clínica suficiente que avale la seguridad durante el embarazo o la lactancia, por lo que no se recomienda su administración.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R40 Diaglukon gotas orales en solución contiene 73 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,464 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml



Dr. Reckeweg R41 Fortivirone

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Acidum phosphoricum* D12 23,82 mg, *Agnus castus* D8 23,82 mg, *Damiana* D6 23,82 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (72,41 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se conocen riesgos específicos por la toma de medicamentos homeopáticos sobre la fertilidad ni durante el embarazo o la lactancia.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R41 Fortivirone gotas orales en solución contiene 73 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,448 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R42 Haemovenin

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Aesculus* D30 23,81 mg, *Carduus marianus* D12 23,81 mg, *Hamamelis* D6 23,81 mg, *Pulsatilla* D30 23,81 mg, *Secale cornutum* D30 23,81 mg, *Vipera berus* D12 23,81 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (73,20 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en adultos es de 5 gotas 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se dispone de información clínica suficiente que avale la seguridad durante el embarazo o la lactancia, por lo que no se recomienda su administración.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R42 Haemovenin gotas orales en solución contiene 74 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,464 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino.

La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R55 Rutavine

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Arnica* D6 23,83 mg, *Calendula* D6 23,83 mg, *Hamamelis* D6 23,83 mg, *Rhus toxicodendron* D12 23,83 mg, *Ruta* D6 23,83 mg, *Symphytum* D12 23,83 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (73,20 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños ≥ de 12 años: 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.
- niños 6 - 11 años: 3 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños 2 - 5 años: 2 gotas hasta 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños menores de 2 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R55 Rutavine gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R55 Rutavine gotas orales en solución contiene 74 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,464 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R56 Oxysan

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Artemisia vulgaris* D6 23,83 mg, *Cina* D6 23,83 mg, *Graphites* D30 23,83 mg, *Mercurius sublimatus corrosivus* D12 23,83 mg, *Tanacetum vulgare* D6 23,83 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (73,20 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en adultos es de 5 gotas de 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, debe reducir la frecuencia de la toma.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se dispone de información clínica suficiente que avale la seguridad durante el embarazo o la lactancia, por lo que no se recomienda su administración.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R56 Oxysan gotas orales en solución contiene 74 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,464 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R59 Vesiculine

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Calcium carbonicum Hahnemanni* D12 (23,82 mg), *Fucus vesiculosus* D6 (23,82 mg), *Graphites* D12 (23,82 mg), *Natrium sulfuricum* D6 (23,82 mg), *Spongia* D6 (23,82 mg).

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (72,81 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños ≥ de 12 años: 5 gotas 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la frecuencia de la toma.
- niños < de 12 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R59 Vesiculine gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

El hipertiroidismo puede exacerbarse.

La literatura homeopática describe que la administración anterior o posterior de *Barium carbonicum* y *Bryonia cretica* (Bryonia) puede perjudicar el efecto terapéutico de *Calcium carbonicum* H. (Conchae).

No se dispone de información clínica suficiente que avale la seguridad durante el embarazo o la lactancia, por lo que no se recomienda su administración.

Dr. Reckeweg R59 Vesiculine gotas orales en solución contiene etanol (alcohol). La cantidad se corresponde con 1,456 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R61 Lumbagin

Composición

Los principios activos por cada gramo son: *Berberis vulgaris* Ø=D1 1 mg, *Camphora* D3 oleos 10 mg, *Dulcamara* D1 1 mg, *Nux vomica* Ø=D1 1mg, *Rhododendron* Ø=D1 1 mg, *Rhus toxicodendron* D1 1 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Oleum Gaultheriae 10% (aceite de gaulteria) 35 mg (31,5 mg aceite de cacahuete), Oleum Lavandulae (aceite de lavanda) 10 mg (0,1 mg d-limoneno, 5 mg linalol, 0,1 mg geraniol), Oleum Pini silvestris 10% (aceite de pino silvestre) 20 mg (0,2 mg d-limoneno, 18 mg aceite de cacahuete), Unguentum Alcoholum Lanae (lanolina) 920 mg.

Forma de administración y posología

Vía exclusivamente cutánea. Uso externo.

La dosis recomendada en adultos es aplicar sobre la zona afectada una capa fina de pomada 1 a 3 veces al día. Después de la aplicación, limpiar bien las manos. Opcionalmente, utilizar un vendaje con material permeable al aire (por ejemplo, algodón).

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños \geq de 12 años: aplicar sobre la zona afectada una capa fina de pomada 1 a 3 veces al día. Después de la aplicación, limpiar bien las manos. Opcionalmente, utilizar un vendaje de material permeable al aire (por ejemplo, algodón).
- niños menores de 12 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R61 Lumbagin pomada.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No aplicar en los ojos, nariz y en heridas profundas abiertas. La pomada debe aplicarse sobre la piel intacta. No aplicar sobre las membranas mucosas, debe evitarse la aplicación sobre áreas extensas.

No se recomienda aplicar en caso de padecer de tos ferina (pertusis) y asma bronquial. En casos individuales, puede incrementar los casos de asma y broncoespasmos.

La literatura homeopática describe que la administración anterior o posterior de *Potassium nitricum* puede perjudicar el efecto terapéutico de *Camphora*.

No aplicar Dr. Reckeweg R61 Lumbagin pomada durante el embarazo y la lactancia.

Dr. Reckeweg R61 Lumbagin pomada contiene fragancias que contienen alérgenos como d-limoneno, linalol, geraniol y aceite de cacahuete (aceite de arachis) que pueden producir reacciones alérgicas (hipersensibilidad o alergia cutánea). No utilizar en caso de alergia al cacahuete o a la soja.

Este medicamento contiene grasa de lana (lanolina) que puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto).

En casos individuales, pueden producirse reacciones cutáneas locales (por ejemplo, dermatitis de contacto) y reacciones alérgicas.



pomada de **85 g**

Dr. Reckeweg R71 Ischialgin

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Aconitum* D6 47,61 mg, *Arsenicum album* D30 47,61 mg, *Colocynthis* D6 47,61 mg, *Gnaphalium polycephalum* D6 47,61 mg, *Magnesium phosphoricum* D8 47,61 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 37% V/V (72,61 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en adultos es de 5 gotas de 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, debe reducir la frecuencia de la toma.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños ≥ de 12 años: 5 gotas de 1 a 3 veces al día. Al remitir los síntomas, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños menores de 12 años: No se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R71 Ischialgin gotas orales en solución.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se dispone de datos suficientes que avalen la seguridad de Dr. Reckeweg R71 Ischialgin gotas orales en solución durante el embarazo o en periodo de lactancia por lo que no se recomienda su administración.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R71 Ischialgin gotas orales en solución contiene 73 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,452 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml

Dr. Reckeweg R73 Spondarthrin

Composición

Los principios activos por cada 5 gotas (0,25 ml) son: *Acidum sulfuricum* D6 47,56 mg, *Argentum metallicum* D12 23,78 mg, *Arnica* D6 47,56 mg, *Bryonia* D6 47,56 mg, *Causticum Hahnemanni* D12 23,78 mg, *Ledum* D6 47,56 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Etanol 38% V/V (74,39 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 5 gotas cada media o una hora, hasta un máximo de seis veces al día. Al remitir los síntomas, reducir la dosis a 5 gotas de 1 a 3 veces al día.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Y si es alérgico a las asteráceas.

No se conocen riesgos específicos por la toma de medicamentos homeopáticos sobre la fertilidad ni durante el embarazo o la lactancia.

Cada dosis (5 gotas) de Dr. Reckeweg R73 Spondarthrin gotas orales en solución contiene 75 mg de alcohol (etanol), que equivale a 1,488 mg/kg. La cantidad contenida en 5 gotas (0,25 ml) de este medicamento equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



gotas orales en solución
50 ml



Dr. Reckeweg R95 Tónico de Alfalfa

Composición

Los principios activos por cada ml son: *Acidum phosphoricum* D2 1,06 mg, *Alfalfa* D2 5,32 mg, *Avena sativa* D2 5,32 mg, *Calcium phosphoricum* D6 1,06 mg, *China* D2 1,06 mg, *Cinnamomum* D2 1,06 mg, *Hydrastis* D2 1,06 mg, *Magnesium phosphoricum* D6 1,06 mg, *Nux vomica* D3 10,64 mg, *Panax ginseng* D2 1,06 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Saccharum (sacarosa, 212,81 mg), Saccharum tostum (color caramelo, E150A), etanol 13 % v/v (103 mg).

Forma de administración y posología

Vía oral. Tomar preferiblemente separado de las comidas.

La dosis recomendada en adultos es de 5 ml (1 cucharadita) 3 veces al día, antes de las comidas. Al remitir los síntomas, debe reducir la frecuencia de la toma.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- niños \geq de 12 años: 5 ml (1 cucharadita) 3 veces al día, antes de las comidas. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- niños menores de 12 años: no se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R95 Tónico de Alfalfa solución oral.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

No se dispone de información clínica suficiente que avale la seguridad durante el embarazo o la lactancia, por lo que no se recomienda su administración.

Cada cucharadita (5 ml) de Dr. Reckeweg R95 Tónico de Alfalfa solución oral contiene 1,064 g sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF), problemas de absorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. Puede perjudicar los dientes.

Cada cucharadita (5 ml) de Dr. Reckeweg R95 Tónico de Alfalfa solución oral contiene 513 mg de alcohol (etanol) que equivale a 10,3 mg/kg. La cantidad contenida en una cucharadita (5 ml) de este medicamento equivale a 13 ml de cerveza o 6 ml de vino. Es poco probable que la cantidad de alcohol que contiene este medicamento tenga algún efecto perceptible en adultos o adolescentes. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.



solución oral
100 ml

Dr. Reckeweg R96 Pulsatilla Compositum

Composición

Los principios activos contenidos por cada pulverización son: *Calcium carbonicum Hahnemanni* D12 35,15 mg, *Cinnabaris* D8 35,15 mg, *Kalium bichromicum* D6 35,15 mg, *Pulsatilla* D6 35,15 mg.

Los demás componentes (excipientes) son: Cloruro de sodio.

Sin conservantes ni propelente.

Forma de administración y posología

Vía nasal.

En fase aguda, la dosis recomendada en adultos es de 1 pulverización en cada orificio nasal 3 a 6 veces al día. Al remitir los síntomas, debe reducirse la frecuencia de la aplicación.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

- **niños ≥ de 12 años:** 1 pulverización en cada orificio nasal 3 a 6 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- **niños 6 - 11 años:** 1 pulverización en cada orificio nasal 1 a 4 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- **niños 2 - 5 años:** 1 pulverización en cada orificio nasal 1 a 2 veces al día. Después de la mejora, debe reducir la frecuencia de la toma.
- **niños menores de 2 años:** no se recomienda el uso de Dr. Reckeweg R96 Pulsatilla Compositum solución para pulverización nasal.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PULVERIZADOR NASAL:



Quitar la tapa.



Coloque el dedo índice y corazón a cada lado del aplicador nasal y el pulgar debajo del frasco. Mantenga su pulgar, y presione firmemente hacia abajo con los dedos para liberar una pulverización al aire (repetir 1 a 2 veces).



Coloque el aplicador nasal en un orificio nasal. Presione firmemente con los dedos hacia abajo mientras aspira por la nariz. Después de usar el pulverizador, limpie el aplicador nasal. Vuelva a colocar la tapa.

Contraindicaciones, advertencias y precauciones

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

La literatura homeopática describe que la administración anterior o posterior de *Barium carbonicum* y *Bryonia cretica* (Bryonia) puede perjudicar el efecto terapéutico de *Calcium carbonicum Hahnemanni* (Conchae).

No se dispone de información clínica suficiente que avale la seguridad durante el embarazo o la lactancia, por lo que no se recomienda su administración.

Según la literatura homeopática, en casos individuales pueden producirse reacciones en la piel y/o sialorrea. En estos casos, el paciente debe interrumpir el tratamiento.



solución para pulverización nasal
15 ml (107 pulsaciones)



ÍNDICE DE CONSTITUYENTES

A

Acidum ascorbicum.....	(Vita-C 15 [®] , Vita-C 15 Forte [®])
Acidum nitricum	D6 (R27)
Acidum phosphoricum.....	D2 (R95) D6 (Vita-C 15 [®] Vita-C 15 Forte [®]) D12 (R40, R41)
Acidum sulfuricum	D6 (R73)
Aconitum.....	D6 (R6 R71)
Aesculus.....	D30 (R42)
Agnus castus.....	D8 (R41)
Alfalfa.....	D2 (R95)
Alumina	D12 (R37)
Ammonium causticum	D6 (R8)
Anacardium.....	D6 (R5)
Apis.....	D6 (R1)
Argentum metallicum.....	D12 (R73)
Arnica.....	D3 (R30) D6 (R55 R73)
Argentum nitricum.....	D6 (R5)
Arsenicum album	D6 (R5) D8 (R40) D30 (R71)
Artemisia vulgaris	D6 (R56)
Avena sativa.....	D2 (R95) D4 (R14)

B

Baptisia	D6 (R6)
Belladonna.....	D3 (R30) D6 (R1 R5 R8)
Berberis vulgaris.....	Ø=D1 (R61) D4 (R11) D6 (R27)
Bryonia.....	D6 (R6 R8 R37 R73)

C

Cactus.....	D6 (R3)
Calcium carbonicum Hahnemanni.....	D12 (R59, R96)
Calcium iodatum.....	D6 (R1)
Calcium phosphoricum.....	D6 (R95) D12 (R11)
Calendula.....	D3 (R30) D6 (R55)
Camphora.....	D3 (R30, R61) D6 (R6)
Carbo vegetabilis.....	D8 (R5)
Carduus marianus	D6 (R7) D12 (R42)
Caulophyllum.....	D2 (R75)
Causticum Hahnemanni.....	D6 (R6, R11) D12 (R73)
Chamomilla.....	D2 (R8) D4 (R14) D6 (R5 R8)
Chelidonium	D6 (R7)
Chimaphila umbellata.....	D6 (R25)
China.....	D2 (R95) D6 (R7)
Cholesterinum.....	D6 (R7)
Cimicifuga.....	D3 (R75) D6 (R16)
Cina.....	D6 (R56)
Cinnabaris.....	D8 (R96)

Cinnamomum.....	D2 (R95)
Citrus limum.....	(Vita-C 15, Vita-C 15 Forte®)
Cocculus.....	D6 (Vita-C 15® Vita-C 15 Forte®)
Coccus cacti.....	D6 (R8)
Coffea.....	D4 (R14)
Colocynthis.....	D6 (R7, R37 R71)
Conium.....	D6 (R25)
Corallium rubrum.....	D12 (R8)
Crataegus.....	D6(R3)
Cuprum aceticum.....	D4 (R75) D12 (R8)

D

Damiana.....	D6 (R41)
Digitalis.....	D6 (R3)
Drosera.....	D1 (R76) D6 (R8)
Dulcamara.....	D1 (R61) D3 (R30) D4 (R11)

E

Echinacea angustifolia.....	D3 (R30)
Eschscholzia californica.....	D4 (R14)
Eucalyptus.....	D6 (R6)
Eupatorium perfoliatum.....	D6 (R6)

F

Ferrum phosphoricum.....	D8 (R6)
Fructus Cynosbati.....	(Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®)
Fructus Sorbi.....	(Vita-C 15®, Vita-C 15 Forte®)
Fucus vesiculosus.....	D6 (R59)

G

Gelsemium.....	D6 (R6 R16)
Glandula suprarenalis (suis).....	D12 (R20)
Glandula thymi (suis).....	D12 (R20)
Gnaphalium polycephalum.....	D6 (R71)
Graphites.....	D12 (R59) D30 (R56)

H

Hamamelis.....	D3 (R30) D6 (R42 R55)
Helonias dioica.....	D6 (Vita-C 15® Vita-C 15 Forte®)
Hepar sulfuris.....	D12 (R1)
Humulus lupulus.....	D4 (R14)
Hydrastis.....	D2 (R95)
Hypericum.....	D3 (R30)
Hypophysis.....	D12 (R20) D30

I

Ignatia	D6 (R14 Vita-C 15® Vita-C 15 Forte®)
Ipecacuanha	D6 (R8) D8 (R52)
Iris versicolor	D6 (R16)

K

Kalium bichromicum	D6 (R96) D8 (R1)
Kalium carbonicum	D6(R3)
Kalmia	D6 (R3)

L

Lachesis	D12 (R1) D30 (R37)
Ledum	D6 (R73)
Lobelia inflata	D3 (R76)
Lycopodium	D5 (R13) D6 (R5 R7 R27 R37)

M

Magnesium phosphoricum	D6 (R95) D8 (R71)
Marum verum	D6 (R1)
Mercurius sublimatus corrosivus	D12 (R1 R56)
Millefolium	D3 (R30)

N

Natrium sulfuricum	D12 (R40) D6 (R59)
Nux vomica	Ø=D1 (R61) D3 (R30, R95) D6 (R5 R7 R37)

O

Oleum Gaultheriae	(R61)
Oleum Lavandulae	(R30, R61)
Oleum Pini silvestris	(R30, R61)
Oleum Rosmarini	(R30)
Ovarium (suis)	D12 (R20)

P

Panax ginseng	D2 (R95) D6 (Vita-C 15 Forte®)
Pancreas (suis)	D12 (R20)
Pareira brava	D6 (R25)
Passiflora incarnata	D4 (R14)
Phosphorus	D6 (R3)
Phytolacca	D6 (R1)
Populus tremuloides	D6 (R25)
Pulsatilla	D6 (R25 R96) D30 (R42)

R

Rhododendron	Ø=D1 (R61) D4 (R11)
Rhus toxicodendron	D1 (R61) D3 (R30) D4 (R11) D12 (R55)
Ruta	D6 (R55)

S

Sabadilla.....	D6 (R6)
Sabal serrulatum.....	D6 (R25)
Saccharum.....	(R8, R95, Vita-C 15 [®] , Vita-C 15 Forte [®])
Saccharum tostum.....	(R8, R95, Vita-C 15 [®] , Vita-C 15 Forte [®])
Sanguinaria.....	D6 (R16)
Sarsaparilla.....	D6 (R27)
Scilla.....	D6 (R3)
Scrophularia nodosa.....	Scrophularia nodosa D4
Secale cornutum.....	D4 (R40) D30 (R42)
Sepia.....	D6 (Vita-C 15 [®] , Vita-C 15 Forte [®])
Spigelia anthelmia.....	D6 (R3) D6 (R16)
Spongia.....	D6 (R59)
Strophanthus.....	D6 (R3)
Sulfur.....	D12 (R37)
Symphytum.....	D12 (R55)

T

Tanacetum vulgare.....	D6 (R56)
Thymus vulgaris.....	D6 (R8)
Thyreoidinum (suis).....	D12 (R20)

U

Unguentum Alcoholum Lanae.....	(R30, R61)
--------------------------------	------------

V

Valeriana.....	D4 (R14)
Vipera berus.....	D12 (R42)

Z

Zincum metallicum.....	D6 (Vita-C 15 [®] , Vita-C 15 Forte [®])
Zincum valerianicum.....	D6 (R14)



75 años dedicados a la homeopatía

Combinando tradición y tecnología de vanguardia, Dr. Reckeweg se ha mantenido fiel a sus principios hasta el día de hoy. En su cuarta generación e impulsado por el futuro, el nombre de Dr. Reckeweg es sinónimo de confianza, la máxima calidad e investigación. Desde la fundación de Dr. Reckeweg & Co. GmbH en 1947, nuestra empresa familiar se ha ido haciendo un nombre en todo el mundo como fabricante de medicamentos homeopáticos.



NORMAS GENERALES PARA EL ADECUADO USO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

En cuanto a la forma de administración de los medicamentos homeopáticos, como normas de carácter general debe tenerse en cuenta que las potencias homeopáticas bajas (D1 a D6) son las más recomendables para el tratamiento de afecciones localizadas y procesos agudos, siendo las potencias homeopáticas superiores a D4 consideradas en la UE como las más seguras. Por otra parte, las potencias homeopáticas medias (D6 a D12) son las más apropiadas para el tratamiento de afecciones generalizadas y procesos subagudos, mientras que las potencias homeopáticas altas (D12 a D30) y muy altas (superiores a D30) son las idóneas para el tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas, así como en el caso de afecciones psíquicas graves.

La frecuencia de administración de los medicamentos homeopáticos se determina en función de la agudeza o cronicidad de las afecciones tratadas, así como de la respuesta obtenida en cada individuo, de manera que a mayor agudeza de la sintomatología, la frecuencia de administración es mayor, debiendo disminuir dicha frecuencia tras la mejoría en la sintomatología presentada; de manera análoga, la frecuencia de administración es menor a medida que la afección se presenta más crónica o persistente.

CONSEJOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN:

Los medicamentos homeopáticos de administración oral, deben tomarse preferiblemente separados de las comidas (una hora después o 15 minutos antes de ingerir cualquier alimento).



PHARMAZEUTISCHE FABRIK

DR. RECKEWEG & CO.
GMBH

Pueden solicitar más información respecto a estos medicamentos dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:

Dr. Reckeweg® & Co. GmbH
Sucursal en España
Polígono Industrial Ugaldeguren 1
48160 Derio (Vizcaya)
E-mail: reckeweg@lavigor.com
Teléfono: +34 944545057

